



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/s3id13295410>

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.




VOLVMINIS XXII. PARS I.

LIPSIAE MDCCLXXVI.
APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Vendantur etiam

Lugduni Bataur. apud Fratres Luchtmann. Londini apud Fr. Elmsly
Veneriis apud I. B. Pascali, Romae apud St. Richard, Aug.
Taurinor. apud Giraud et Grauiet.







I.

Historia et commentationes academiae electoralis scientiarum et elegantiorum literarum Theodoro - Palatinae. Volumen III. Physicum. Manhemii, Typis Academicis. MDCCLXXV.

Quum plurimi commentationes academicae mallent diuersis prodire libris: societas eorum voluntati satisfecit, ita, vt historicae et philosophicae, quae prius una cum physicis *) vulgabantur, nunc separatim ederentur.

Ex historia academiae notamus, quaedam ex
vita FRANC. IOH. OBERKAMPPI M. Doct. Natus p. 3.
is est die solstitiali aestiuo, ann. 1710. Amorbaci,
patre BARTHOLOMAEO physico. Medicinae do-
ctor ann. 1736. Bambergae creatus est. Plurimas
adiit litterarum vniuersitates Germaniae, maxime
vero Lugduni Batauorum BOERHAAVIUM, ALBI-
NVM et GAUBIUM doctores coluit. Lutetiam Pa-
risiorum se contulit, postea Bruchsaliam archiater
Eminent. Schoenbornii Cardinalis vocatus est, ibi-
que perstitit, vsque ad ann. 1742: vnde Herbipo-
lim Medicinae professor venit. Sexennio post, ac-
cepta comitiuae sacri imperialis palatii dignitate,
A 2 accersit.

*) Indicabimus tractationes physicas, in primis duobus voluminibus contentas in supplementis tertiae decadis proxime.

accerfitus est in Palatinatum, vt et studia iuuenum Heidelbergae, et Principis Celfiffimae AUGUSTAE valetudinem regeret. Quinquennio post confiliarius Electoralis intimus factus est. Ann. 1767. viribus debilitatis aquas marchicas petiit: Media vero valetudinis curatione, cum Sereniffimus Princeps FRIDERICVS graui morbo affligeretur, vita fua pofthabita, ad hunc curandum accurrit, fuccurritque tam efficaciter, vt morbus deuictus omnino crederetur: quum domum ipfe regreffus, et arrepto calamo formulam remedii fibi fcripturus, d. VII. Iulii 1768, fubita, morte profligaretur. Difertationes viginti fex, Wurzburgii et Heidelbergae edidit, fcripfitque libellum de acidulis Kiffingenfibus.

Ann. 1768. NATALIS IOSEPHVS DE NECKER focius ordinarius Academiae electus est.

Commentationes ipfae funt.

p. 21. I. IOH. GOTTLIEB KOELREVTER hiftoria tentaminum, quae inde ab anno 1691, vfque ad annum 1752, *de sexu plantarum* inftituta funt. Hic in primis oftendit RVDOLPHVM IACOBVM CAMERARIVM primum fuiiffe, qui sexum plantarum propriis tentaminibus demonftrauerit. Simul corrigit errores, qui epiftolae CAMERARII in *Misc. Nat. cur. Dec. 3. An. 3. pag. 33.* irrepfere. Reliqui Auctores, quos Nofter commemorat, funt SAMUEL MORLAND, GEOFFROY, VAILLANT, BRADLY, MÜLLER, LOGANVS, et GLEDITSCHIVS.

2. EIVSDEM *descriptio partium genitalium et verae impraegnandi rationis in Afclepiade et huic affnibus plantis.* Oftendit hic veras antheras latere fub operculo intra fquamas, et effe fub fingulo operculo binas compreffas, oblongas, luteas, filamentis innixas;

Hae

Hae antherae continent oleum pellucidum, non vero pollinem: corpus cylindricum medium truncatum tegit pistillum; quod si ad longitudinem disseccatur, offert in media parte stylos parallelos sibi appositos, quorum apices seu stigmata, substantiae spongiosae corporis truncati cylindrici innascuntur. LINNAEVM *opercula* antherarum pro antheris habuisse existimat; si enim veras antheras vidisset, Asclepiadi non quinque, sed decem stamina tribuisset: Pertinet igitur Asclepias ad Decandriam. JACQVINVS *) vera stamina in *Cynancho* descripsit: sed antheras fertiles putat, atque totum corpus truncatum stigma dicit.

Cl. Auctor itaque putat capitula lutea filamentis innixa esse idem, quod in aliis plantis pollen, atque oleum in iis contentum verum semen virile, quod ab interna superficie saccorum, in quibus stamina sunt, et qui stigmatis vice funguntur, fugitur, et per corporis truncati substantiam pistillo, eidem innato, traditur, sicque semen impraegnatur. Similem rationem partium genitalium fere in orchideis plantis esse, quam alio loco et tempore descripturus est.

3. EIVSDEM *descriptio Lernaeae Gadi Callariae* p. 57.
LINN. *branchiis firmiter inhaerentis*. Singularis est structurae: corpus eius ventriculi humani formam aemulatur. Caput tentaculis tribus vel quatuor instruitur, iisque firmissime branchiis inhaesit; altera parte liberum est animal atque in feminis affixa sunt ouaria, instar tenuissimorum intestinulorum conuolutorum inferiori corporis parti adhaerentia. Iam Cl. Auctor coniicit, hanc a se descriptam Ler-

A 3

naeam

*) vid. EIVSD. select. stirp. Americ. hist. Vindob 1763. pag. 82. comm. nostr. Vol. XII. p. 235.

naeam cum *L. branchiali* LINN. eiusdem esse speciei; quod confirmatur ex comparatione, quam nos cum icone a STROEMIO in *Sondmor* t. I. f. 18. data, instituimus: differt tamen, quod *Lernaea branchialis* maior sit, neque Cl. Auctor os circulare animaduertit, quod STROEMIUS indicat. Elegantibus figuris Cl. Auctor varia animalcula depingi curauit.

p. 62. 4. EIVSD. *relatio de cimice nigro bruna, in Strobilis Abietis hybernante et LOXIAE Curuirostrae pabulo inferuiente.* Est *Cimex abietis* LINN. thorace supra scutelloque nigro: femoribus anterioribus crassioribus, dentatis. Hoc cibo valde calido, instar aphrodisiaci, *Loxias* vesci Cl. Auctor existimat, quo ad coitum et generationem nouae prolis in tam frigida tempestate opus habent. Icon hic data est bona.

p. 69. 5. COLINI *descriptio quorundam Encrinitarum, in museo Serenissimi Electoris Palatinatus reperiendorum.* Primo negat Cl. Auctor *Vorticellam Encrinum* LINN. esse protypum huius petrificati: verum *Palman* marinam a GÜETTARDO *) et ELLISIO ** descriptam, illius *Encrinitae*, qui caule sit angulato, habendum esse protypum; alterius vero caule cylindrico, etiamnum ignorari. Deinde ipsos *Encrinitas* describit, et iconibus illustrat. Prima est noua species *caule ramoso*, articulis quinquangulis, Altdorfi in Calcareo inuenta: eam Cl. Auctor elegantibus iconibus illustrat eiusque structuram in minoribus partibus describit, quam tamen hic, cum iconum explicatione egeant, persequi non possumus. Alterum exemplar, quod hic natu-

*) Mém de l'Ac. Roy. de Par. 1755.

**) Phil. Transf. Vol. 52. P. I. 1761.

naturali magnitudine depictum est eiusdem speciei, quam LINNAEVS *Helmintholithum portentosum* *) nominat; sed notabile propter insignem magnitudinem, quam habet sex pedum et septem pollicum, caulis versus caput s. fasciculum confertum, crassior fit; rami in fasciculo sunt expansi. Deinde de Protypo Encrinitae differitur, atque existimat illum fuisse Polypum marinum, qui eandem facultatem se multiplicandi habuerit, quam polypi aquarum dulcium s. *Hydrae* LINN. possident. Quod praesertim ex eo, quem HIEMER descripsit, Encrinita demonstrare suscipit Cl. Auctor. In Encrinita, qui in Museo Electorali reſeruatur, in corona etiam parua vestigia conspiciuntur, quae de ramificationibus animalis testantur; sed in caule Cl. Auctor nullum communicationis cum alio signum inuenire potuit.

In encrinitae corona, cuius rami conferti erant, obseruauit, articulos ramorum iuxta basin integros esse; postea vero in media parte ad longitudinem diuidi ita, vt altera pars alteram inuicem suscipiat, vt in Mytilo Crista galli: eandem structuram nos in omnibus encrinitis, corona clausa instructis reperimus.

Denique fossile petrificatum depictum et descriptum sistitur, quod multiradiatum, ex articulis multis teretibus compositum est: Versus basin radii sunt conuoluti, ita, vt ne eorum coniunctio quidem conspici queat. Ex quolibet articulo vtrunque alternatim radius minor, setae articulatae similis exoritur. Pappenheimii in calcario scissili repertum est hoc exemplar. In opere Knorriano **)

A 4

similia

*) vid. EIVSD. Syst. nat. III. pag. 169. Descriptum est ab HIEMER in diff. Caput Medusae, nouum diluuii vniuersalis monumentum. Stutgard. 1724.

**) *Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur* 1755. Part. I. tab. 34. a. n. I. et Part. II. Sect. 2. 1769. Tab. L. I.

similia descripta sunt. Existimat Cl. Auctor protypum huius petrificati esse asteriam seu alium polypum marinum, etiamnum incognitum. Nobis structura videtur affinis esse *Sertulariis* vel *Corallinis* LINN.

p. 106. 6. IOANNIS DANIELIS FLAD *historia naturalis vermis ceraforum, et inde natae muscae*. Primo ostendit, muscam hanc quidem, a REDI, REAUMVR et LINNAEO esse indicatam: sed imperfecte tantum descriptam. LINNAEVM perperam *Muscae Cerasi* tribuere habitaculum in *Cerasi* nucleis, cum pulpa tantum vescatur, et, vti etiam iam LINNAEVS habet, ex verme *Curculionem druparum* nasci. Obseruauit Cl. Auctor locum, vbi vermis ex ouulo natus in cerasum ingrediatur, esse prope a pedunculo, vti etiam vulnusculum conspiciatur, et interdum duos vermes in vno cerasi fructu vidit. Non vero omnia cerasa, sed dulcia et ea ex acidis, quae pulpa rubra instruuntur, hac larua infestari vidit. Cutis exterior segmentis duodecim distincta est; pedibus caret, interim non in dorsi latere serpere potest. Larua satis adulta, ex ceraso per idem, quo in illud intrauit foramen, egreditur, et sub terra in pupam ouatam luteam mutatur, ibique per decem menses latet, atque tum musca prouenit, alis fasciis quatuor inaequalibus fuscis instructa, vti LINNAEVS eam describit. Post sex dies femina, quae aculeo instruitur, ouis ponendis apto, in ceraso oua intrudebat. Iconibus bonis, *Larua*, *Pupa* et *declaratum insectum* naturali et aucta magnitudine delineatur; id vitii tamen subrepisse videtur, vt antennae, quae setariae esse deberent, hic ramosae pictae sint.

p. 116. 7. *De propensione plantarum ad copulam*, Auctore FRIDERICO CASIMIRO MEDICO. Propensione

sione hac ad copulam plus, quam irritabilitatem, potius sensus cuiusdam speciem indicari putat Cl. Auctor. Prima parte observationes suas tradit, quibus accessionem staminum ad pistillum, huiusque iterum ad illa, irritabilitatem utrorumque, et affinitatem harum proprietatum demonstrat. Deinde has proprietates non incongrue instinctum artificialem plantarum nominari posse asserit, regulasque tradit, quae in observandis his phaenomenis attendendae sint.

Magnus numerus plantarum est, in quibus supra dictas proprietates tum post alios Auctores, tum solus et primus observavit, e quibus quasdam tantum nominare licet. In *Hyoscyamo aureo*, et p. 117. reliquis huius generis speciebus, stamina primum pendula, polline maturo, erigi, et successive antheris ad pistillum moveri. Successivum motum etiam in *Fritillaria persica* (nos in pluribus *Fritillariae* speciebus) *Polygono orientali*, et *Tamarice gallica* vidit.

In *Tilia Americana* inter nectaria et petala posita stamina, a pistillo nectariis separantur, sed maturo polline, antherae subito ad stigma accedunt. In *Ruta graeolente* et *chalepensi*, quatuor stamina exteriora simul ad stigma moventur, atque haec succedunt quatuor minora interiora.

Zygophylli Fabaginis stamina, aperiente se flore aequalia sunt longitudine; postea ea, quae germi- ni sunt maxime propinqua, celerius crescunt, filamentis in arcum flexis; quibus adultis, singula successive extenduntur, et antherae pistillo apponuntur.

In *Agrimonia Eupatoria* et *repente*, corolla p. 122. evoluta, stamina simul reclinantur; antheris autem rubentibus redditis, eleuantur stamina simul et pistillo propiora fiunt; et tum inferiora sex stamina persistunt, superiora vero magis in fornicem

flexuntur super pistillum. Atque hic motus ce-
riter a horis matutinis ad tertiam pomeridianam
absoluitur. Similem motum in *Rivina humili* et
laevi vidit.

p. 123. In *Nigella sativa* pistilla stigmatibus recurvan-
tur et ad stamina mouentur, copula perfecta, ite-
rum stigmata recedunt. Cum vehementia quadam
pistilla in *Sida Indica* petala reflectunt, eriguntur
et staminibus se uniunt. *Turnerae ulmifoliae* pi-
stilla tria conferta et erecta stigmata primum sunt,
deinde vero, polline perfecto, expanduntur, et
pollen quasi inspirant. Hunc Pistilli motum ad
stamina in *Passifloris*, *Oenotheris* et *Hibisco*
observauit.

p. 126. In *Boerhaavia diandra*, quae vero saepe triandra
est, motum staminum et pistilli ad se inuicem vidit.
Mane et vesperi vtraque ad latera floris posita sunt;
circa horam decimam stigma in medium florem
mouetur, illic staminibus huc flexis obuiam venit, et
tam firmiter adhaeret, ut adnata videantur. Atque
hunc motum in *Maluaceis* floribus omnibus con-
spici asserit.

p. 128. Irritabilia stamina vidit in *Berberide vulgari* et
orientali, in quibus, attacta filamenti basi illud su-
bito antrorsum ad pistillum flexitur: quin imo si
efflorescentis floris petalum decerpitur, totus
flos contrahitur et stamina stigma amplectuntur.
Kalmiae latifoliae et *angustifoliae*, parum eleuatis
filamentis, antherae explodunt pollen seque ad
pistillum flexunt.

In *Cisti* speciebus quoque staminum irritabili-
tatem observauit. *Cisti Helianthemis* filamenta iuxta
basin irritata, lente versus petala expanduntur,
postea vero vehementius ad pistillum contrahun-
tur. Matutino tempore, etiam in abrupto a stirpe
flore et tempestate frigidiuscula haec irritabilitas
maxime

maxime est conspicua. In *Cisti apennini* filamentis hic motus celerior et vehementior est, vti quoque in *Cisto ledifolio*, vbi vehementer expansa filamenta, celerrime etiam ad pistillum recedunt. In plurimis ad *Syngenesiam* LINN. pertinentibus plantis, irritabilitas staminum obseruatur.

In *Martinia* et annua perenni et *Bignonia Catalpa* p. 268. stigmata irritabilia sunt. *Lobeliae syphiliticae, erini*, et p. 133. *erinoidis* stigma, non est truncatum, vti LINNAEVS dicit, sed bifidum, lobis femirotundis pilosis: hi lobi expansi, attacti protinus contrahuntur.

Has proprietates, irritabilitatem et motum, sibi p. 135. affines esse, demonstrat ex plantis, in quibus filamentum mobile, anthera irritabilis est, vti in *Vrticis Spinacia, Parietaria* et *Atriplice patula*: et ex iis, in quibus stamina et irritabilia, et per se mobilia sunt: huc pertinent *Forskohlea tenacissima*, cuius floris partes tomento tantum secum connexa sunt, stamina autem, quae tantum semper octo adsunt, prius p. 267. arcuata lente mouentur, donec lanam anthera egressa sit, quo tempore, subito exsilit, pollenque cum sonitu explodit. *Cistus incanus* et *albidus* stamina mobilia offert, quae, si irritantur, sensibilitatem monstrare videntur, et stigmati firmiter opponuntur. Idem de *Agrimoniae, Parietariae* et *Sidae*, quae supra nominatae sunt, staminibus valet.

In altera huius tractationis parte primo enu- p. 146. merat Auctores, qui quaedam horum obseruatorum iam instituerint, a IO. BAVHINO*), (a. 1600.) ad LESKIVM**) vsque (a. 1773.). In *Cassia*, cui LINNAEVS motum pistilli tribuit, contrarium vi- p. 150. dit, cum *Cassiae* pistillum semper in eodem sit situ.

ADAN-

*) Hist. plantar. vniu. Tom. II. p. 976.

**) Diff. de generat. vegetab. vid. comm. nostr. Vol. XXI. p. 558.

P. 155. ADANSONVS, praeter alia, etiam *Sesamo* omnibusque stigmatate bilobo instructis, irritabilitatem stigmatis adscribit: sed in *Sesamo Indico* insensibile stigma, vti in aliis multis stigmatate bilobo Cl. Auctor vidit.

P. 164. Altera sectione Cl. Auctor iudicat, a veteribus non cognitum fuisse sexum plantarum, atque optime demonstrat IOACHIMVM IUNGIVM, Germanum, cuius merita male plerumque aestimari solent, primum veram de partibus floris sexualibus ideam habuisse: GREWIVM quidem antheras recte partes masculinas habuisse; sed in Syngenesiae floribus minus recte pistillum dicere masculam partem. CAMERARIUM deinde, vti iam KOELREVERTERVS probavit supra, suis experimentis, itemque IOANNEM FRIDERICVM BURKHARDVM, Iungianum inuentum confirmasse.

Tertia sectione, ex motu radices versus pinguem terram, adscensu caulis, motu multiplici foliorum, florumque adscensu probare iannitur, esse motum arbitrarium atque sensum in plantis, quum adsint obseruata, (quae vero Cl. Auctor non commemorat,) motum non oriri, neque impediri a causis internis. (Interim negari non potest frigore et calore, humida aut sicca tempestate magnopere vel mutari, vel tolli motus diuersos, in plantis.) Perperam ideo plantis denegari sensum, inquit, quoniam neruis careant, vel vitam, cum circulo humorum priuentur; ad haec medullam plantarum cum ramis, neruis esse analogam, neque vitam

P. 190. cogitari posse sine sensu. Causam denique irritabilitatis, motus voluntarii, et sensus, esse substantiam, a materia diuersam, atque iuxta omnia analogiae praecepta esse animam vegetabilem. Mechanismum plantarum, neque ad praecepta
dynamica

dynamica neque physica, sed ex organisatione, vi actiua in motum posita, explicari debere.

Nos nostrum consulto suspendimus iudicium de hac denuo, multoties tamen ab aliis philosophis iam dicta, de plantis opinione: phaenomena autem congrue ad LINNAEI, Phil. Bot. §. 133. p. 88. HALLERI et LUDWIGII praecepta explicari posse existimamus.

8. *Observationes Botanicae*, Auctore EODEM. Pri. p. 193. mo nouas species describit, vt *Verbenam obletiam*, p. 194. tetrandram, stigmatibus bifido, caliceque quinque aristato. Indicata iam haec planta supra *) a nobis est, cum a ROZIERO collectas tractationes recensebamus: *Oenotheram repandam*, foliis inferius profunde sinuato dentatis superius plerumque integris ouatis tomentosis. Similis haec est *Oenotherae sinuatae* LINN. Mantiss. II. p. 228. Syst. Nat. XIII. p. 296. sed differt foliis omnibus summe repandis, sessilibus et amplexicaulibus, atque eo, quod diu dormiat, noctu autem vigilet, quod contrarium in *O. sinuata* reperitur iis denique characteribus, qui in definitione indicati sunt:

Cotyledonem integram; octandram, foliis omnibus integris magnis crassis, cochleatis margine aut integro, aut parum crenato floribus quadrifidis. In eo praesertim a *Cotyledone laciniata* LINN. differt, quod *integra* multos ramos floriferos protrudat, *laciniata* autem vnicum tantum caulem floriferum. In Catalogo horti Parisiensis manuscripto species haec iam indicatur, *Cotyledon aegyptiaca frutescens foliis subrotundis, flore coccineo umbellato*. Ill. ADANSONVS *Kalanchoe* nominat, et a *Cotyledone* hanc et *laciniatam* separari vult: *Arenariam muscosam, caule repente, flore longe pedunculato, unico nudo*, p. 200. p. 202.

*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 276.

nudo erecto: foliis oppositis ouatis, petiolatis, ultimis sessilibus, inferius glaucis, superius villosis. Forte ab Ill. HALLERO *) indicata est. Martio floret. *Nepetam mollem*, verticillis pedunculatis, trunco adpressis, crassissimis, tomentosis foliolis oblongo lanceolatis angustis: differt a *N. violacea*, quod procumbens, et tomentosa sit, bracteaeque angustissimae, lanceolatae.

p. 235. *Alceam procumbentem, caulibus procumbentibus, foliis petiolatis, aut erectis, aut patentissimis*. Propinqua est *Maluae roseae*, folio subrotundo etc. MORISONI Hist. Plant. P. II. p. 524. differt tamen in eo, quod haec fere nullos, *Alcea procumbens* vero multos habeat caules: interim tamen Cl. Auctori hae duae plantae vnam eandemque speciem constituere videntur.

p. 244. *Ambrosiam fruticosam*; cui masculi flores compositi sunt, et stamina tota in tubum cylindricum connata, ut inde, *monadelpho* — *syngenesia* oriatur: feminei, infra masculos in vna spica. Propensus est Cl. Auctor, ut nouum genus ex hac specie constitueretur, cum vero reliquas *Ambrosias* disquirere Ei non licuerit, differentias indicat. *Ambrosiae fruticosae* receptaculum est paleaceum, femineis floribus nullus calix, germina autem duo, stili duo et stigmata quatuor, nux bilocularis, et semen oblongum. Quae omnia in *Ambrosiis* alia sunt, ut ex LINNAEI Generibus cuique cognoscere licet. Specificum characterem hunc tradit Cl. Auctor

p. 247. *Ambrosia fruticosa* trunco lignoso, ramis herbaceis, spicis solitariis multis; quibus differentia fructificationis, iam indicata addatur.

Nouum

*) Hist. Stirp. indig. Helu. p. 386. sub no. 877. Alsine, caule erecto, prostrato, foliis ouatis, a qua tamen differt, cum, HALLERO ipso auctore, sit tenerior, et pedunculis longioribus, foliis lanceolatis instructa.

Nouum genus praeter *Spielmanniam*, fecit *Pyre-* p. 237.
thrum, quod inter *Spilanthum* et *Bidentem* medium
 esse vult; caractere hoc: *Receptaculum conicum, pa-*
leaceum, paleis persistentibus, corollis quadrifidis sae-
pius quinquefidis mixtis. A Cotula, Eclipta et Verbesina
praecipue differt, defectu florum femineorum. Huic
generi species has subiicit: 1) Pyrethrum bidens, co- p. 241.
rollulis omnibus quadrifidis, foliis ouatis, parum re-
pandis hinc inde crenatis. Haec noua species est,
a Cotula pyrethraria LINN. Mant. I. (quam in Syst.
veget. XIII. omissam, vel consulto neglectam de-
prehendimus) differt foliis carnosiss flore luteo.
2) Pyrethrum spilanthum, quod est Spilanthus olera- p. 273.
cea LINN. quae etiam a Cl. IACQUINO in horto Vin-
*dobonensi Vol. II. p. 63. tab. 135. *) descripta et de-*
pieta est. Pyrethrum acmellam, quod est Verbesi-
na acmella et pseudo acmella LINN.

Praeterea characterem genericum *Lantanae* p. 220.
 mutauit et correxit ita: Flores multi, longi, in ca-
 pitulum oblongum pedunculatum collecti. Calix,
 antherae et stigmata minima. Drupa tribus locu-
 lamentis composita, quorum duo superiora semen
 continent. Species huius generis assumit sequentes,
 quorum synonyma, descriptiones et icones dat, et ab
 aliis data emendat. *Lantanam trifoliam LINN. Lanta-*
nam involucratam, caule inermi lignoso, foliis op-
positis, orbiculatis, leuiter crenatis, spicis foliosis,
floribus carneis mutabilibus. PLUKEN. Almag.
Tab. 114. f. 5. Lantanam flauam, foliis cordato p. 225.
acuminatis, rugosis, pilosis, profunde crenatis,
crenis repandis: corolla flaua non mutabili. DILL.
hort. Elth. tab. 57. f. 66. Lantanam splendentem p. 226.
foliis ouato oblongis, splendentibus, floribus flauis,
in croceum colorem mutabilibus. DILL. H. E.
 t. 57.

*) Indicabimus pretiosissimum hunc librum, vti et *Flo-*
ram Austriacam EIVSD. proxime.

t. 57. f. 67. *Lantanam mistam*, foliis ouato acumina-
tis rugosis asperis colore florum a croceo in
purpureum sese mutante DILL. H. E. tab. 56. f. 64.
Lantana camera foliis ellipticis, non multum rugo-
sis parumque asperis, ramis iunioribus aculeatis,
colore floris e citrino in rosaceum mutabili DILL.
H. E. p. 65. tab. 56. fig. 65. *Lantanam sanguineam*
caule aculeato, aculeos tractu temporis deponen-
te, colore sanguineo, limbo florum solo ex colore
croceo in sanguineum se mutante. *Lantanam acu-
leatam* LINN. Pluribus ostendit Cl. Auctor in Lan-
tanae speciebus colorem florum certum praebere
signum specificum.

p. 204. Praeterea etiam *Teucris* tredecim species ad
exempla ex horto Palatino describit, *Teucrium Asia-
ticum*, *masiliense*, *scorodoniam*, *marum*, *multiflorum*,
flauum, *purpurascens*, seu *flauum* var. β. LINN. *lu-
cidum*, *virginicum*, *chamedrys*, *lusitanicum* et *polyce-
phalon*, quod BARRELIERS *) habet; est hoc ca-
pitulis multis, per totum ramum pedunculatis, im-
bricatis oblongis: calice dentibus rigidis, erectis,
inaequalibus et summe villosis; staminibus distan-
tibus, flore incarnato rubro. Ex his descriptis plan-
tis, delineatae sunt nouae species, quas diximus, de-
inde *Teucris*, *asiaticum*, *Masiliense*, *purpurascens*, *lu-
cidum*, *virginicum*, *polycephalon*; *Pyrethrum spi-
lanthus*, *P. Bidens*, et *P. Acnella*.

p. 267. Vtrique huic commentario Cl. Auctor adnota-
tiones quasdam addit, in quibus vel recentissima
botanicorum obseruata cum suis comparat, vel
quaedam certius definit, quorum notatu digniora
nos suis locis inseruimus.

9. De

*) Plant. p. Galliam et Ital, obseru. pag. 35. n. 338.
lc. 1083.

9. *De generatione Filicum observationes, Auctore* p. 275.

Cl. DE NECKER. Cl. Auctor, cuius merita in botanicam ex aliis scriptis, deliciis nempe Gallicis, et Physiologia muscorum, quae etiam a nobis indicantur, satis cognita et perspecta sunt, in hoc commentario notiones illic demonstratas ulterius confirmare studet, atque negat, omnibus plantis esse datas partes sexuales, neque vlla in iis reperiri signa foecundationis.

Prius suas tradit observationes, postea rationes et definitiones fructificationis in filicibus ab aliis datas recenset: quae, cum mirum in modum a se inuicem discrepent, incertam omnem de sexu filicum esse doctrinam, demonstrant. Cl. Auctor mauult, p. 286.

Cryptogamiam LINN. dici *Agamiam* s. *Pseudogamiam*, cum in iis plantis sint limites vegetationis, ut in vermibus, ab Ill. MÜLLERO descriptis, animalitatis: iisque animale et vegetabile regnum attributis physicis iisdem vniri: Se nouissime obseruasse corpora organisata, in quibus signa sint mineralis et vegetabilis; alia, quae vegetabilia et animalia simul sint, ideo, quod vegetent, et crescant succo nutritio, qui iuxtapositione iis adhaereat, et origo eorum tam vegetabilis, quam animalis sit: Quenam autem haec sint corpora Cl. Auctor nondum indicat.

Omnia corpora organisata oriri, vel concursu p. 287: duplicis sexus, ut animalia maiora; vel sine foecundatione, sola euolutione, uti vermes, polypi vulgo dicti, et cognita vegetabilia: non itaque opus esse copula in plantis. Plantas in duo ordines distribuit, quorum prior viuiparas comprehendit, alter ouiparas. Ouiparae 1) vel se continuant attributis visibilibus, i. e. si semen quadam parte adhaeret plantae, a qua oritur, vel inuisibilibus, si principia plantae latent sub terra, donec quodammodo

auſta ſint: 2) vel floriferae ſunt, ſed ſemina non proferunt; 3) vel ne veſtigium quidem fructificationis oſtendunt. Viuiparae 1) quaedam attributa oſtendunt, quae pro mare et femina habentur, etſi minime experientia id probatum ſit. 2) vel in extremitate aut folii ſuperficie partes habent, quas ſystematici fructificationis eſſe dicunt. 3) vel parte fructificationis, et ſemine carent.

p. 290. Etſi Cl. Auctor MORISONI, TOVRNEFORTII et DILLENII experimenta, quibus ex puluere filicum nouas ſtirpes eiusdem generis naſci viderint, non negat: dubitat tamen ſemper hanc rationem locum habere: nam ipſe cum puluere *Oſmundae regalis*, *O. lunaris*, *Ophiogloſſi vulgati* et *Pteridis aquilinae* idem experimentum inſtituit, quod tamen ſucceſſu caruit *). Contra vidit in duabus diuerſis plantis, quas vero, quod dolendum, non nominat, verſus extremitatem partis carnoſae protuberantiam cinctam extremitate inferiore cauliculorum plantae ſolitarium. Perforabat haec protuberantia quaſi cuticulam, ita, vt auſta fieret planta, ſimilis ei, a qua producta erat. *Pteridis aquilinae* ſubſtantia carnoſa nuda eſt, atque fibris interſtinctae, et producit aliam, quae verticaliter ad ſex pollicum longitudinem ſub terra aſcendit, propriisſque radicibus inſtruitur: ex qua duo, nudi, plumis ſimiles, albeſcentes ramuli oriebantur, qui euoluti plantam integram offerebant, eademque pars verticalis poſtero anno nouas plantulas producebat: atque ita propagatio continuatur, donec ſubſtantia corticalis plane ſit exhausta. Quodſi filicis huius

pars

*) At vero non licet propter experimentum, quod effectus nullus ſequutus eſt, dubium reddere euentum alius experimenti: quoniam multae cauſae aſſeſſe poſſunt, quae ſucceſſum impedierint, quibus ſublatis euentus rei felicior futurus eſſet.

pars carnosa in locis cultis aratro aut alio modo transuersim in plura frustra dissecetur, multiplicatio augetur. In quolibet frusto enim collectio novarum plantarum latet, quae non nisi nutritione egent, vt euoluantur: numerus indiuiduorum, quae ex singulo frusto oriuntur, a substantia corticali pendet, et a multitudine vasorum, succum nutritium sugentium. Quae cum fiunt, substantia corticalis denuo formatur, et augetur, ita, vt hoc modo generatio continuet, absque pollinis foecundatione.

Osmundae regalis pulvis satus, vti diximus, non germinauit, sed ex plantis in cespitibus iuniores plantulae productae erant. Non enim posse, ait Auctor, plantam ex femine natam, primo anno iam in cespite collectam reperiri. Reliquae plantae huius classis *Polypodium mas*, *femina*, *fragile*, *dryopteris*, et similes *Osmundae regali* nectuntur in generationis ratione. Squamas in *Polypodio mare et femina* defendere putat substantiam corticalem a terrae iniuriis. Pars carnosa *P. dryopteris* est inaequalis, atque rugas fertiles emittit, ex quibus nouae plantae fiunt. *Polypodium vulgare* similiter in parte carnosa, subterranea squamis, cingitur, quae postea nuda fit, et tuberculata, tuberculis primo truncatis, post conuexis: tubercula haec sunt principia nouorum indiuiduorum.

His praemissis *Marsilaeae* characterem dat, qui p. 296. Linnaeano est plane contrarius: *Marsilaeae*, pro *mare* pili tres, aut quatuor articulati ab initio versus apicem incuruiusculi, dein rectiusculi, ex papillis singulis supremae foliorum paginae egredientes. Pro *femina* globi in medio radicum infimae paginae, solitarii vel plures, in quorum cauitate corpuscula plura. *Gemmatio* ex apice plantae ba-

fique laterali oppositorum foliorum, solitaria, ouata, ac pediculata. Speciem, quam vnā tantum assumit, dicit M. *Saluinoidem*, foliis oppositis, vtrisque pilosis, longe radicatis globiferis: tab. XIX. picta est. Omnino itaque LINNAEO repugnat, atque negat antheras et stigmata, eosque glomerulos, vel stylos, quos LINNAEVS, in Mantissa p. 506. describit, nihil esse, nisi eminentias foliorum pilis instructas. Comparat iam GVETTARDI obseruationes cum suis iisque adsentitur, praeter quod negat in globulis maioribus et superius sitis contineri antheras, et in minoribus et inferioribus pistilla, vti GVETTARDVS contendit: nam fecundationem sic non fieri posse, cum insuper globuli hi nunquam dehiscant, pistillaque careant stylo et stigmatibus. Praeterea separandam existimat Auctor *Marsilaeam* a filicibus, quoniam et eae partes, quas loco antherarum et pistilli habet, alia ratione structae sunt, et, quod praecipuum est, quoniam principia nouae plantae non circinata s. conuoluta sunt, vti in filicibus, sed eo modo se euoluunt, quo plures leguminosae plantae.

P. 303. *Zaluzianskiae* *), nomine intelligit *Marsilaeam quadrifoliam* LINN. cum characteres omnino a priori genere differant. Est enim huic corpusculum commune ouale, coriaceum, biloculare, planiusculum filamentum terminale ad latus plantae, duo corpuscula, quae sexus vterque putantur. *Germatio*. Initialia plantae coarctata, circinata, semper praesentia. Speciem dicit *Z. marsiloidem*, foliis terminalibus quaternis vtrisque glabris, capitulo petiolari solitario.

Iam

*) Dictum hoc genus est, in honorem ZALVZIANSKY, Botanici Poloni: qui *methodum* herbariam, 1592. Praegae edidit.

Iam de *Equisetis* agit Cl. Auctor, quae duplices p. 304. furculos, alios subterraneos, quos alii perperam radices nomenclant, alios extra terram emittere dicuntur. In quolibet articulo, si is transsecatur, medio foramen, cinctum parvis punctis sub forma radiorum, conspicitur. In peltis caulis floriferi *Equiseti* continetur pulvis, qui, ipso Auctore fatente, microscopio disquisitus, elastica vi pilorum, quibus affixus est, exsiliat. Saepe ex furculo subterraneo nihil nisi caules steriles, sine capitulo florifero germinant: systematicos itaque inductos esse in errorem, opinantes, caules floriferos et steriles ex diversis nasci radicibus.

Recensitis et impugnatis HALLERI, OEDERI, p. 309. ADANSONI et LINNAEI definitionibus de partibus fructificationis in equisetis: putat ex furculo subterraneo, tanquam parte essentiali, reparari perpetuo plantam, unde gemmae protrudantur, et cuius fertilitas non solum a quantitate vasorum nutrientium in articulis positorum, verum etiam a congruo situ ipsius furculi pendeat. Si enim nimis profunde sub terra latet, principales partes euolui nequeunt. Hos furculos subterraneos in *Equiseto*, uti quoque in *Tritico repente*, esse *Hydras* regni vegetabilis. Denique Equiseta a filicibus separari vult, propter fructificationis diversam rationem, seminaque iis denegat. Ex his sequi putat Cl. Auctor Filices, Marfilaeam, Zaluzianskiam et Equiseta ex systemate sexuali esse excludendas, atque Filices polyparos esse, pulueremque in foliis reperiundum, non semen sed semini quidquam analogum esse. Depicta hic sunt Marfilaea, Equisetum aruense et hyemale.

10) *Observationes Gnomonicae*, Auctore Cl. p. 319.

WALLOT.

II.

L' art du destillateur des eaux fortes. Par Mr.
DE MACHY à Paris MDCCLXXIII. fol. c. fig.
aen. 12. pagg. 198.

i. e.

Ars destillandi spiritus acidus. Auctore Cl. DE
MACHY.

Continetur hoc opere non solum, vt inscriptio docet, ars destillandi spiritus acidus vitrioli, nitri, salis et aceti, sed exhibentur insuper praecepta in copiosiori praeparatione spirituum inflammabilium, aromaticorum, acidorumque dulcificatorum; nec non oleorum aethereorum et camphorae, aquarum porro abstractitiarum obseruanda; et quae ad sicca quoque et solida producta chemica in copia elaboranda pertinent. Adiunxit praeterea Auctor tum officinarum, in quibus parantur, tum instrumentorum et enchiresium egregiam descriptionem, iconibus nitidis magis illustratam. In his vero recensendis non meri forsitan historici munere fungitur, qui, quae vel vidit, vel inaudiuit, enarrat; sed indicem agit atque magistrum, qui ipse experimenta cepit et cur sic potius, quam aliter procedendum sit, sedulo indagauit. Et quamuis Cl. Auctor modeste fateatur, quum, quae proponit, inuenta sint iam antea, ipsi nullam deberi gloriam, quam forte hanc, quod bene obseruarit, clare descripserit, et ad noua detegenda quaedam viam strauerit, est tamen et huius rei laus certe non vltima.

p. 20. Seligimus vero ex toto opere quaedam, quae in communes vsus cedere posse putamus. Ad aquam fortem parandam laudat potissimum argillam

lam gryseam striis rubris intercurrentibus quasi marmoream redditam. Pluribus tamen experimentis edocet, non acido vitriolico, vt quidam putant, argillae tribuendam esse vim in expellendo acido nitroso vel muriatico. Quibus artificibus puriore, quibus impuriore aqua forti opus sit, enarrat. Ace-P. 36. to destillato cuprum inesse spiritus salis ammoniaci detegit, stannum color opalinus. Enarrat modum P. 36. e sulphure parandi acidum vitrioli.

Bene obseruat liquorem vinosum, e quo velis p. 65. parare spiritum vini, ebullire debere, alias merum obtineri phlegma, quale semper praecedat spiritum vini; inde vero, paullo, vt videtur praecipitanti, infert Spiritum vini vino ipsi nondum inesse, sed produci demum inter destillandum actione caloris in quasdam partes vini iam fermentati.

Purificationem camphorae enarrat multis. p. 76. Alia Summatrana est, alia Borneensis. Vltima vnguinosior, minus sicca, ex frustulis paruis solitariis, semipellucidis fragilibusque constans, calore penetrantem odorem diffundens, tardius, sed cum diuturnitate ardens et extinctionis difficulter capax. Officina pro camphora depuranda Amstelodamensis aream sistit quadratam, decem fenestris, suis valvis claudendis, nimirum a quolibet latere tribus et in aditu et regione aditui obuia duabus, collustratam; in istius areae interioribus viginti exstructi sunt fornaces, octo nimirum, in ynoquoque latere et quatuor in regione foribus contraria. Bini quilibet furni communi vtuntur foco, quem et commune tectum aperit. Cinerarium valde humile. Foci ianua latior, quam altior. Ad singulum furnum parietibus adfixum haeret thermometrum. A latere vtroque forium duo mortaria ferrea consti-

tuta sunt, in quibus vtraque camphorae species commiscetur. In medio mensa reposita est et promtuarium vasorum. Vasa, in quibus camphora depuratur, sunt cucurbitae maiores e vitro tenui albo capacitatis decem vel octo saltem librarum, ad collum inque basi planae, colloque instructae, quod tres quatuorue pollices patulum est.

- p. 80. Essentiale purificationis camphorae requisitum versari monet Auctor in inueniendo temporis momento, quo substantia volatilis liquefacta in vapores abire incipit. Nunc vero esse ait apertis valuis fenestrarum refrigerium admittendum ad partem superiorem phialae, quo condensati vapores praebeant firmam basin, cui et subsequuti vapores sese adiungant, qui alias in fundum vasis refluere.
- p. 89. Spiritum vini ab odore, quem ex commixtione olei aetherei contraxit, quae non raro fieri solet, liberare docet adiectis libris duabus cinerum samentitiorum ad duodecim pintas spiritus sic aromatizati; quae inuicem destillata fundunt quidem vnam pintam odorati spiritus, cui vero ultra novem purissimi spiritus vini succedunt.
- p. 92. Aquae stillatitiae seruandae sunt in lagenis non nimis occlusis, non subere, sed charta leuiter obturatis, quae alias facile corrumpuntur. Asseruatione quoque perit odor empyreumaticus, quam alias fugat quoque lenior calefactio et subsequens magnum refrigerium. Fallax examen spiritus vini fieri posse probat per alcali fixum, si multus tartarus vitriolatus insit; et per puluerem pyrium, si in cochleari ad nimiam altitudinem acruus eius extruatur.
- p. 102. Caementum aquae fortis est argilla in destillatione spiritus nitri indurata in formam lateris rubri,
bene

bene cocti, salia tamen sua adhuc continens. Utuntur eo ad sternenda atria pauimentarii et ad colorum in plantis varietatem producendam olitores.

Terram ad polienda specula et alia corpora, p. 103. quae splendēre debent, vtilem esse caput mortuum a destillatione spiritus nitri cum vitriolo residuum, rubrum, elutriandum elixiuandumque, licet nondum elixiuatum melius sit, significat.

Salis mirabilis GLAUBERI libras triginta quin- p. 112. que obtineri posse ex libris viginti in aqua soluti capitis mortui, quod relinquunt viginti quinque librae salis culinaris cum duodecim libris olei vitrioli destillatae, confirmat. Et Cl. MONTET experimenta laudat, qui ex cineribus tamarisci magna in copia sal istud Glauberianum eduxit. In sale SEIGNETTE quaerit, cur nulla crystallorum figura aequiuoca fiat, si quidem, vt statuunt recentiores chemici, in cremore tartari verum alcali sit vegetabile? Cur istud non mutet figuram? aut quid demum ipsi hic eueniat?

Sal ammoniacum, Aegyptiaco simile, parari p. 120. docet ex muria salis et spiritu vrinoso, obtento ex destillatione substantiarum animalium, scilicet laciniarum panni, serici, lanae vetustae, ossium, similiūque. Et quamuis albidius sit Aegyptiaco, cum fuligine careat, atque hinc a stannariis aliisque artificibus repudietur; monet tamen et horum vñibus adaptari posse quarta fuliginis parte addita.

Francogallorum *Eau de Luce* parari Auctor docet ex spiritus salis ammoniaci caustici singulari lege parati libra vna et tincturae sequentis vncia dimidia inuicem commixtis. Pro tinctura nimi-

rum conficienda recipiuntur Olei succini rectificati drachmae duae, Balsami de Mecca drachma vna, Alkali fixi per horae quadrantem in mortario tritum vncia dimidia, quae mixta digeruntur cum spiritus vini vnciis octo. Spiritum volatilem autem sic iubet elaborari: vt calcis viuae libris duabus vna aquae infundatur; mixta stent per noctem, mane ponderanda, quo quicquid libris tribus defuit, aqua adfusa restauretur. His dein admiscetur salis ammoniaci probe triti libra; destillatio fiat ex retorta ampli colli, quod charta intus obtecta defenderat ab inquinatone, dum massa destillanda immitteretur. Abstrahatur autem libra vna, calore sensim augendo.

In parando sale ammoniaco volatili cretae et
P. 128. alkali vegetabili praefert sodam. Postquam vero Sacchari lactis Heluetici et Lotharingici, salis Acetofellae, Succinique olei ambrae et bituminis Iudaei ex Succini oleo praeparationem exposuit, in Belgio consuetam, agit de purificatione Boracis. Transit deinde ad praeparata antimonialia et Mercurialia.
P. 150. Cinnabarin minio adulteratam cognosci posse monet ex sapore, quem concipiat vitione relictus pulvis. Mercurium sublimatum corrosiuum parari Amstelodami et in Anglia methodo Cl. BOYLDVC. Criminationem de arsenico ipsi addito, quippe quod nullius esset utilitatis, falsam esse iure asserit.

Ostendit compendia, quibus Belgae vtuntur
P. 157. in conficiendo mercurio dulci. Vtrum mercurius praecipitatus ruber minio adulteratus sit, ignis tortura sola non detegit, flauescit enim etiam purissimus, detegit vero eius cera impastati fusio ante flammam lampadis flatu directam in carbonem excavatam, cui fundenda massa inhaeret. Sic enim mercurius auolat, minium vero in globulum plumbeum restituitur. Praecipitati albi mangonium per
amylum

amylum vffio detegit, quae carbonem relinquit; cerussam vero admixtam flauedo prodit, quam calx in vffione residua, auolante mercurio, concipit. Reliqua pertinent ad praeparata plumbi, minium scilicet vtrumque, lithargyrium, cerussam, saccharum Saturni, porro ad viride aeris, alumen vffum, atramentumque fumosum.

III.

RVDOLPH AVGVSTIN VOGELS, *weiland Doctor der Philosophie und Arzneywissenschaft. etc. Lehrsätze der Chemie ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von IOHANN CHRISTIAN WIEGLEB Apotheker in Langensalze. Weimar bey Carl Ludolf Hoffmann 1775. 8. Seit. 648.*

h. e.

Institutiones Chemiae, Auctore Cl. VOGELIO; in vernaculam versae et animaduersionibus ditatae a IO. CHRISTIANO WIEGLEB, Pharmacopoeo Longosalsano.

Quum vtique multa contineat, succincta ceteroquin breuitate rerumque copia placens b. VOGELII institutionum chemicarum opus, quae ab experimentorum fide deflectant penitus, vel cum aliqua demum restrictione admitti possint, neque in lingua vernacula adesset aequae rerum locuples compendium chemicum, gratus sine dubio plerisque erit, Cl. WIEGLEBII, de chemica arte, multis iam modis, maxime vero ingenuitate sua, meritissimi labor, quem in vertendo et emendando VOGELII libro posuit. Pertinent autem emendationes istae inprimis ad receptas hactenus opinioniones

niones de eductis atque productis chemicis, ad quae internoscenda in praefatione vt signum certissimum, eductorum difficillima vel adeo impossibilis, productorum perquam facilis resolutio in partes constitutiuas adfertur.

De b. VOGELII laboribus, vtpote alibi *) laudatis non opus est, multa referri. Versabitur igitur potissimum industria nostra in recensendis iis, quae Cl. WIEGLEBIVS adiecerit correxeritque.

- p. 11. Igitur *Gummi Copal* praecunte LEHMANNO ad bitumina refert et plumbo, stanno, ferro, cupro nomen metallorum perfectorum, quamuis ignobilium, recte vindicat. *Platinum* forte iam HENCKELIO notam fuisse coniicit. Mercurii fluiditatem ab intime immixta portione aquae repetit; id quod eo magis, miramur, quum in admittendis partibus constitutiuis, quas non fidissima observatio confirmat, sed ingeniosa excogitatio inuenit, seuerus alias iudex sit. Omnem plantarum efficaciam ab aethereis ipsarum oleis pendere recte reiicit. Saponaceum quorundam vegetabilium principium, rarius ex oleo cum acido sale iuncto, frequentius vero ex alcalino sale ipsi nupto nasci iudicat.
- p. 45. Pro elementis corporum chemicis vulgaria habet quatuor; pro terris simplicissimis, calcaream, magnesiā, aluminosā et silicinā, quarum doctes describit. Primariam terram cinerum plantarum calcaream esse credit et argillaceam, quum selenitem atque aluminis crystallos praebeat; negat igitur eius indolem silicinā; vtque putamus, recte. Vitrescibilis terrae vocabulum ipsi displicet, si proprium esse debeat silicinae, quae omnium minime eo nomine digna est. Principium
salinum

*) v. comm. nostr. Vol. VI. p. 120 sq.

salinum vniuersale, ex quo reliqua salia omnia pro-
gignantur, haud admittit, sed in ignis, terrae et
aquae connubio salium natales quaerit, aut adeo
in sola luminis materia, quae cum ignea conueniat,
ponit. Acidum peculiare aereum negatur, multo-
que magis natura eius vitriolica.

Phlogisti accuratior exhibetur descriptio. Arse. p. 72.
nicale principium terraeque mercurialis BECCHERI
exauctorantur. Praeter alcalina salia, vt ex aliis
Nostri scriptis constat, etiam spiritus vini inter
educta refertur argumento odoris aetherei in seca-
li et fructibus horaeis obuui, vt fermentatio tantum
euoluat, non vero generet.

Salia quoque corporum media in eductorum p. 98.
classe ponit. De igne vberrima legitur animad- p. 112.
versio, cui etiam inest historia magnae istius con-
trouersiae Blackianorum atque Meyerianorum *)
circa causticam vim calcis viuae; cuius quidem con-
trouersiae vltima diiudicatio haec est, vt cum leui
immutatione vtraque inuicem conciliatur, calxque
viua dicatur corpus aere vacuum, sed materia ignea
larga repletum.

Bolo et Argillae eatenus inesse dicit vim aci- p. 181.
dum nitri et salis exturbandi, quatenus vitriolicum
contineant acidum. Recentia odorifera vegetabi-
lia aut parum concidenda aut plane non sunt, in-
primis, si ex concisione odoris gratiam perdant.
Optimus index apti gradus caloris destillatorii, est,
si recipiens vas non calefactum est. WEIGELII
mercurius e spiritu vini gallici obtentus et amalga-
mationi auri impensus in dubitationem adducitur.
Laudatur quoque ratio parandi aquas stillatitias in
vesica ad tertiam vnam partem aqua impleta ex
vegetabili sacco incluso, quem aqua tamen haud
atingat. Cohobatio reprobat. Vt de iusta olei
aethe-

*) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 481. 484. 489. 492. 494.

aetherei copia iudicari possit altera destillatione opus est, reaffusa aqua in priori obtenta ad novam vegetabilis portionem. Exsiccatae herbae plus olei aetherei praebent, quam recentes eiusdem ponderis, quia in recenti statu et nondum siccatae maius pondus habebant.

p. 204. Olea aetherea super calce viua vel sale alcalino abstracta neutiquam mitescunt, immo acriora euadunt et quodammodo destruuntur. Olea expressa aetherea citri, aurantium et bergamottae ab iisdem destillatis differunt admistione substantiae resinosa mucilagineae, quae ipsa paullo et mitiora et gratiora et minus in vini spiritu solubilia reddit. Viridem colorem, quem oleum balsami de Copaiua vel iuniperinum aliquando contrahunt non tam ex vesica cuprea repetit, quam potius ex viridi aeris, quod forte enatum est in canali cupreo per vas refrigeratorium eunte, alias enim semper nasceretur necesse esset in omni destillatione ex vesica.

p. 219. Crystallinam substantiam, quam olea aetherea deponunt, modo oleum crystallino modo coagulatum; modo sal verum, modo camphoram esse comprobat, simulque mentionem iniicit salis essentialis olei macis. Ad olea ab aquis separanda sal culinare his solutum facere; ex oleis per aetatem inspissatis et cum recenti vegetabili destillatis nondum corruptam partem tantum euolui, neutiquam vero accessu noui spirituosii principii ditari omne, multo minus restitui. Nullum verum discrimen esse inter Alcohol ex spiritu frumenti vinique. Oleosas spiritui vini partes inesse admittit ita et aquosas; acidas vero, vtpote nullius idonei argumenti fulcro innitentes, reiecit, omnemque vini spiritum putat esse oleum in aqua, modo haud imitabili, tenuissime solutum.

Emendationem spiritus vini per abstractionem p. 272.
super offam nigram a destillatione liquoris anodini relictam amicus Nostro dubiam reddidit, ubi plus amicitiae, si crederet Ipse, quam veritati tributurus foret. Acidum salis essentialis urinae et rubefacit syrupum violarum et cum creta feruet.

Quum ad expellendum acidum ex nitro semper p. 295.
velit facere ea tantum, quae acidum vitriolicum continent corpora, necessario quoque recipiendum erat etiam arenae, marmori, aliisque istud inhaerere. Sed cur acidum salis nitrosum eiicit? Scilicet exsuperante in copia, si addatur, respondet Noster. Cur vero etiam arsenicum? Vtrum et hoc acido vitriolico scatet? Videtur certe hac in re paullo citius decretum fuisse. Origo vitriolica acidi salis et nitri recte reiiicitur et iure statuitur, acidum quoduis sui generis esse, nec ab alio quodam deriuandum. Acetum aequae pertinet inter educta, p. 332.
atque Alcohol; hoc tamen aceto, ut pars necessaria, non inest. Origines acidorum vegetabilium ex mineralibus, multoque magis similitudines meris figmentis innituntur. Hombergiana tentamina circa inueniendam acidi principii in spiritibus acidis copiam non accurata sunt, nisi aeris inter efferuescendum diffugientis iactura una rationibus infertur. Ipsam naphtham non habet pro producto, fatetur tamen arctius cuilibet inhaerere acidi quicquam quocum parabatur. Loco octo partium Alcoholis ad spiritum nitri concentratiorem dulcificandum duodecim recipiendae sunt; et, ut ex residuo spiritus salis ammoniaci saturatum sal digestivum SYLVII obtineamus, tres potius salis alcalini fixi, quam duo.

Offa HELMONTII nil videtur nisi Spiritu vini p. 381.
separatum alcali volatile. Pro parando sale urinae fusibili laudat methodum Cl. BUCHOLZII, qui illud confecit ex residuo urinae, ad spiritus alcalini expulso.

pulsionem vsque destillatae calcinato, spirituque alcalino saturato et elixiuato, succedente lixiuio
P. 432. crystallisatione. Saturata calcis viuae in acido salis solutio non mutat syrupi violarum colorem. lactura, quam salia alcalina in igne patiuntur, partim referenda est ad aquam, partim ad eam portionem, quae in crucibula penetrat, vt iam alibi Cl. WIEGLEBIUS docuit*). Recte monet alcalisationem nitri per sulphur putatitiam esse. Alcalium origines primordiales denuo inculcat.

P. 439. Cur salis alcalini volatilis ratione ponderis plus abigi videatur ex sale ammoniaco ope salis alcalini fixi, quam reuera inest, tribuit iure aëri, quem alcalinum sal fixum adhuc in se continet. In duabus salis ammoniaci vnciis drachmas nouem cum semisse salis vrinosi veri contineri ostendit, drachmas quinque vero et dimidiam, quas vltra largitur analysis, ex aëris accessu esse. Volatilisatio salis fixi per oleosa addita sublimationis ope peracta negatur, et alcali tunc obtentum volatile e ductis annumeratur.

P. 473. Recensetur quoque praeparatio *salis acidi* HOMBERGII, HENCKELII, LEHMANNI, denique illius, quod Cl. WESTENDORFIVS**) ex duabus drachmis mercurii praecipitati rubri in vncia vna aceti concentrati solutis, ad siccitatem abstractis et forti igne sublimatis, floribus benzoës simile obtinuit. Salis sedatiui natura ammoniacalis merito negatur. Sal ammoniacum secretum GLAUBERI vere est sublimabile, non item vero terra foliata tartari, cuius eleuatio potius est vegetationis quaedam species. Salis mirabilis ac nitri cubici et vulgaris fusio requirunt ignem, quo vasa candent; nitrum flammans vero fusionis verae non capax est; tartarus denique vitriolatus forti igne certe funditur, vti iam MARGGRAAFIVS docuit. Principium arseni-
cale

*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 223.

**) v. ib. p. 218.

cale antimonii fictitium est. Incrementum ponderis calcium metallicarum ex igneis particulis sese adiungentibus repetitur. Parum antimonium p. 547. diaphoreticum cum sapone nigro detonare rectissime negatur. Pyrophorum, praeter sulphur, terram calcaream continere, festinantius scriptum est: et apparet ex sequentibus legendum esse: terram alcalinam, scilicet aluminosam.

Omnium solutionum causam ponit esse materiam igneam. Vim fulminatricem auri sic dicti fulminantis negat ex nitro flammante auro adhaerente explicari posse, quum etiam aurum ex aqua regia, spiritu salis et nitri confecta per aquam calcis praecipitatum hac virtute polleat. Menstruorum p. 562. vis solutrix in quaedam corpora ex partium similitudine declaranda Nostro videtur. p. 573.

Sulphur antimonii auratum, HIRSCHINGIO p. 600. praeunte, quamvis paullo mutata proportione praeparat ex vncia vna antimonii crudi, sulphuris dimidia et salis alcalini fixi vnciis tribus inuicem fusis, dein contusis, aqua bulliente solutis et acido vitrioli diluto praecipitatis. Sic vna eademque praecipitatione optimum statim et tutum obtinetur. *Garayana* extracta essentialia parandi ratio, respectu salium essentialium plantarum, non penitus contemnenda videtur. Omnem praecipitationem nouam quandam esse solutionem, respectu p. 610. certe praecipitati non in vniuersum cum Nostro recipere possumus, quamvis in omni fere praecipitatione nouam solutionem fieri largiamur. Scilicet non semper cum praecipitato, sed cum menstruo pristino quoque fit coniunctio praecipitantis.

Amalgama ferri parare Noster docet ex mercurii sublimati corrosiui partibus duabus in spiritu salis solutis, quibus per vices sensim ingeritur pars vna limaturae martis purissimae. Mixtura p. 642.

calefit cum multo vapore et excusso croco martis rubro quodam atque decantato fluido verum amalgama remanet. Atque haec sufficiant speciminis loco excerpta ex iis, quae WIEGLEBII industria Vogelianiis addidit.

IV.

IOSEPHI IACOBI PLENCK Chirurgiae Doctoris, nec non Chirurgiae, Anatomes atque Artis obstetriciae Professoris Caesareo - regii, publici ac ordinarii in Caesareo - regia Vniuersitate Tyrnauienti. Primae Lineae Anatomes. in usum praelectionum. Viennae apud Rudolphum Graeffer 1775. 8. pag. 309.

Proposuit Cl. Auctor, cui et alia bene elaborata et docta scripta, a nobis quoque indicata, debemus, anatonem et quidem praecipua eiusdem dogmata tabularum forma et interdum quaedam physiologiae et pathologiae monita adiecit, ut inde statim usus anatomes appareret. Postquam quaedam in genere de anatomia Cl. Auctor disseruit, singulas eiusdem disciplinas pertractat ita, ut cuique elenchum doctrinae praemittat, deinde generalia eiusdem consideret, denique ipsas corporis humani partes, ad disciplinam singulam pertinentes, describat et in bonum ordinem disponat.

- Nunc ad singula, quae inprimis notatu digna iudicamus. Ex fibra simplici oritur filamentum, ex filamentis, textus filamentosus, ex hoc, laminae, ex laminis, tela cellulosa et ex hac formantur omnes humani corporis partes. *Syndesmosis* est symphysis membranacea e. g. in fetu coniunguntur ossa parietalia cum frontali syndesmosi. *Synostosis*
- p. 7.
- p. 19.
- p. 20.

stosis est symphysis ossea. Hac ratione concrefcit acetabulum ex offibus innominatis. Color offium p. 21. varius est, mox albido - rubens in offibus compactis, mox albido coerulescens in cranio, mox fusco - rubens in spongiosis, mox albissimus splendens in dentibus. Cuiuscunque offis considerat fitum, figuram, diuisionem, apophyses, cauitates, nexum, vsum et reliqua. Cum de periofteo exter- p. 94. no loquitur, etiam periorbitam et peridesmum nominat. Cartilagine diuifit in *obducentes*, quae p. 95. caua et capita inuestiunt, in *interarticulares* et *vnientes*, quae in immobili nexu manent, vt in nexu offium pubis. Nomina ligamentorum partim ex WEITBRECHTII libris, partim ex aliis deriuauit.

In enumeratione muscutorum adhibuit et nomina Albiniana et alia, nec non ad actionem muscutorum optime semper respexit. Mitra aponeurotica p. 133. cranii musculos temporales et occipitales tegit, frontales vero illam tegunt eique incumbunt. Musculum lingualem proprium, cauatorem linguae p. 140. quoad actionem nominat. Cuticulam diuidit in ex- p. 173. timam siccam et intimam mucosam, quae etiam mucus Malpighianus appellatur. Oritur epidermis ex muco Malpighiano exficcato; admodum porosa et insensilis est.

Vngues oriuntur etiam ex muco MALPIGHII p. 175. exficcato, neruis et vasis destituuntur. In enarrandis visceribus etiam semper fitum, figuram, diuisionem et cetera annotauit et musculos, vasa, nervosque harum partium indicauit. Splanchnologiae adiunxit considerationem et historiam vteri grauidi et fetus.

Sermoni de vasis adnexit circulationem sanguinis in fetu et apte inferuit quaedam de vasis lymphaticis. Contendit arterias lymphati- p. 278. cas

p. 280. cas non dari, sed omnia lymphatica vasa venosa esse. Finiuntur vel in ductum thoracicum vel in venas maiores. Glandulae lymphaticae siue conglobatae sunt glomeres vasorum lymphaticorum tela cellulosa coniunctorum, in quibus haec arteriosa fiunt et iterum venosa facta exeunt. Dolendum est Cl. Auctorem in denominandis arteriis HALLERUM non secutum esse. De nervis breviter exposuit.

p. 300. Glandulas distribuit Auctor in *folliculosas, globatas, glomeratas et conglomeratas*. Glomeratae ex glomere vasorum sanguiferorum constant, praeditae sunt ductu excretorio, sed nullo cauo v. c. lacrymales et mammae. De globatis siue lymphaticis iam dictum est. Habent neque cavitatem, neque ductum excretorium.

V.

Dissertatio nonnulla de liene sistens, quam
Praefide IOHANNE FRIDERICO LOBSTEIN defendit
Ioh. Iacobus Busch, Argentorati.
1774. 8. pag. 32.

CL. LOBSTEIN, cuius eximiam cognitionem anatomicam iam diu admirati sumus, et hic de re aliqua satis obscura, scilicet de physiologia et anatomia lienis, egregia monita, quae nullo modo praeterire possumus, exhibuit. Considerat primum inuolucra lienis, deinde internum visceris habitum, postea physiologiam et denique ex his quaedam corollaria pathologica ducit.

p. 4. Primum inuolucrum, quod ex peritoneo formatur et ex diuersis ligamentis colligitur, duplex, tenerum et extus laeve est. Lamina anterior
omenti

amenti gastrocolici anteriorem partem lienis obducit; ligamentum verticale superiorem, sustentatorium inferiorem, et transuersale, quod a diaphragmate originem accipit et etiam phrenicum appellatur, posteriorem. Quae peritonaei portiones sese vnientes lienem inuoluunt. Duplicem p. 5. hanc membranam esse multi negarunt. MALPIGHIVS duplicaturam hanc primus in vitulino liene spectauerat, in quo Cl. Auctor etiam saepe numero vidit. Maceratione etiam in aliis lienibus duplicem tunicam detexit et vasa inter laminas decurrere animaduertit. Alterum inuolucrum idque p. 6. lienis proprium, mittit ad interiora visceris filamenta et laminulas, quae vasa splenica comitantur illisque robur conciliant.

Enarratis iis opinionibus, quas de fabrica lienaris visceris anatomici tradiderunt, ea refutat, quae iam RVYSCHIVS suo tempore docte reprehenderat. RVYSCHIVS enim veriora proposuit ita, vt eum HALLERVS et ALBINVS sequerentur. Assumit enim lienis fabricam talem, vt eam praeter nervos ex arteriis, venis et vasis lymphaticis compactam esse profiteretur et vitimas vasorum propagines succosas rotundas fasciculatim dispositas esse diceret.

Multos humanos lienes et quoque vitulinos p. 12. Cl. Auctor tam feliciter glutine animalium, cera, sebo mixta et resinis in spiritu vini solutis repleuit, vt materiam ex arteria per venas redientem et vasa lymphatica intueretur. Vitulinos aqua maceravit, humanos vero, detractis et remotis inuolucris, aqua, cui pauculum olei vitriolici addebatur.

Arteria splenica, datis ramificationibus ad pancreas, ventriculum et omentum in ipsam substantiam penetrat, alii rami ad profundam substantiae p. 13.

partem progrediuntur, alii vero in inuolucris flexuose migrant. Vltima vasa partim in penicillos, partim in ramos et arcus curuatos finiuntur. Ex horum arcuum tum parte concaua, tum conuexa progerminant rursus ramuli et penicilli ita, vt rete vasculosum oriatur. Rami, qui substantiam perrepunt illique immerguntur, non in multos ramos diuiduntur, sed iuxta longitudinem totam visceris minores minimosque edunt ramulos. Talis truncus, si ad extremum lienis peruenit, protinus in innumeros ramos diuiditur et in penicillos abit.

p. 15. Penicilli, qui ex trunco abeunt numero octenario interdum conspiciuntur et quilibet penicillus in duos et plures ramulos diuiditur, quorum quisque iterum bifidus aut trifidus est. Penicilli, qui interna ornant, inordinatim posita sunt, illi vero, qui in superficie sedem habent, erecti sunt et cum papillis linguae conueniunt. Penicilli semper a se distant atque omnes arteriae in venas finiuntur, iis exceptis, quae vel in vasa lymphatica mutantur, vel ad nutritionem cellulosae et inuolucrorum impenduntur.

p. 16. Venae recedunt ab arteriis easque deferunt et immittunt inter quemuis penicillum eiusque ramos ramulum venosum. Qui cum sodalibus plexus formant, in quibus penicilli includuntur et ex his plexibus oriuntur venae, quae cum arteriis penicillorum communicant. Ex hac et maiori formatione plexuum oritur elegantissimum rete, ita, vt quaeuis areola quosdam penicillos includat.

p. 17. Ex hoc rete aliae venae arterias legunt, aliae, cum maior numerus venarum sit, vel maiori ramo inseruntur vel in truncum confluunt. Nonnullae arteriae etiam in venas mutantur et omnes venae ope transuersalium ramorum anastomoses alunt et
nouum

nouum rete pro penicillis componunt. Venulae ex retibus collectae maiores truncos arteriarum socios efficiunt, egrediuntur e liene et reliqui rami venae splenicae vsque ad hepar iam innotescunt. Fabrica lienis humani non multum a vitulino discrepat. Plexus neruorum splenicus a ganglio semilunari sinistro prouenit, cui associantur ramuli stomachici posterioris plexus et coeliaci. Vasa lymphatica in satis magna copia obseruantur et in interna lienis superficie et inter duo eius inuolucra. Vasa illa collecta versus vasa sanguifera ingredientia progrediuntur et propinquas glandulas adeunt. Ortus vasorum lymphaticorum adhuc multa obscuritate obtegitur. Paucissima originem ducunt ex cellulosa tela, ex arteriis sine dubio plures, quam ex venis.

Nunc ad physiologica animum vertit atque, vt alii, ex sanguine venoso colligit, sanguinem in liene attenuari. Sanguis enim per longum tempus in liene detinetur perque retia reptat ibique conquassando attenuatur; si vero in venas patentiores venerit, ne plane subsistat, a sanguine a tergo veniente propellitur; vibratio arteriarum vicinarum, motus diaphragmatis et aliarum partium etiam sanguinem promouent. Quaerit Cl. Auctor: anne sanguis lienalis ob moram et calorem et ob particulas putridas, quas a colo accipit, resolui, semiputridus fieri neque amplius coagulari possit? Respondet vero his ita, vt dicat, primum humores nostros, si modo leuissimam actionem experirentur, non resolui neque lienem ab actione vasorum liberum esse; deinde particulas coli putridas etiam non magnam noxam afferre posse, colon solummodo apice inferiori lieni adhaerere, lienemque a pinguedinoso vapore omenti ita obliniri, vt resorptio particula-

rum putridarum arceatur; in obesio denique lienem ita pinguedine eſſe cinctum, vt colon nullo modo tangat. Etiam finem Cl. Auctor non percepit, cur lien particulas putridas a colo reciperet.

- p. 22. Experimentis explorauit, ſanguinem venae cauae mox coagulari et poſt horae ſpatium etiam lienalem ſanguinem coagulabilem eſſe atque ſerum a cruore ſeparari obſeruauit et quidem adhibito ſanguine hominis laqueo ſuſpenſi beneque valentis. Autumat igitur illos, qui ſanguinem lienalem in homine non coagulabilem aſſuſerunt, cadauera morboſa et iam putrida diſſecuiſſe. Deſtillationem ſanguinis lienaris incertam et dubiam cenſet. Attenuare ſanguinem, non vnum lienis eſt munus, ſed, vt HALLERVS bene monuit, lien ſanguinem per arteriam allatum venoſumque redditum ad hepar mittit.
- p. 24. Sanguis non ſolum in liene diu retinetur, ſed etiam alio tempore longe celerius expellitur. Tortuoſa trunci arterioſi directio, vaſculorum minimorum numerus et hinc inſigniter parietum aucta ratio de celeritate multum detrahunt. Tenerrima tela cellulofa, quae arterias inueſtit atque minorem reſiſtentiam in extendendis vaſis ſiſtit, retardat ſanguinem celeremque motum imminuit.
- p. 25. Poſtea ſanguis in laxiores venas irruit atque lentiffimum circulum abſoluit, celerrimeque mouetur, niſi per retia deuia ambulando quodammodo detineretur. Sanguine itaque retento et ventriculo vacuo lien turget et licet WINTRINGHAM venas lienales non magno robore praeditas eſſe dixerit, tamen hoc non de interioribus valet, cum membrana lienis propria robur vaſis internis conciliet. Quoque ad vaſa coercenda atque firmanda multum confert duplex inuolucrum. His omnibus abſolutis, ſanguis tandem lento motu per trun-

truncum lienalem cum meseraico, ut vis hepar penetrandi augeatur, ad venam portarum ascendit. Ventriculo turgido magnitudo lienis minuitur, ille situm mutat lienemque versus anteriora ducit eumque ab actione diaphragmatis liberat; tamen cum omnibus visceribus abdominalibus premitur.

Vi aliqua per totum corpus diffusa eaque agente sanguis tunc ex liene ad hepar promouetur, quod materia indiget ad bilem praeparandam. Sed contractio lienis ingressui sanguinis arteriosi lienalis resistere videretur, nisi iter nonnullarum arteriarum in venas breue et facile, venae ampliores, lien cordi vicinior esset et contractio ipsa arteriosum sanguinem melius promoueret. Ergo sanguis lienalis ad hepar vehitur ad conficiendam bilem et dum cibi coquuntur, eo maior quantitas hepar ingreditur, quo maior sanguinis copia ad bilem perficiendam requiritur. Vasa lymphatica superfluum lympham sanguini reddunt, crudo crassoque chylo in glandulis conglobatis lympham immiscent, ut ille ibi diluatur; denique lymphae pars, postquam glandulas transierit, ad venam portarum transgreditur, quia est communicatio horum vasorum cum lymphaticis.

Nonnulli lienem excindi posse sine detrimento sanitatis et interdum non adfuisse quoque asseruerunt, at hoc nihil nobilitati lienis demit. Tunc enim sanguis alias vias legit et tamen saepe etiam multa mala ex hac lienis iactura oriuntur, digestio corrumpitur, bilis stagnat. Obstructiones et scirrhi saepe in liene nidulantur, quia, ventriculo vacuo, sanguis lentissime mouetur. Hinc creator anastomosis arteriarum inter se inuicem creauisse videtur.

VI.

Experiments upon the human bile: and reflections on the biliary secretion with an introductory essay. By JAMES MACLVRG, M. Doct. London: printed for T. Catell. MDCCLXXII. 8. maj. pagg. 217. Introductio pagg. 64.

i. e.

Experimenta super bile humana, et cogitata super eiusdem secretionem. Accedit introductionis loco tentamen Auctore IACOBO MACLVRG M. D.

Introductio elegantissime pariter ac solidissime conscripta de dissensu dogmaticorum et empiricorum, vere incrementum doctrinae medicae iuvante potius, quam turbante, de vitiis, quibus systemata animistarum, chemicorum ac mechanicorum laborant, ac de officio, observationibus experimentisque factis, doctrinam ad altiorem perfectionis gradum deducendi, exponit: vti simul merita virorum celeberrimorum NEWTONI, quod primus naturalem aequae scientiam ac medicinam a spissis hypotheseum chemicarum tenebris liberaverit, HALLERI, quod primus experimentis docuerit, quantum momentum positum sit in actione nervorum ad oeconomiam animaleam declarandam, et CVLLENI, quod his fundamentis systema superstruxerit rationi quam maxime consentaneum, iustis laudibus extolluntur.

In libro ipso primo quaedam: de sententiis auctorum superioris aetatis ratione indolis saponaceae bilis proponit Auctor: quas quidem non bene fundatas

datas esse ex eo colligit, quod mucilagines vegetabilium et gelatinae animalium aequae bene commistionem olei cum aqua efficiant. Inde perperam auctoritatem BOERHAAVII induxisse HALLERVM, GAVBIVM, CADETVM; cuiusque inprimis experimenta ideo minus sufficientia iudicari deberes, quia tunc pari modo lac sapo dicendum foret, similiter oleum et alcali fixum ope ignis largiens. CL. RAMSAY labores ad finem perducti non fuerunt, idque vitii habent, quod nonnisi bilem animalium solis vegetabilibus nutritorum concernant. Reliquorum experimenta Nostro nonnisi ex physiologia HALLERI innotuerunt, neque tamen plane perfecisse negotium ipsi videntur.

Inde cum superiori, antequam hunc librum p. 7. ederet, hyeme Parisiis in dissectione cadauerum esset occupatus, consilium cepit non quidem ope ignis analysin bilis instituendi, sed potius, minus quidem artificiosa, at vtiliore methodo, in relationem eius cum aliis corporibus inquirendi: et in eo quidem BAGLIVII vestigia preffit, cuius experimentis primas omnino partes tribuit. Primo igitur de attributis bilis humanae agit. p. 8. Odor recentis ingratus, postquam per tempus aliquod servata fuit, mutatur in acutiorem, saccharinum, non ingratum, qualis esse solet cerevisiae fermentantis, similem ei, quem praebet lac in certo gradu fermentationis constitutum, vel serum eius cum succo pomorum, quae *renettes* dicunt, paratum. Postea, tempore non exacte definiendo (interdum post 12 dies), putredo odore ouorum putridorum se prodit. Cum aqua frigida pariter atque calida, aequae ac cum lacte, perfecte miscetur, non autem cum oleo. Acidum vitriolicum meracius si superfunditur, ex instanti coagulum producit coloris pallidi, sed protinus in viridem transeuntis, aequae

ac liquor clarus, cui innatat; agitato vase disparet coagulum, solutioque viridis turbatur. Adfusa aqua liquor egregie viridis supernatat, copioso sedimento viridi ad fundum misso. Aliquando vidit Noster bilem colore et odore theriacae communi similem, quae vitrioli et salis acido soluti colorem fuscum et turbidum acquirebat, coagula vero obscure fusca erant, in nigrum vergentia, et tinctura cum spiritu vini parata rubrofusca, sed pellucida. Spiritus salis bilem non coagulabat, sed tantum solutionem turbidam, similis viridis coloris, efficiebat. Spiritus nitri placentam tenuem offerebat in fluido suspensam, quae in superficie circulo viridi cum bullulis aereis tecta erat, agitatione augendis, sed breui circulus disparebat, solutione fusca turbida relicta, quae quiete, spuma obtegebatur: gradatim color turbidus feri similis euadebat, cum sedimento albicante. Phiala obturata et in loco calido digesta, subito vapor ignei coloris, elasticus, nascebatur, epistomium deiiciens, simulque spuma disparebat; vase rursus clauso et refrigerato, fumi condensati fundum petebant, et liquor successiue saturate viridis reddebatur. In aperto vero vase quamquam fumus et bullulae ut ante prodibant, tamen mixtum, non viridem, sed flauum colorem et pelluciditatem, nec spumam nec sedimentum monstrabat; quod eueniebat, quum post digestionem calidam vas apertum in frigore seruaretur.

Solutio turbida viridis cum acido vitriolico et salis facta, adfuso spiritu nitri protinus colorem fuscum acquirebat, easdemque mutationes subibat, quas acidum nitrosum solum produxerat. Clarus vero liquor ab his solutionibus obtinendus, ad dimidium euaporatus, turbidas solutiones aequabat,
ad

ad ficcitatem inspissatus, pastam nigram acidæ indolis largiebatur, impressiones seruantem; adfusa aqua, acidum disparebat, et materia tenax, insipida, nec spiritu vini, nec aqua soluenda, remanebat. Eadem materia maiori in quantitate ex solutionibus turbidis obtinebatur. Residuum ex solutione nitrosa coloris vel pallide flauescientis, et pelliculae simile, quam albumen oui calori expositum contrahit.

Ex his experimentis copiose satis Auctor Noster p. 18. de actione acidorum mineralium in bilem disputat, monstratque, principium inflammabile in illa aequè ac in aliis corporibus duplicis esse indolis, aliud facile separandum, aliud pertinaciter inhaerens; acidum nitri cum eodem affinitatem quandam alere, in eodem vim tingendi sitam esse cet.

De vi aceti et succi citri in bilem; his protinus p. 29. coagulabatur et colorem flauum acquirebat, liquor vel supernatans maius occupabat volumen, quam acidum adfusum, ergo partim ex bile ipsa secesserat; eius sapor erat manifeste acidus, coaguli autem intense amarus; post 24 horas addito sale tartari effervescebat, coagulum dissoluebatur, et color fuscus redibat: tunc sapor acidus prorsus aberat, et cum ingenti amaritie potius alcalina acrimonia se prodebat. Solutiones hae cum acidis vegetabilibus post tres dies sedimentum solidum nigrum deponabant, supernatante liquore fusco, saporis primo acidi, sed relicta amaritie nauseosa: lac et bilem recens adfusum coagulabant. Hoc coagulum SCHAPERVS et HOMBERGIVS perperam pro pinguedine habuerunt.

Acida mineralia diluta, quamprimum infusa p. 33. fuerint et vas conquassatum, subitissime coagulum producunt (contra assertum HALLERI, quo meracius

cuius acidum minerale fuerit, eo promptius existere coagulum) coloris flauissimi. Spiritus vini subito coagulat, colorem flauum et saporem ex dulci amarum assumit, et sedimentum fuscum superficiei inaequalis, quasi corrugatum, deponit.

Bilis euaporata floccos duros, fragiles, aloe similes, relinquit, qui neque in aqua, neque in spiritu vini exacte soluuntur, sed in alcali caustico.

P. 37. Inde principium coagulabile in bile disquiri Noster, idque idem esse docet, quod in sanguine, lacte, albumine oui, nimirum veram lympham, sed aequae ac in sanguine cum principio inflammabili coniunctam, arctius tamen, quam in sanguine, quia ex bile non ut ex sanguine sponte secedit. Ad separandam hanc partem coagulabilem spiritu nitri dulci usus est, quo productum coagulum albissimum, aqua ablutum, perfectissime concretiones polyposas sanguinis referebat. Hoc coagulum a spiritu vini paullo magis indurescebat, sed ab alcali caustico penitus soluebatur, ac tum addito acido praecipitatum floccosum praebebat: idem coagulum a spiritu salis aegrius soluebatur.

P. 44. Deinde inquiri in combinationem principii tingentis cum lymphâ, quae bile per acida vegetabilia coagulata contingit: acida mineralia concentrata affusa eundem colorem producebant, ac si bili soli addita fuissent. Spiritus nitri dulcificatus colorem perfecte, spiritus vini imperfecte extrahabat, aequae ac aqua sola. Idem etiam de sapore valet.

P. 49. Alcali bili cysticae colorem et amarorem intensiorem restituens euincere videtur, has proprietates in corpore nostro omnino ab eius stagnatione repeti oportere: qua occasione contradictiones a BAGLIVIO et HALLERO admissae arguuntur, hic

hic tamen ideo excusatur, quod propriis experimentis destitutus aliorum auctoritati soli fisis fuerit. Syrupus violarum adfusus neque purae neque cum alcali commistae bili colorem viridem conciliauit. De aëre fixo in bile, qui prodit, si eidem alcali additur, posteaque adfuso acido efferuescentia excitatur. Ferri vestigium nullum detegere potuit, ideoque assertum Cl. DVRATE *), ab eodem colorem bilis proficisci, in dubium vocat.

Iam de relatione bilis ad putrefactionem disputat. p. 61. Contra Cl. GABER adfirmat, se bilem post quatuor a morte dies eiusdem ac recentem qualitatis inuenisse, et vna vtrumque ratione adfusis acidis coagulasse; posse tamen fieri, vt ex dispositione corporis ipsius vel morbo praegresso mutatio quaedam inducta sit: bilem, prius quam putrescat, fermentationem quandam subire, quae odore saccharino se detegat, cet. Tum phaenomena recenset, quae in commistione bilis putridae cum acidis mineralibus concentratis et dilutis, vegetabilibus, spiritu vini, et aqua cum pane remissa, idem in eiusdem euaporatione nouaque solutione in aqua se obtulerunt; in neutro horum experimentorum odorem moschi similem detegere potuit. Ex omnibus p. 68. inter se collatis declarat coagulabilitatem bilis putredine imminui, ipsamque quodammodo cum spiritu vini miscibilem reddi; saporem subdulcem fermentatione praegressa destrui, amaritiem contra augeri, et in hac qualitatem antisepticam, vt in aliis amaris, latere, quamuis putredinem prorsus praeuertere nequeat, cum iuncta sit lymphae adeo in

*) *Traité physiologique & chymique sur la nutrition*, ouvrage, qui a remporté le prix de physique de l'Académie royale de sciences & belles lettres de Berlin 1766. A Paris 1767. 12.

in eam pronae; bilem acidis vegetabilibus coagulata et cum aqua frigida infusam, substantiam exhibere potius antisepticam, quam bilem naturalem, quia tunc aqua minorem portionem lymphae, sed principium amarum perfecte suscipit. Experimentis etiam in carne bubula et veruecina institutis vidit, hanc infusionem diutius putredinem coercuisse, quam vel aquam solam, vel bilem in substantia cum aqua remissam, vel succum citri aqua dilutum. Caro veruecina vero in aqua sola macerata primo fortem odorem acidum sparsit, similem sudoris hominum quorundam, posteaque citius in putredinem abiit, quam reliquae eiusdem carnis particulae: ex quo phaenomeno concludit Noster, inde patere, cur recens caro nauigantibus scorbutto affectis adeo proficua sit.

- p. 78. Ab his experimentis ad varia consuetudina transit. Ex omnibus fluidis animalibus bilis et lac maximam similitudinem habent cum inter se, tum cum vniuersa massa sanguinis, quum vnā eandemque basin habeant, lympham coagulabilem. Vt autem eadem lymphā extra corpus varias successiue mutationes subit, pro varietate circumstantiarum: sic idem in corpore euenit, cursusque circulationis partem oleosam lactis in principium tingens sanguinis, et hoc in idem principium bilis
- p. 84. vertit, qua occasione experimenta varia ad declarandum ortum coloris rubri in sanguine adducuntur. De genesi sanguinis ex vitello oui. Inde noua
- p. 85. scala fluidorum animalium, similarium quidem, sed inter se diuersorum, eo ordine, quo ad indolem animale magis magisque accedunt; lac, vitella, sanguis, bilis. Comparatio partis butyraceae lactis et phlogisti bilis cum oleis expressis ac destillatis vegetabilium. In specie de bile, seu fluido summum
gradum

gradum indolis animalis adepto: quod euincitur ex ipsa eius secretione, eademque aucta in temporibus anni calidioribus et morbis putridis, ex eius augmento in animalibus fame pereuntibus, et ex aduersa parte ex eiusdem indole blanda in fetu, eius aquositate in cachecticis, vel in magna sang. p. 95. guinis penuria: inde conuenientia principii tingentis in sanguine et bile, quae consistit in euolutione partis oleosae. Contra Cl. HEWSON, pinguedinem p. 104. in circulum sanguinis reductam, nutritionem non praestare. Comparatio partis coagulabilis in sanguine (quae a viribus circulationis soluta serum praebet) cum eadem in bile: in hac arctius cum parte aquosa et oleosa coniuncta deprehenditur, quam in sanguine, quare concretiones polyposae, in sanguine generari solitae, in bile non conspiciuntur. Rursus prolixa tractatio de morbis ab aucta et acriori reddita bile ortis, inprimis ex LINDIO.

De duplici genere aeris ex corporibus euoluti, p. 120. inflammabilis, qui putrefactione, et mephitici (alias fixi,) qui fermentatione producitur; et inprimis de teterrimis effectibus prioris, qui concentratissimus neruorum vires celerrime sufflaminando videtur. Nostro hominem interficere posse absque febre, qualis sit effectus venti illius notissimi Samiel.

Licet ergo bilis dici debeat productum gradus cuiusdam putredinis animalis, tamen eodem modo putredini resistere potest, quo acetum, spiritus p. 128. vini et alcali volatile variis gradibus fermentationis, quibus ipsis ortum debent, resistere animadvertuntur. De usu bilis in digestionem alimentorum: Cl. RVSH *) euincit, in ventriculo verum acidum. p. 131.

*) de digestionem. Edinb. 1769. 4.

- dum ope fermentationis gigni; si ergo liquidum hoc in duodeno cum bile concurrit, haec coagulatur; liquor autem intestinalis, aquoso haud assimilis, ex coagulo hoc partem actiuam extrahit, adeoque liquidum constituit efficacius bile ipsa, (iuxta experimentum prius enarratum), quod etiam, saltem interdum, per vasa lactea ad sanguinem deferitur: coagulum vero ipsum cum foecibus excernitur. Largior itaque secretio bilis in tempestate calida id quoque commodi habere videtur, quod hac ratione ex sanguine particulae in corruptionem pronae eliminantur, et acidis ingestis mistio sanguinis restauretur et conseruetur. Hac occasione dubia quaedam de noua theoria aeris fixi in vegetabilibus, eiusque efficacitate in corpore
- p. 140.** animali, mouentur. De influxu vehementiorum animi affectuum in bilem: sicut in vniuersum actiones omnes corporis iis intenduntur, ita etiam aucto motu humorum secretio bilis augetur; quum vero aliae secretiones, v. c. lactis, inde potius reprimantur, aliam subesse causam oportet, quam Noster in nervis ponendam esse suspicatur, quaerens, numne forsan hi affectus eodem modo in secretionem bilis agant, quo electricitas in fermenta-
- p. 145.** tionem? Postmodum copiose satis de temperamento bilioso eiusque causis exponit, praecipue ad Anglos habito respectu.
- p. 154.** De calculis biliariis. Quam difficilis negotii sit, morbum hunc cognoscere, vel si cognitus fuerit, istos soluere velle. Efficacitas graminis aduersus eos valde dubia est, quum constet, lac omnium animalium phytophagorum ad coagulum propcluius esse, quam carniuorum: et si quid inde utilitatis perspectum vnquam fuerit, id potius excitatae, vt ab omnibus vegetabilibus recentibus,
- diar.

diarrhoeae, quae excretionem bilis per intestina liberiores reddiderit, tribuendum videri. Verosimile esse, omnes partes corporis animalis pro basi habere terram calcaream cum acido phosphori coniunctam. De figura, colore, structura cet. istarum concretionum. Quod ad originem illarum spectat, Noster neque bilem cum maiori ad con- P. 169. crescendum dispositione secerni, neque stagnatione sola coagulari putat, neque ipse bilem ad putredinem usque servatam ullo modo concrevere unquam vidit: ex analogia vero cum experimentis sub initium libri enarratis concludit, acidum quoddam ad genesis calculorum concurrere, idque efficere posse putat liquorem ventriculi acscentem, cuius portio quaedam in finem ductus p. 176. choledochi intrare queat, ideoque in bilem in ipsa vesicula contentam vires suas exserere. Experi- p. 182. menta nonnulla in calculis eiusmodi capta. Aquae immixti primo superficiei innatabant, postea fundum petebant, relicta in superficie spuma oleosa; exempti et in acetum iniecti protinus subsidebant, sed siccati aequae ac ii, quod ex sola aqua extracti fuerant, iterum in aqua natabant. Alius calculus durus et politus, 24 horas in aceto digestus, non subsidebat. Oleum vitrioli excitato calore eum in massam glutinosam atram mutabat, aqua fortis adfusa et igni imposita vaporem ignei coloris excitabat, calculus exemptus in superficie erat corrosus et friabilis, et aquae innatabat; spiritus nitri dulcis eum in substantiam cretaceam convertebat, quae adfuso spiritu vitrioli cum excitato calore in massam rubram, dein nigram et gelatinosam transibat. Spiritus vini frigidus eum non aggrediebatur, sed cum aqua forti commixtus colorem viridescentem, calculus autem ferrugineum acquirerebat; in calore vero digestus spiritus vini

eum soluebat, et laminas splendentes; talci similes, innatantes offerebat. Oleum terebinthinae mediante calore cum eodem digestum colorem fuscum assumebat, calculumque fragilem reddebat, licet ipsum non solueret. Alii calculi fir-
 mioris texturae in spiritu vini per 24 horas dige-
 sti non mutabantur; sed addita quadam particu-
 la olei terebinthinae intra paucas horas commi-
 nuebantur liquore fusco et turbido reddito. Alca-
 lia fixa aequae ac volatilia a quibusdam calculis
 colorem fuscum nanciscebantur, eosque molliores
 reddebant: sed idem quoque aqua simplici calida
 fieri perhibent. De colore viridi, ex lixiuio alca-
 p. 194. lino addito ferro obtinendo: quod ex pluribus
 corporibus contingere, experimentis didicit No-
 ster. Tandem de remediis morbum hunc prae-
 cauendi disserit, et, enarratis vitiis saeculi, diaetae
 regulas praescribit, et potissimum usum exercita-
 tionum corporis, aquae frigidae in balneo ac potu,
 et vegetabilium acidorum commendat.

VII.

*Abhandlung einer Privatgesellschaft in Böhmen,
 zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländi-
 schen Geschichte und der Naturgeschichte. Zum
 Druck befördert, von IGNATZ EDLEN VON
 BORN. Zweeter Band. Mit 5 Kupfert. Prag
 1776. In Verlage der Gerlischen Buchhandlung.*

i. e.

Tractatus societatis priuatae Bohemicae in
 augmentum matheseos, historiae patriae et
 naturalis editi ab IGNATIO DE BORN
 Tom. II.

Ex hoc altero volumine *) ad nos pertinent sequentes tractatus.

1) *De Topazio veterum, et Chrysolitho* PLINII, Auctore IGNAZIO DE BORN. Omnino optandum est, vt Cl. Auctoris votum, de congressu societatis doctorum virorum, qui in edendo PLINIO, et THEOPHRASTO, aliisque iunctis viribus laborarent, tandem aliquando expleatur: cum omnia adeo adhuc sint incerta, et imperfecta, quae de veterum scientia naturali habemus. Omnem itaque plausum meretur Nostri opera, qui, qua pollet cognitione mineralogica, eam etiam illustrandis dubiis veterum locis impendere constituit. Laudandum hoc primum Eius de adeo obscure et dubie descripto lapide est specimen.

Primo de loco natali et etymologia Topazii tractat: p. 2. atque ex diuersissimis veterum de iis relationibus id tamen patet, nomen Topazii a loco natali sumtum esse; an vero insula Topazos in mari rubro sita, vel alius eiusdem nominis locus verum natale Topazii solum fuerit, in dubio manet.

Descriptio Topazii in veterum scriptis admodum diuersa est. p. 3. Graeci eum colore aureo, vel opacum, vel pellucidum esse dicunt, excepto ALEXANDRO POLYHISTORE, qui eum colore viridi flauo esse ait, vti Perodoll recentiorum dicitur. PLINIUS contra viridi, ad porri succum accedente colore, et opacum describit, vt itaque Topazius PLINII nihil, nisi Iaspis aut Achates viridis habendus sit. Simul hic demonstratur, vocem ὁάλινος, non viridem colorem, sed vitream texturam plerumque significare, et Graecos succinum

D 3

saepe

*) Primum volumen vide in comm. nostr. Vol. XXI. p. 322.

saep̄ *ύαλον* appellare: Forte igitur *ύαλοειδης*
THEOPHRASTI erit Hyacinthus recentiorum.

p. 16. His disputatis ostendit *Chrysolithum* PLINII
maxima cum probabilitate *Topazium* Graecorum esse,
cum omnibus proprietatibus secum conueniant,

p. 20. praeter patriam, quae *Chrysolitho* Aethiopia, India,
Baetria et Pontus erat. Probat hoc vlt̄erius, cum
omnes PLINII species de Chrysolitho, cum recen-
tiorum Topaziis, qui cum iis, quos Graeci descri-
bunt, iidem sunt; comparantur. PLINIVS Chry-
solithos alios pretiosiores, vt Chrysolampidem,
Chrysophidem, quos ad Topazium referendos pu-
tat Cl. Auct̄or; alios viliores, vt *Arabicum*, qui sit
cristallus rubro flaua *); 2) *Chryseletrum*, qui
probabilius ipsum succinum, atque *Craterites* **) *Hyacinthus*
succineo colore ***); 3) *Ponticum*, seu
Cristallum quarzeam coloratam; 4) *Hispanicum*,
qui etiam flaua quarzea cristallus sit. §) *Lemo-
chrysum* vel *luteum Chrysolithum*, i. e. Topazium pal-
lide flauum, 6) *Capnitē*, qui sit bruna quarzea
cristallus, vulgo *Rauchtopas* dicta †), 7) *vitreis simi-
lem*, s. nostrum Hyacinthum. 8) *Melichrysos*, qui
vel flauum fluorem mineralem, vel flauum Hya-
cinthum significet. 9) *Xystion*, quae tamen vox
recte a SALMASIO, vt spuria, repudiatur, eique Xan-
thos substituitur, qui sit Haematites flauus.

p. 39. Causam, cur iterum factum sit, vt nostris tem-
poribus Topazii nomine flauam gemmam intelli-
gamus, cum tamen PLINIVS viridem lapidem sic
nominet, in eo ponit, quod patres, interpretandis
libris sacris ex Graecis scriptoribus, Topazium
flauo

*) BRÜCKMAN von Edelgesteinen p. 150.

**) PLIN. lib. 37. cap. 10.

***) BRÜCKMAN l. c. S. 113.

†) CRONSTEDT. §. 52. 2. 1.

flavo colore esse viderint, a quibus deinde lapideidae hoc nomen receperint.

2) IOSEPHI STEPLING *determinatio longitudinis geographicae urbis Pragae Bohemorum.* p. 44.

3) Comitum DE KINSKY *relatio de quibusdam incendiis terrestribus in Ellbogano circulo Bohemiae.* p. 58. Ostendit hic Ill. Auctor, vestigia terrarum adustarum, calores subterraneos, fumos, et alia, non esse eiusmodi, ut inde illic montes igniuomos s. vulcanos fuisse colligere liceat. Primum AGRICOLA *) incendiis horum mentionem fecit, quae postea Cl. SCHREBER **) curatius describit. Posita sunt ea inter *Lessauiam* et *Culmam*, pagos, atque in iis terra rubra, adusta, conspicitur. Dubitat Ill. Auctor, saltem vix explicari posse putat, quomodo lignum a lava penetrari possit, cum illud prius comburi debuisset.

Deinde post *Falkenauiam* prope a flumine *Eger* p. 63. similis terra conspicitur, illicque ab AGRICOLA collis ardens describitur. Ill. Auctor craterem invenire non potuit, neque ignem ardentem vidit, sed collis iam plane exustus est. In iis locis fodina ferrea est, quae, per quoddam tempus, non colitur, vapores inflammabiles emittit. Id, quod BALBINUS p. 66. de metuendo monte igniuomo his in locis meminit, falsum est: nihil enim nisi stratum lithanthracum est, quod, e terra eminens, post pluuiam flammam concipit: pendet hoc a multo vitriolo, quod iis admixtum est.

Negat igitur Ill. Auctor fontes Thermarum Carolinarum hic esse quaerendos, uti Cl. BECHER ***)

D. 4

putat.

*) vid. EIVSD. de natura eorum, quae effluunt ex terra Lib. IV. pag. 565. Basil. 1657.

**) vid. EIVSD. *Reise nach Karlsbad. Leipz. 1771. S. 99.*

***) vid. EIVSD. tractationem de thermis carolinis edit. II. Pars II. pag. 94.

putat. Nam montes, qui thermas Carolinas cingunt, Granite componuntur: pyritae vero et in Ellbogano circulo in stratis montium argillaceorum positi sunt. Debuisset igitur in Granite, cui strata sulphurea haec imposita sunt, rima esse, per quam in thermas Carolinas materia inflammabilis ducta esset. Probabilius esse putat, si in Granite ipso circa thermas Carolinas locus natalis fontium quaeratur.

p. 98. 4) *Disquisitio, an unum sit acidum vniuersale in natura rerum, vel an* DE IVSTI *probauerit, salia acida esse modificatum vniuersale acidum, Auctore FRANCISCO DEMBSCHER, finitore fodinarum Schemnitzii in Vngaria. Primo refellitur Cl. DE IVSTI, cum acidum vniuersale ab eo plane non demonstratum sit: deinde ostenditur, arte varia salia in iis locis parari posse, vbi a natura non producerentur, non tamen opus esse, vt acidum vniuersale assumatur.*

p. 112. 5) Cl. LOMMERI *descriptio dentium animalium petrefactorum, circa Lessauiam Bohemiae inuentorum, qui iis similes sunt, ex quibus Turcosa, in Persia et Gallia paratur. Cl. Auctor dentes eum in modum combussit, quem REAUMVR describit, atque tunc lento igne obtinuit veras Turcosas. Dentes petrificati grisei sunt, et argillacei: color, quem hic dentes igne concipiunt, pendet a nigra terrestri substantia, quae vel in punctis, vel rimis dentium conspicitur: ea per horam et ultra in igne inmutata manet, postea autem colorem dilute coeruleum assumit. Cuiusnam naturae haec substantia sit, Cl. Auctor non definit.*

6) IOANNIS ZAUSCHNERI, Prof. Publ. historiae naturalis in vniuersitate Pragensi, *descriptions Ornitho-*

Ornithogali Bohemici, et Erucae tenuifoliae perennis, flore luteo IO. BAVHINI. Primum depictum est bona icone: id tamen vitiosum est, quod staminum umbra indicata sit, qua fit, ut duodecim stamina adesse videantur. Character eius est. Caulis foliosus, foliis alternis sessilibus, lanceolato linearibus, floribus axillaribus pedunculatis erectis. Nascitur hoc Ornithogalum prope Pragam. Altera planta est *Sisymbrium tenuifolium* LINN. foliis alternis petiolatis, pinnatifidis, laciniis subdentatis, floribus pedunculatis pendulis, siliquis praelongis.

7) IOH. STEPLING *de actione solis in variis terrae latitudinibus.* Versio est illius tractatus, qui in Actis Eruditorum Lipsiensibus anni 1750 prostat. p. 128.

8) EIVSD. *de congelatione aquae observationes.* Repetit hic experimentum, quod Cl. WILKE in Actis Holmienfibus de anno 1769 *) descripsit. Aqua quiescens, cum summum esset frigus, (d. 19 et 20. ian. 1776.) non congeluit, et tamen maxime frigebat, ita ut thermometer in eam positum, sub punctum congelationis caderet: cum vero hoc modo aqua thermometro esset in motum acta, prius mercurium in punctum congelationis ascendere coëgit, deinde ipsa congeluit. p. 134.

9) IO. TESSANEK *quorundam locorum ex operibus NEWTONI disquisitio.* p. 136.

10) I. T. KLINKOSCH *litterae ad Ill. Comitem FRANCISCUM DE KINSKY, super animali magnetismo et electricitatis vi se ipsam restaurante.* Primo narrat factum, ubi alter, qui magnetismum animale defendebat, eoque morbos pro lubitu tolli

D 5

et

*) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 14

et excitari putabat, adimoto magnete artificiali, effecta in aegra produxit; alter autem, magnetismum negans, cum ad eandem aegram accederet, et clanculum magnetem artificialem secum tulisset, nihil omnino dictorum effectuum excitare potuit: unde patet, causam non in magnete esse positam, sed vel in imaginatione, aut, quod probabilius, ab arbitrio aegrae pendere, ut itaque tota res pro fraude habenda sit.

Deinde ostendit, eas vires, quae magnete a Vienneis tribuuntur, non ab eo, sed potius ab ipsa electricitate, quae forte in illis experimentis magneti communicata erat, pendere; cum eadem effecta sequantur, ex quocunque, vel metallo, vel ligno, vel alio corpore acus facta sit. Apparatus, quo hoc demonstrat, constat ex duobus ligneis orbibus, quorum alter resina superficiei inferiori mensae cuiusdam affixus, sicque symperielectricus est, ex cuius media parte columella, acum magneticam, aliam quamcunque sustinens prominet; alter in parte eius superiore lamina metallica tectus, et resina, superinductus, frictione vel alio modo electricus factus, inferiori superficiei prioris orbis contiguus ponitur ita tamen, ut sursum deorsumue moveri possit. Iam vero constat, hoc modo, ipsi acui columellae impositae electricitatem communicari, atque igitur omnia phaenomena eiusdem ab electricitate pendere. Patet hoc clarius ex descriptione, quam de *Electrophoro* a Cl. VOLTA composito dat, qui re ipsa cum superiore instrumento convenit. Hunc *electrophorum et electricitatem vindicem*, seu, quae se ipsam restituat, a Cl. BECCARIA *) demonstratam, unam eandemque electricitatis naturam indicare comprobatur.

Electro-

*) in Libro cui titulus: experimenta et observationes quibus electricitas vindex late constituitur atque explicatur. Turin. 4.

Electrophorus Cl. VOLTAE constat ex lamina p. 176. metallica, lineam crassa, margine conuexo et for- micatim inflexo, in cuius media parte eminentia est, cui columella vitrea vel alia idioelectrica affi- gitur. Huic laminae, alia etiam metallica plana, supponitur, quae eiusdem sit crassitiei, sed duos pollices latior, et resina superinducta: Quodsi ex- perimentum institui debet, resina haec frictione electrica redditur, et prior lamina ei imponitur, ma- nuque altera attingitur, altera retrahitur, atque sic plures ictus et scintillum extrahuntur, praeter, quod electrica vis renouetur.

BECCARIA vitream tabulam, in vno latere la- mina stannea textit, altera parte filis sericis vel laccea columella laminam stanneam instruxit eique condu- ctore electrico vim electricam communicauit.

Hinc nullum aliud discrimen sequitur, nisi, vt *positiua electricitas* se ostendat in instrumento BEC- CARIAE, vbi in Electrophoro a VOLTA inuento *negatiua* agat.

Acui magneticae, vel alii cuicunque, si hoc modo electrica vis communicatur, ea mobilis est versus omnia corpora, non electrifata. Atque sic forsan etiam in iis experimentis, quae ad anima- lem magnetismum demonstrandum instituta sunt, electrica vis, non magnetica egit; cum magnes in theca, vernice obducta, contentus, mensae cuidam metallica, quoque vernice obductae, et antea poli- tae impositus, sic electricus factus sit.

II) Cl. HACQVETI, *Chirurgiae et artis obste- triciae doctoris Laybachi in Carniolia, obseruationes in itinere versus Semlin institutae.* Spectant mul- tae ad mores et vitae genus incolarum, quorum adiit Cl. Auctor terras. Iis inspersit obseruatio- nes quasdam physicas. Breuiter describit mon-
p. 236.
p. 231.
tes

tes Carnioliae inferioris, qui sunt calcarii, ab oriente versus occidentem extensi, petrefactis referti: hos interiacent minores argillacei colles, qui mineras ferreas continent.

p. 230. In Vngaria et Illyria fere semper febres grassantur, quod ab aqua impura, incolarum impuritate, noctibus frigidis diebusque calidis et transpiratione sic suppressa deriuat.

p. 234. Vngariae magnam planitiem, vndique montibus cinctam, putat, antiquissimis temporibus fuisse mare, quod Caspico simile fuerit, et denique versus *Portam* ferream perfregerit sicque inundauerit Bulgariam et Romeliam; Vngariam vero et Illyriam in siccum fertile solum mutauerit. Confirmare hanc hypothesein videntur, petrefacta ligna et conchylia, sensim adscendentes montes Friaulenses, et solum calce et argilla mixtum.

p. 240. De *Populo nigra* notat eam diu in aqua iacere neque tamen putrescere, quare utilis huius arboris cultura oeconomis suadenda est.

p. 246. Vti aues et quaedam insecta in alias regiones migrant, ita quoque obseruauit Cl. Auctor serpentes, et praesertim Colubrum natricem ex Slauonia et Sirraeia, Seruiam trans Sauum fluuium autumnii tempore petere; et vere iterum remigrare. Simul describit *Boletum*, eumque depictum tradit, quem et in Croatia semper salicibus adnasci vidit. Similis est *Fungo pileo semicirculari, supra conuexo, petiolo cylindraceo et punctato* SCHAEFFERI (*Fung. P. II. 117. tab. f. 1. 2.*); sed differt, quod supra concavus, subtus conuexus sit.

Denique ostendit Illyriam multis in rebus, ratione incolarum, animalium et plantarum, cum etiam illic ossa Elephantorum inueniantur, cum Sibiria comparari posse.

VIII.

Primae lineae de cognoscendis mulierum mor-
bis in vsus academicos ductae a GVALTH,
VAN DOEVEREN Med. Doct. et Prof. Lugd.
Batau. apud Sam. et Io. Luchtmans 1775. 8.
pagg. 53. praeter praefationem et elenchum.

CL. DOEVEREN agit hic de morbis mulierum in
genere, virginum, mulierum nuptarum, gra-
vidarum, parturientium, puerperarum, lactantium,
effoetarum seu vetularum. Consilium cepit Cl.
Auctor ideo de hac re scribendi, quoniam libro
hac de re exponente et praelectionibus academicis
accommodato destitutum sese intellexerat, vti et
ex ipsa huius libelli inscriptione patebit.

Morbi mulierum diuiduntur in vniuersales et P. 2.
particulares. Vniuersales plerique tales sunt, vt
iisdem vel saltem iis similes in viris quoque inter-
dum occurrant, non vero tam saepius. Ac primum
quidem hi deriuandi sunt a constitutione corporis
muliebris, quae est laxa, debilisque ideoque prona
ad morbos ex pituita nimia, lymphae aut feri col-
luuie, sanguinis abundantia, cacochymia motuum-
que vitiis e. gr. obstructiones frigidae, viscidae cet.;
dein a maiore sensilitate et teneritudine partium
pendent, vt corporis et animi commotiones, spasmi,
conuulsiones, hysteria, cet. quo forte haud imme-
rito ipse cancer reuocari potest; porro ex consen-
su vteri cum toto corpore, inde sexcentorum mor-
borum fontem iam HIPPOCRATES hausit; item
hi morbi vniuersales mulierum proficiscuntur ex
animi plerarumque feminarum sensilitate nimia at-
que irritabilitate et cernuntur in nervorum affe-
ctione; postea genitalium muliebrium mechanis-
mus

mus in censum venit e. g. sterilitatis variae species, hydrops vteri et ouarii, affectiones nonnullae venereae, scirrhi, sarcomata, herniae, prolapsus, descensus aliaque mala; postmodum diuersus habitus et diuersa fabrica partium in feminis quid confert, e. gr. alui frequens durities, herniae crurales, vmbilicales et vesicae, mammarumque morbi, claudicationes cet; nec minus et morbi vniuersales feminarum oriuntur ex vitae genere, vt lotrices cet. vt ex prauis nonnullis consuetudinibus, vt suppedaneorum fetus cet. et ex variis vitae feminarum stadiis, vti in sequentibus capitibus ostendetur.

p. 6. Particulares vel proprii feminarum morbi dicuntur illi, qui iis ex natura sui corporis et singularium partium fabrica earumque functionum diuersitate contingunt, ideoque ex vario inprimis aetatis earum termino petuntur. Atque hos potissimum morbos particulares secundum ordinem, a nobis iam supra indicatum Cl. DOEVEREN hic persequitur.

p. 7. In capite secundo itaque agitur de morbis virginum, a pubertatis annis vsque ad matrimonium, vel donec coelibes euadant, effoetae. Fontes primarii sunt plethora, vitia genitalium organica, menstruorum defectus s. alia vitia, stimulus venereus, irritabilitas atque sensibilitas nimia, vestimenta arcta, ligaturae et machinae corporis deformitatem corrigentes, vitae genus varium pro regionis conditione, morum, consuetudinis cet. diuersitate. Ex magno itaque morborum, qui virgineam aetatem possunt comitari, numero, primarios modo hic Cl. DOEVEREN theoretice et practice pertractandos indicat: plethoram nempe pubertatis eiusque effectus, mensium retardationem
vel

vel suppressionem, earum fluxum nimium, fluorem album, chlorosin, passionem hysterica, furorem vterinum, sterilitatemque.

Accedimus iam ad morbos grauidarum. Pri- p. 13.
ma eorum causa exspectatur in feminis masculini ingressu in vterum, altera est maior corporis sensibilitas, tertia est mirabilis mentis dispositio ad animi affectus validiores, vbi vero imaginationis maternae vim in fetum non largitur Noster. Menstruorum cessatio porro post conceptionem est quoque causa morborum diuersorum tam in primo grauiditatis stadio, quam in altero. Plethora enim noua nata, haemorrhagias, spasmos, abortum cet. causat. Iam accedit ad vteri grauidi incrementum, adscensum et immanem saepe expansionem, vnde nascitur magna series morborum abdominis, pectoris ipsiusque capitis, nec non artuum inferiorum torpores, dolores, crampi, oedemata, erysipelata, varices, haemorrhagiae, vlcera, labiorum vulvae inflationes, variaque vitia partium genitalium et alia multa pro diuersa partium compressarum aut distentarum actione variis nominibus insignienda. Increscunt praeterea illorum effectuum numerus et magnitudo ex situ vteri minus naturali. Partium peluis vicinia et consensus cum vtero grauido distento non minus obnoxias reddit grauidas affectionibus a vesicae, intestini et neruorum ischiadicorum aliorum connexionem, compressionem vel irritationem, vnde spasmi, dysuria cet. oriuntur.

Non raro fetus ipse creat grauidis molestiam p. 19.
atque morbos. Circumvolutionem fetus Noster *) non admittit.

Partu.

*) v. comm. nostr. Vol. XIV. p. 159 seqq.

p. 23. Parturientium morbi sunt ii, qui a caussis partum concomitantibus feminis accidunt, quorum rursus alii aliis etiam mulieribus superuenire possunt, alii parturientibus omnino ita proprii sunt, vt sine partu locum habere nequeant. Causae derivandae sunt a matre, a fetu et ab obstetricante. Exempli loco memorantur dolores ad partum spurii, partus lentus et difficilis; haemorrhagia vteri in partu ipso superueniens, conuulsiones parturientium, abnormis sanguinis motus, congestiones eius inde natae.

p. 34. In capite sexto morbi puerperarum pertractantur. Cingulam seu fasciam, quae abdomini puerperae applicatur, reiicit Noster. Inter multos puerperarum morbos nominat earum debilitatem et sensilitatem, tormina post partum, secundinarum morbosam exclusionem; fluxum lochiorum imminutum aut suppressum, siue nimium, inflammationem vteri eiusque sequelas, abscessum, gangraenam cet. febrem lacteam et lactis motus abnormes siue errores, febrem purpuram, diarrhoeam, cui addi posset febris puerperarum singularis, de qua non multum post quaedam scripta Anglica indicabimus *).

p. 43. Iam in septimo capite Noster venit ad morbos lactantium, qui proficiscuntur a peruersa secretionem vel excretionem lactis, vel a vitiis organicis mammarum ad lactationem non aptarum, vel a conditionibus proximum cum his commercium habentibus. Agit itaque hic de lactis defectu et abundantia nimia, praua eius qualitate, de papillarum variis vitiis et de nonnullis mammarum morbis singularibus.

Transit

*) vid. paullo infra.

Transit nunc Noster ad morbos effoetarum p. 48.
 seu vetularum, quorum plurimi partim a cessatione catameniorum, partim a senectute sunt repetendi. Plethora menstrua itaque est praecipua causa horum morborum, quae in totum corpus, vteri viciniam et vterum ipsum agit. Dein stagnatio sanguinis in vasis vteri et vicinarum partium, eiusque corruptio et acredo efficit dolores, tumores, scirrhus, carcinoma, fluores cet. Similem in modum serum aut lymphæ stagnans ansam praebuit hydro-pi et tympanitidi vteri, ovarii, tubaeque. Noua occurrunt in vetulis conamina ad mensium fluxum renouandum, cuius exempla annorum LX et LXX occurrunt. Elegit Noster potissimum hic grauiditatem falsam, scirrhum vteri et cancrum, hydropem vteri, eiusque tympanitidem, ovariorum hydropem, molam et exerescencias varias.

I X.

CAROLI IOSEPHI OEHME diss. inaug. de morbis recens natorum chirurgicis. Lipsiae 1773.
 ex officina Breitkopfii. 4. pagg. 64.

Praeter haereditarios morbos ex labe parentum in natum hominem translato, ut sunt lues venerea et arthritis, aliis etiam, qui eo tempore, quo vtero includuntur, orti sunt et qui connati appellantur, recens nati affici possunt. Quorum quidem causa non raro in intima viscerum fabrica vel fluidorum mixtione latens, post partum euoluitur, qualis v. c. est in morbis ex meconio ortis, in asthma pituitoso et in ictero recens natorum. Saepius tamen partes aut a mala conformatione, aut a laesione sub partu morbose afficiuntur. Ex tanta igitur morborum varietate, eos potissimum.

Cl. ОЕНМЕ persequitur, quibus chirurgia prospicit: monstrosae tamen fabricae nulla ratione habita, in qua mutanda nihil praeterea propemodum valet chirurgia. Quapropter recenset hic Noster praecipuos morbos, tum connatos, cum breui post natiuitatem accedentes, chirurgicum auxilium postulantes. Hi nempe sunt variae capitis laesiones, quae in partu accidunt, vt capitis tumor, caput compressum, futurae apertae, hydrocephalus, hernia cerebri, spina bifida, porro organa sensuum externorum laesa, labia atque palpebrae coalita, labium leporinum; item morbi linguae et faucium, morbi pectoris, vt bronchocele, abscessus in mammis neonatorum, morbi vmbilici, vt sunt varii exomphali; herniae inguinales et scrotales, morbi scroti, vrethrae, penis, atretae, anus clausus, extremitatum et integumentorum adfectiones.

p. 21. Labium leporinum et eius curationem accurate hic Noster pertractat. Fasciam vnientem filis decussatis, non ab Anglis, vti Cl. BIEDERMAN-
p. 26. NVS *) credidit, sed a Nostro HEBENSTREITIO chirurgus Lipsiensis exercitatissimo inuentam esse, asserit Noster.

p. 32. Ranularum, in neonatis quoque apparentium **) extirpatio cum cauterio actuali, vti Cll. LEVRE-
TVS et DELEVRYE praeceperunt, Nostro non satis secunda videtur. Si tumor ex abscessu fit, is, pure contracto, aperiatur; sin vero ad cysticos pertineat, destruatur post effluxum humorum cystis, ne tumor regeneretur ***).

Broncho-

*) vid. EIVSDEM diss. inaug. de labio leporino. Argentor. 1770. 4.

**) vid. comm. nostr. Vol. XXI. p. 256.

***) v. ib. Vol. XV. 349.

Bronchocele *) seu potius tracheocele conna. p. 33. ta hic a Nostro commemoratur. Erat tumor permagnus, qui in puero recens genito ab aure et gena lateris dextri ad thoracis cum abdomine confinia propendebat. Eum cum arteria aspera communicare et ad rariorem bronchoceles speciem, quae ab aere erumpente oritur, pertinere, ambitus eius, in inspiratione et dum puer clamaret, auctus, in expiratione et dum non clamaret imminutus et confidens indicabat. Methodus, qua GOHLIVS **), cui debetur hic casus, in eo usus est, non describitur; putat tamen Noster in principio fomentationes spirituofas et adstringentes in simili casu utiles fore, quibus laxitas partium, morbosum statum, aeris scilicet in glandulam quandam ingressum augens, aboleri et status naturalis restitui poterit. Si tumor nimium increfcat, illum variis locis incidere suadet Noster, ut aer emittatur et hiatus morbosus asperae arteriae detegatur: cuius coalitus tunc fortasse obtineri poterit. Aliud exemplum bronchoceles congenitae, strumae magis analogae, pariter hic narratur. Hi tumores sunt gerendi ad adultiorem usque aetatem et tum vel resolventibus tentandi, vel exstirpandi sunt. Laudatur quoque alibi usus testarum ouorum calcinatarum internus ***).

De tumoribus et abscessibus in mammis recens na- p. 34. torum †) hic agitur. Neglectam expressionem feri multi ut causam horum abscessuum accusant, et etiamsi hoc non omnino negat Cl. Auctor, tamen

E 2

veretur,

*) v. comm. nostr. decad. II. Suppl. I. p. 187.

**) v. Act. med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 70.

***) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. pag. 216. ib. Vol. XIX. pag. 488.

†) vid. ib. Vol. XX. pag. 691.

veretur, hos tumores multo saepius constrictioni fasciarum nimiae, vel incongruae, vel rudiori expressioni huius liquidi ferofi in mammis recens natorum vtriusque sexus reperiundi deberi. Suctionem eapropter omnibus reliquis modis hoc serum stagnans e mammis euocandi praefert.

p. 40. Exomphalis variis, vbi et hepatomphaloces congenitae mentio est facta, descriptis, tumorem singularem in regione hypogastrica iam non descriptum Cl. Auctor commemorat, qui aliquot post partum dies pueros quandoque infestat. li enim nonnunquam tertio quartoue post partum die inquieti fiunt, febre agitantur cum tumoris ab osse pubis usque ad umbilicum duritie et dolore. Plerique hoc malo perierunt. Sectiones cadauerum non institui potuerunt. Ad tumores inflammatorios pertinet et musculus abdominalibus ac peritoneaeo insidere videtur. Durities, quae saepius in longitudinem protracta funiculorum forma sentitur, inflammationem fortasse ex obstructis arteriis umbilicalibus oriundam, prodit. Hinc culpam Noster in neglectam expressionem sanguinis in ligatura funiculi coniecit, qui non raro peruersè versus abdomen exprimitur. Eos, qui hoc morbo affecti non perierunt, clysmata, fomenta ex emollientibus et emplastra similia per noctem applicata seruarunt.

p. 41. Paulo fusius exponit hic Noster historiam herniarum congenitarum, a recentioribus *) inprimis exornatam. In quibus herniis intestina per processum peritoneaei ad testem descendunt. In puellis quoque similis processus peritoneaei ligamenta vteri rotunda comitatur, in quo aqua interdum morbose colligitur et hydrocelem congenitam format.

Voluu-

*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 695.

Voluulus infantum connatus a b. LYDWIGIO p. 59. hic Lipsiae est observatus, quo intestinum rectum non longe a fine suo obturabatur. Aluus bene responderebat, sed per intervalla et cum crebriore et profundiore inspiratione. Sensim alui obstructio est inducta, quae pertinacior facta nullis remediis cessit, ut puella septimo aetatis mense obiret, postquam non multum ante mortem sanguinem multum sincerum, muco remixtum excreuerat. Clysmata effluebant et cereolo immisso resistentia paulo altius in intestino posita percipiebatur. Sectione facta, intestinum crassum totum in latere sinistro inferiore sex circiter pollicum longitudine in se contractum cernebatur; quo euoluto, secantes totum colon in se per plicas rediisse intelligebant, ipso etiam coeco non relicto, ut colon nunc euolutum longitudine sua vnam et aliquot pollices superaret. Inuaginationem hanc, quae angustiam et plenariam fere emphraxin canalıs induxerat, connatam et subinde auctam fuisse, summa et per tendinea quasi filamenta facta harum partium concretio clare demonstrabat. Simile exemplum a Cl. HEBENSTREITIO in alio infante observatum est.

Extremitatum morbos Cl. Auctor ad tria fere p. 60. momenta reducit, numeri scilicet aberrationem, situm vel nexum mutatum et unitatis solutionem. Inter vitia integumentorum Cl. OEHME contemplatur quoque exanthema illud, quod Germani *Schülblasen* appellant et creberrime in recens natis apparet. Sunt vesiculae maiores, limpidam aquam continentes, quae marginem inflammatorium ostendunt. Apparent primo ad inguina, inde ad umbilici viciniam, axillas et digitos deferuntur et post tres quatuorue dies exsiccatae decidunt. Servant haec exanthemata typum morbi quasi epidemici,

vt vno anno frequentius et copiosius occurrant, quam altero. Curatio cernitur in laxantibus et forsan quoque in incisione harum pustularum inprimis magnarum, vt aqua fordida effluat.

X.

IOHANN STEIDELE *Wundarzte und Geburtshelfers*
Abhandlung von dem unvermeidlichen Gebrauch
der Instrumente in der Geburthshülfe. Wien
gedruckt bey Joh. Thomas Edlen von Trattner
Kayserl. Königl. Hofbuchdruckern und Buchhänd-
lern 1774. 8. m. 2. K. T. Seit. 160. außer
den Vorbericht.

i. e.

Tractatio de inēuitabili vsu instrumentorum
in arte obstetricia. Auctore Cl. IOANNE
STEIDELE.

Practicis regulis vniuersalibus in applicandis instrumentis ad partum absoluendum praemissis, ostendit Cl. Auctor, quando et quomodo forceps curua capiti fetus difficili in casu sit applicanda; si caput est inclauatum; si caput intra matricem relictum est; si naturaliter quidem situm est, alia tamen adsunt impedimenta, quae capitis transitum morantur. Porro agit de capitis imminutione, de modo caput in matrice relictum instrumentis extrahendi; de aperiendo thorace, de herniis vteri. Addit praeterea hic Noster tentamen clunes singulari instrumento extrahendi, et finit hunc tractatum cum partu caesareo et vectis Roonhuysiani vsu.

p. 34. Situs capitis praeternaturales varios Noster hic describit et varias cautiones addit. Inter alia impedimenta, quae caput fetus neque magnitudi-

ne,

ne, neque situ errans, nihilominus tamen forcipo extrahendum suadent, sunt retentio vrinae, imminens ruptura vteri cet. Signa rupturae vteri, de qua varia Noster collegit exempla, alibi a nobis iam narrata*), sunt abdomen admodum crassum et tensum, vagina vteri retracta, orificium altius positum, crebri nec partum efficientes atque promouentes dolores ad partum, nimius fetus motus, inprimis autem tensi dolores fixi, quos puerpera clare et continuo ita sentit, vt locum accurate indicare queat.

Leuretiana curua forceps omnibus reliquis p. 64. forcipis speciebus praefertur eaque hic in icone sistitur.

Quando cerebrum eximendum est ex cranio, vtuntur p. 72. obstetricii medici perforatorio, forcipe et vncis Smellianis. Perforatorium nimis breue habere Nostro videtur manubrium, atque vncos prorsus reiicit. Cl. Auctoris perforatorium, quod et hic in icone sistitur, est longiore et validiore manubrio instructum. Vncus pariter, quo vtitur Noster, ad ossa capitis frangenda et extrahenda, est longior vulgari et hic quoque in icone delineatus. Atque his solis duobus instrumentis hanc operationem perficit, quam hic quoque accurate exposuit Noster.

Thoracem raro esse aperiendum Noster affirmat p. 94. semelque modo ab Eo hoc est factum. Intelligit Noster hic non dissectionem fetus in partes, sed aperitur, tunc pectus et pulmones cum corde eximuntur, vt commodius pectus comprimi et extrahi queat.

Si vterus vel ante vel post conceptionem per p. 105. annulum abdominalem transit, hernia vteri appellatur, cuius curatio autem minime, vt veteres
et

*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 518.

et recentiores artis obstetriciae scriptores sunt autumati, secundum Nostri opinionem in partu caesareo cernitur. Versionem fetus hic suadet et, annulo nimis contracto, praemitti debet dissectio annuli, vti in herniotomia.

p. 112. A Nostro excogitatum et hic icone repraesentatum instrumentum clunes inclauatos extrahendi tunc a Nostro laudatur, cum nec manu, nec forcipe, nec vncis Smellianis auxilium ferri potest, etiamsi illud sine omni omnino laesione aegrae posse applicari lubenter Noster largitur.

p. 122. Iure meritoque videtur Nostro a nonnullis probari partum caesareum, praesertim viribus puerperae non prorsus exhaustis. Peluis angustia summa apparente, fetu tubario praesente, seu in ouario, seu pelui latente, et tandem rupto vtero partum caesareum Noster concedit, in reliquis vero casibus, vbi ille quoque est institutus, eum reiicit totamque operationem hic describit.

p. 152. Vestem tandem et Roonhuysianum describit Noster, in icone sistit, eius effectus declarat eosque noxios non solum, sed et interdum summe periculosos iudicat ideoque eum plane reiicit. Atque ita tradit hoc opusculum tironibus inexercitatis in arte obstetricia. Omnes operationes breuiter descripsit Cl. Auctor et, partim sua, partim aliorum experientia monitis illustrauit; exempla vero in posterum pollicetur.

XI.

A treatise on the puerperal fever, wherein the nature and cause of that disease so fatal to lying-in women are represented in a new point of view, illustrated by dissections and a rational method of cure proposed and confirmed by experience. By NATHANAEL HVLME M. D. London 1772. 8. pag. 141.

i. e.

Tractatio de febre puerperarum eiusque natura et causa sectionibus illustrata et methodo iis medendi. Auctore Cl. NATHANAEL HVLME.

Animaduersiones, Germanicae versioni *) additae potissimum ex Gallicis depromptae sunt scriptoribus. Summa vero totius huius Hulmiani libri eo redit, ut primum morbus describatur, dein signa colligantur eius prognostica et cadauerum nonnullorum, hoc morbo affectorum, ratione habita, methodus huic morbo medendi proponatur. Quibus praemissis, sententiae Auctorum de causis huius febris colliguntur, addita Nostri super causis eiusdem opinione.

Febris haec puerperarum Ipsi Nostro non Sect. I. nouus quidem videtur morbus, quin potius arbitratur iam diu illum feminis accidisse, attamen sedes huius morbi atque eius causa hactenus non recte a medicis sunt cognitae. Appellatur idcirco et a Nostro peculiaris morbus puerperarum haec febris, sese distinguens ab omnibus reliquis morbis,

E 5

bis,

*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 570.

bis, qui solent alias puerperas infestari. Accidit haec febris omnibus anni temporibus, omnibus aetatibus et iis aequae, quae raro pepererunt, ac iis, quae saepe. Nihilominus tamen videntur eae puerperae, quae valde et supra vires tempore graviditatis laborarunt, huic feбри prius et facilius esse expositae, quam eae, quae quietem et commoditatem quaesiverunt.

P. 14.

Ad signa pathognomonica huius febris pertinent: Dolor sat vehemens in regione epigastrica, cui accedit febris et plerumque dolor in fronte et haec symptomata mox post partum apparent, a quo die secundum GALENUM Noster quoque incipit numerare, nec non uti alii, ab eo, quo coepit febricitare aegra. Lochia mutant colorem et copiam, id quod Cl. WHITE, qui eandem rem tractavit, negat, uti non multum post indicabimus. Quibus praemissis Cl. Auctor illos potissimum morbos contemplatur, qui quandam produnt similitudinem cum morbo, ab Eo hic descripto, et horum morborum diversitatem a febre puerperarum persequitur. Atque hi sunt dolores post partum, febris lactea miliaris, passio iliaca flatulenta, uteri inflammatio et cholera.

Sect. II.

Venit nunc Cl. Auctor ad signa prognostica. Bona sunt pulsus et respirationis non adeo magna celeritas et debilitas, sudor uniuersi corporis et vrina turbida cum pulsu tardiore. Vomitus materiae viridis et atrae frequenter malum morbi exitum annunciant, cet.

Sect. III.

Iam ad sectiones cadauerum eodem morbo pereuntium progrediamur: Abdomen erat tumidum interdum, plerumque non tumidum, diarrhoea

rhoea antea praesente. Primi cadaueris abdomen non erat tensum, integumentis vero dissectis ichor apparebat inter intestina et peluim latens. Omentum erat inflammatum et sphacelofum, imo ex parte etiam incrassatum. Quo aperto, ichor quoque emanabat. Intestina cohaerebant firmiter et in eorum anfractibus, etiam valuulis, materia alba seu flaua, sebacea conspiciebatur. Pariter intestina erant inflammata omnia, plurimum in sinistro latere, ibique et sphacelus minabatur. Genitalia externe et interne integra erant, vterus perfecte sanus, contractusque in pelui latebat. Reliqua abdominis viscera bene sese habebant, pectusque non aperiabatur. Secundi cadaueris abdomine valde tenso, aperto, aer foetidus et ichorosa colluies occurrebat. Omentum quoque erat tenue et pariter sphacelofum. Ventriculus valde expansus in se continebat humorem crassum et atrum. Vterus erat integer. Pulmones inflammati cernebantur. Terti cadaveris sectio easdem res offert et probat. Pariter quarta sectio conuenit cum praecedentibus et in hoc cadauere totum omentum erat sphacelofum, quod et vterum et tubas ouariaque colore imbuerat, nec non in substantia omenti vlcus apparebat. Vterus et hic, vti et in reliquis sectionibus, nullam praeternaturalem prae se ferebat mutationem. Videtur itaque sedes huius morbi in abdomine ac plerumque in omento esse.

Methodum huic feбри puerperarum medendi Sect. IV
Cl. HVLME postea recenset eamque duplicem proponit. Ac prima quidem attinet simplicem hunc morbum, altera spectat compositum et complicatum. Aluina euacuatio in primis in his aëgris est curanda ac primum quidem clysmatibus, dein remediis laxantibus et vomitoriis. Noster potissimum

muſum uſus eſt ſale amaro, oleo ricini americani fruſtu racemoſo hiſpido *), tartaro emetico et vino antimoniali, quod ex croco antimonii ſeu metallorum et albo Hiſpanico vino paratur **). Quo fa-
cto et quidem cum leuamine dolorum, perſpirationem ſuſtentare et quodammodo augere iuuat. Hoc tamen oportet fieri remediis, quae neque obſtructiones aluinas efficiunt, neque exaeſtuationem cauſant. Et hoc praeſtant paruae doſes ipecacuanhae, ſeu tartari emetici, ſeu vini antimonialis addita parua doſi opii. Laudat et hic RIVERII po-
tionem ſalinam ex ſale abſinthii et ſucco citri ut anthiphlogiſticum et diureticum remedium. Venaecſeſionis uſilitas, de qua diſputatur hic in utramque partem, in hoc morbo non negatur a Noſtro, interim tamen magna cautione in ea opus eſſe aſſerit. Veſicatoria nec minus hic interdum iuuant. Ra-
dice ſenegae ***), quae eſt *Polygalae ſenega* LIN. et contra pleuritidem laudatur, Noſter quidem uſus eſt, audet tamen nil ſtatuerere de uirtute eius, quae cerni dicitur in alui, urinae et perſpirationis liber-
tate et augmento, ita, ut aegre uenaecſeſio admitti debeat. Ceterum *Polygala vulgaris* in pleuritide et aliis peſtoris morbis †) commendatur. Maxi-
mam itaque attentionem in hoc morbo merentur primo diarrhoea, quae nimia caute moderanda eſt, vi-
tales porro vires, quae ſunt conſervandae, et deni-
que putredo ſolidarum et fluidarum partium, quae eſt emendanda.

In-

*) v. comm. noſtr. Vol. XII. p. 456. Vol. XXI. p. 430.

**) *Neuverbeſſertes Engliſches Diſpensatorium 2ter Theil*
S. 94.

***) v. comm. noſtr. Imae decad. ſuppl. I. p. 96.

†) v. comm. noſtr. Vol. XXI. p. 139 451 et 585.

Inquiritur tum Cl. HVLME in sententias Aucto- Sect. V.

rum de causis huius febris puerperarum et de
venaesectione in hoc morbo, secundum variorum
Auctorum diuersas sententias disputat. Nos vero
hic Auctores solummodo nominabimus et quorum
sententias indicabimus. Sunt vero hi: HIPPOCRA-
TES, AVICENNA, EVCHARIVS RHODION LV.
DOVICVS MERCATVS, FELIX PLATER, DA-
NIEL SENNERT, LAZARVS RIVERIVS, THOMAS
WILLIS, FRANC. DE LE BOE SYLVIVS, FRANC.
MAVRICEAV, THOMAS SYDENHAM, HERRMANN
BOERHAAVE, EDVARD STROTHER, FRID. HOFF-
MANN, DE LA MOTTE, IOANNES BURTON, WIL-
LIAM SMELLIE, S. A. TISSOT, GERHARD. LIB-
BARO VAN SWIETEN, IOANNES ASTRVC, THO-
MAS COOPER, THOMAS DENMAN, ROBERTVS
WALLACE IOHNSON, IOANNES MILLAR, HENRI-
CVS MANNING. His Aucto-ribus in Germanica
versione sunt additi NICOLAVS PVZOS, ANDREAS
LEVRET, F. A. DELEVRYE.

EDVARDVS STROTHER *) primus a Nostro
appellatur Auctor, qui de febre puerperarum scri-
psit. Refert illam ad febres inflammatorias et cre-
dit eam oriri, vti plerique horum supra nomina-
torum Auctorum solent arbitrari, a lochiorum sup-
pressionem. Vt signum pathognomonicum febris hu-
ius indicantur a Cl. STROTHER, dolores sub
umbilico, in omni abdomine et lumbis. Alii vt
SWIETENIVS, TISSOTVS et DELEVRYE in hoc
morbo et ad aberrationem lactis respexerunt. Ve-
naesectione in hoc morbo laudatur atque vituperatur.
Nos vero a parte Nostri Auctoris nonnullorumque
aliorum Auctorum, vt Cl. MANNING, sciamus, qui nul-
lam vniuersalem regulam hic statuunt, sed pro sym-
ptomatum varietate, eam suadeant vel dissuadeant.

Nam

*) Criticon februm: or a critical essay on fevers Lond.
1718. chap. IX. p. 212. The puerperal fever.

Nam pro febris vehementia, doloris magnitudine, morbi stadio, sanguinis profluvio ante et post partum cet. dirigi oportet venaesectionem in hac febre puerperarum. Item omnino causarum diuersitas aliam atque aliam huius febris medelam requirit. Vteri inflammatio, lochiorum suppressio, humorum acredo, aeris infectio, latens in sanguine acrimonia miliaris, perspiratio suppressa, lactis aberratio s. metastasis lactea, impuritates infimi ventris, inflammatio intestinorum et omenti cet. dicuntur huius febris causae atque ad eas potissimum est respiciendum medicis in aegris his medendis. Optatur ea propter in versione huius libri Germanica, ut differentia et signa harum ex diuersis causis oriundarum febrium explicentur et dein earum medela secundum harum causarum varietatem definiatur. Praecipuae causae harum febrium puerperarum indubitato sunt inflammatio intestinorum partim, partim impuritates in iis collectae, interdum utraque. Vtrum vero inflammatio ab utero grauido oriatur, an ab impuritatibus intestinorum proueniat, dubitat Cl. Auctor. Nos arbitramur, potius ab impuritatibus intestinorum, quam ab utero eam oriri.

Sect. VI Cl. HVLME autem, uti ex sectione sexta, qua sua sententia de causis puerperarum traditur, apparet, vteri grauidi pressionem iudicat causam praedisponentem intestinorum inflammationis. Recte omnino causas dispescit in immediatam seu proximam, atque in praedisponentem seu remotam et occasionalem. Proxima causa huius febris a Nostro secundum suas cadauerum sectiones supra *) etiam a nobis commemoratas, quaeritur in inflammatione intestinorum et omenti.

Omen-

*) v. supra p. 75.

Omentum pati posse per grauiditatem et inde ortam extensionem et pressionem, BAYHINVS, SWIETENIVSQUE animaduenterunt. Bene autem quoque monet Cl. Auctor, omentum ideo adipe esse imbutum et totum canalem intestinorum et omnino abdominis cauitatem ita esse formatam, ne vteri grauidi pressio noceat, id quod et nobis cum Cl. LEAKE videtur.

XII.

Practical obseruations on the child-bed fever; also on the nature and treatment of uterine haemorrhages, conuulsions and such other acute diseases, as are most fatal to women during the state of pregnancy. By JOHN LEAKE. D. Member of the College of Physicians in London and Physician to the Westminster Lying-in Hospital. London printed for I. Walter. 1772. 8. pagg. 404.

i. e.

Practicae obseruationes circa febres puerperarum, naturam et curationem haemorrhagiarum vterinarum, conuulsiones grauidarum letales cet. Auctore Cl. IOANNE LEAKE.

Germanice et hic liber *) prodiit, cuius iam summam cum Lectoribus communicaturi sumus. Haec versio Germanica appendicis loco sese finit descriptione novae forcipis tribrachialis a Cl. LEAKE inventae et ex alio Cl. Auctoris libro

*) *Praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwängern nebst der Beschreibung einer neuen Zange zur Geburtshülfe durch JOHN LEAKE. Aus dem Englischen übersetzt. Leipzig bey M. G. Weidmanns Erben und Reich 1775. 8.*

libro *) depromptae. Genuina autem huius libri editio iterum prodiit Londini 1774 **) secundum quam germanica versio quoque est facta. Tribus tractationibus constat hic liber, quarum vna attinet febres puerperarum, altera spectat naturam, causas et curationem haemorrhagiarum vterinarum, quae ante et post partum apparere solent, et tertia conuulsiones et alias breui letales affectiones morbosas grauidarum sistit.

p. I. In introductione monet Cl. Auctor, se docere iam per tres annos de febribus puerperarum id, quod Cl. HVLME in sua tractatione, quam non multum ante breuiter recensuimus, proposuit, omentum scilicet imprimis in iis pati et inflammatum esse. Obseruauit enim Cl. LEAKE anno sexagesimo nono et sequente seculi decimi octauo diuersas eiusmodi aegrotas partim in praxi sua privata, partim in puerperarum nosocomio Londinensi (*Westminster*) cui praecerat Noster. Ianuario et Februario mensibus hic morbus valde erat acutus et in diuersis vrbis partibus vere epidemicus. Ad causam itaque huius morbi eo melius detegendam cadauera aperiebantur. Cernebatur tum omentum vel penitus deperditum et corruptum ac in pus lacti corrupto simile mutatum, vel ex parte in-

*) Lecture introductory to the theory and practice of midwifery Lond. 1773. 4. De quo opere notat translator, sese ideo suae germanicae versionis addidisse descriptionem forcipis novae et iconem, quoniam illud praeter vnam tractationem de morbis haereditariis et de praecauendis variolis, quae et inserta est volumini secundo: *Sammlungen zum Gebrauch practischer Aerzte Leipzig 1776. 8*, caeteroquin nullas, nouas complectitur res.

**) Practical obseruations on the acute diseases incident to women cet.

inflammatum et suppuratum. Haec inflammatio sese extendebat ad superficiem intestinorum et in abdomine purulenta materia, fero lactis similis, sanguine et lacte coagulato simili materie mixta erat. Anno 1770. mortuae sunt feminae 270. antecedente anno 158. et in sequente 172. Apparet itaque, anno 1770 plures, quam tertiam partem esse mortuas, neque dubitat Noster, quin saltem dimidia harum pars hoc morbo sit mortua. Quoniam autem numerus demortuarum puerperarum per totum annum non vnus idemque, sed a mense Decembris vsque ad Maium maior erat: a nulla alia causa, quam a maligna et noxia aeris conditione deriuari hoc posse Noster adducitur vt credat.

Qua caussa vltcrius demonstrata et tempesta-
tum vicissitudinis ratione habita, historiam morbi secundum sua symptomata enarrat Cl. LEAKE. Versus vesperam secundi vel tertii diei post partum puerperae horrore vehemente afficiebantur. Interdum horror serius ociusue apparebat, raro tamen quinto aut sexto die post partum. Comitabantur eum capitis dolores, anxietates, nausea et vomitus biliosi, virium prostratio. Pulsus erat magna diuersitas, tum quoad fortitudinem, cum quoad celeritatem. In singula sexagesima horae parte a nonaginta vsque ad centum triginta et septem ictus numerabantur. Die propemodum secundo post horrorem querebantur aegrae de dolore vehemēti in scrobiculo cordis siue ventriculi regione, qui versus umbilicum et interdum versus costas spurias sese extendebat. Porro et dolor sentiebatur in scapula. Interea abdomen tumebat et tensum erat. Si haec abdominis intumescētia et tensio, diarrhoea disparente, apparebat et dolorifica loca supra nominata inprimis occupauerat: letale inde deriuabat Noster

signum, et eius potentio-rem causam quaerit, quam flatulentiam cet. Facies tum erat fera, artus tremabant, genae rubebant, labia coeruleum ostendebant colorem, alae narium tensae et ampliatae erant. Nec quidquam hic cum natura, tum ars poterat praestare. Lochia interea bene fluebant, id quod vero Cl. HVLME negat *). Sedes itaque morbi non est in vtero neque febris causa est vterus. Raro apparebat in hac febre crisis perfecta. Galli et SWIETENIVS **) hanc febrem a metastasi lactea et ab obstructione lochiorum derivaverunt. Mammae autem usque ad mortem lacte erant impletae. Id, quod in intestinis pro lacte habuerunt, erat purulenta materia omenti. Lochia saepe plane non turbabantur, interdum remanebant sine vllis symptomatibus malignis. Vterum Cl. LEAKE semper sanum et integrum reperit. Quapropter nunquam phantasiae et deliria apparuerunt, vti alias fieri solet, vteri inflammatione praesente.

p. 18. In sectione secunda continentur practicae observationes et conclusiones ex historia huius morbi simul cum medendi ratione, quae in hac febre fuit optima. Inter conclusiones practicas hae potissimum memorantur: 1) Quaedam mechanica mutatio, quae per partum in corpore parturientis inducitur, est praecipua causa praedispiciens huius morbi et ea, quae efficit, ut haec puerperarum febris solummodo post partum appareat. 2) Est haec febris nec a metastasi lactea, nec a lochiorum suppressione, neque ab vteri inflammatione, neque a pressione vteri grauidi, vti Cl.

HVL-

*) v. supra p. 74.

**) v. ib. p. 177.

HVLME videtur *), repetenda. Venaesectionem suadet Noster, cito institui, alias prorsus omitti. Obseruauit enim pulsum debilem, plane nullam inflammationem indicantem, et postea reperit in cadaueribus quarto quintoque iam die pus, cuius generationem Noster sine praegressa inflammatione non assumit. Quapropter et adeo vrget mox ab initio venaesectionem, quoniam fera nihil iuuat, dein laudat lenia purgantia et attenuans decoctum, quod largum in modum propinari oportet, vti omnino in inflammationibus fieri debet. Cum vero pulsus debilis saepe adsit, nec minus inflammatio oriatur: suadet Noster, vt ad vitae genus, aetatem, grauiditatem cet. quidem respiciatur; attamen in primis in re dubia, pulsus etiam obseruetur sub ipso sanguinis e uena effluxu. Si tunc pulsum ictus fortiores, pleniores et aequales sunt, venaesectio fiat larga; e contrario, si sunt debiliores cum maiori inaequalitate, venaesectio est finienda. Attendendum autem et hic est ad ligaturam, quae saepe ex compressione arteriae pulsum debilem efficit. Quae cum ita sint, venaesectio primo morbi impetu est instituenda, dein vehementia et duratio horroris est minuenda; et hic suadet Noster infusum theiforme ex mentha; porro bilis, qualitate et quantitate peccans, partim eliminanda, partim corrigenda est; item diarrhoeam, si nimia est, nec critica, moderare oportet medicum et ad hunc finem obtinendum emollientia et anodyna, lenia diaphoretica; siue, si debilitas adsit nimia, opiata et leniter adstringentia remedia profunt. Denique, apparentibus signis putredinis et febris intermissionis conducunt antiseptica remedia, vt cortex. Balnea calida Nostro quidem non admodum profuerunt, interim tamen ea non reiiicit. Bilem euacuat vomitoriis eamque dein corrigit

*) v. supra p. 78.

mixtura salina, ex sale absinthii et succo citri, addito spermate ceti et gummi Arabico temperata, quae ita praeparata lenius primas vias purgat. Oleum ricini, quod et Cl. HVLME *) suavit, pariter hic Noster laudat, et illud sequentem in modum exhibet: recipe olei ricini cum vitello oui soluti vnciam vnam, magnesia albae drachmas duas, mannae Calabrinae drachmas tres, aquae hyssopi vncias octo. Misce. Detur. Signetur: omni bihorio s. trihorio duo aut plura cochlearia. Simulac leniter euacuatae sunt infimi ventris impuritates hoc remedio ex oleo ricini, dat Noster puluerem sequentem: recipe tartari emetici granum vnum cum dimidio, magnesia albae drachmam vnam. Misce, fiat pulvis in sex partes aequales diuidendus, detur per quartam horae partem vnus in iulapio sequenti: recipe aquae cinnamomi simplicis, aquae menthae vel aquae simplicis ana vncias quatuor, syrupi croci drachmas tres M.F. Iulapium. Si tartarus emeticus nimis irriter et diarrhoeam minus salutarem excitet, quinque guttulae tincturae thebaicae iulapio possunt addi. Laudat praeterea tartarum emeticum, vt praecipuum remedium in hac febre, praesertim si suam efficaciam per lenem sudorem totius corporis cum leuamine aegri et symptomatum remissione prodit. Ad hunc sudorem sustentandum calidum copiosum potum Noster suadet. Tandem fit haec febris purulenta, et in hoc stadio inquit Noster hic in corticis Peruuiani vsum, quem theoria vero pariter, ac experientia aegre admittit in hac febre. Putredini enim etiamsi cortex resistit, tamen purulenta materia in abdomine, quae inde non deriuari potest, mortem causare debet. Interim tamen, cum desit certum signum de praesentia puris, omnia tentanda esse remedia arbitratur Noster et

*) v. supra p. 76.

eo confilio corticis vsum hic largitur. Lochia hoc remedium, vti nonnulli rati sunt, non turbat, quin imo interdum auget. Diarrhoeam interdum auget cortex, et tum est addendum opium f. granatorum cortex cet. Veficatoriis, quae abdomini applicari possunt, praefert Noster sinapismos. Unguenta vt linimentum volatile (*volatile liniments*) *) aliaque cum fructu Noster adhibuit. Inter omnia remedia autem, quae vtilia in hac febre puerperarum Noster obseruauit, inprimis commendat venae sectionem in initio morbi et methodum antiphlogisticam.

In tertia sectione traditur ratio has febres p. 148. puerperarum arcendi. Potissimum haec curatio prophylactica cernitur hic in diaeta, inprimis vegetabili, puritate aeris, linteaminum cet, quiete, animi tranquillitate cet.

Morbi historias et super iis annotationes complectitur quarta pars, additis praeterea nonnullorum cadaverum sectionibus. Si deiectiones sint putridae, clysmata adhiberi possunt ex aere fixo; de quibus alibi **) dictum est. Omentum fere omne in pus mutatum et resolutum; reliquam partem inflammata et intestinis adhaerentem Noster reperit. In pelvis cauitate putrida et sero lactis similis humiditas, quae pure crasso et cruore, qui ex arrosis vasis omenti manare videbatur, mixta erat. Vterus iam erat contractus, caeteroquin sanus et integer. Hepatis substantia erat illaesa, eiusque color ac si coctum fuisset. In intestinis

F 3

erat

*) V. EVCHAN'S domest. medicine. v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 585.

**) v. comm. nostr. Vol. XXI. in 98. 125 453. 446. 600.

erat quoque obscure viridis humiditas. Pulmones erant sani, paululum vnus lobus pleurae adhaerebat. Mentionem hic facit Noster phaenomeni, quod contra suam sententiam de sede et causis huius febris puerperarum apparuit. Omnes puerperae, quae hac febre afficiebantur, mammarum morbis sunt destitutae; e contrario quarum mammae vlcerosae fiebant; nullae sunt mortuae, item etiamsi mammarum vlcera multas creabant dolorosas molestias, tamen febris non erat tam vehemens, quam haec febris puerperarum, nec diarrhoea aderat.

Ex reliquis cadauerum sectionibus id, quod non multum ante breuiter tradidimus, probatur confirmaturque: nonnulla igitur partim phaenomena, partim conclusiones solummodo hic ex iis notabimus. Raro occurrunt in his puerperarum febribus vlcera purulenta thoracis. Bilis plerumque ita crassa erat, vti mel, et fusca. Thoracis mediastinum erat inflammatum, pulmones vero sani reperiiebantur. Interdum in thorace materia purulenta aderat, illaesis tamen pulmonibus. In vno cadauere Noster solummodo reperit omentum, nec corruptum, nec suppuratum. Intestina interdum erant inflammata. Apparuerunt quoque petechiae in quibusdam aegris.

In nosocomio obstetricio Londinensi (*Westminster Lying-in Hospital*) sunt decem domicilia. Numerus erat earum, quae pepererunt in hac domo a 10. Aprilis 1767, quo anno et illa est fundata, ad 30 Novembris 1769, CCLVIII. Ex illis tres febre puerperarum laborarunt et vna ex iis periit. Alia moriebatur variolis die primo post partum. Ab initio Decembris 1769 vsque ad 15. Maii 1770. epidemica haec febris erat. In ea domo hoc tempore LXIII erant puerperae. XIX earum febre puerperarum laborarunt, aliae leues modo insultus habebant. Ex iis in nosocomio morie-

moriebantur vndecim et duae apud suos affines. In eadem periodo vna puerpera in nosocomio intesti-
norum inflammatione obiit. A. 15. Maii 1770 ad 29
Septembris 1772. CCCV. puerperae in nosocomio
puerperii tempus absoluerunt et inter eas duae tan-
tum vitam cum morte commutarunt.

Haec febris Londini iam 1760 epidemice gras-
sata est. In Brittannico nosocomio obstetricio a
12 Iunii ad vltimum diem Decembris eiusdem anni
viginti et quatuor obierunt. Ab eo tempore haec
febris vsque ad annum 1770 nunquam tam peri-
culosa euasit.

In secundo tractatu de natura, et causis haemor- p. 243.
rhagiarum vteri, quae partum vel antecedunt, vel
sequuntur atque de earum medela differitur a Cl.
LEAKE. Vteri haemorrhagiae oriuntur a violenta
extractione placentae, a continuata item uteri ex-
tensione per fetum relictum, vti fieri solet in par-
tu gemellorum, nec minus eae deriuandae sunt a
defectu vis contractilis vtero propriae, qui
plerumque sequitur debilitatem et laxitatem
solidorum in vniuersum. Si quis eos casus defini-
re vult, quibus vel topica remedia vel interna me-
dicamina vel tandem arte excitatus partus condu-
cat, causae haemorrhagiarum et symptomata ae-
grarum, corporis constitutio atque varia conditio,
in qua vterus ante et post partum versatur, dili-
genter sunt expendenda. Postulant interdum hae-
morrhagiae vteri partum artificialem, qui minime
est accelerandus, sed viribus vitae declinantibus, et
tum vel animi deliquiis praesentibus partus est pro-
movendus. Cortex vero cum elixirio vitrioli hae-
morrhagiis sedandis seruiit. Narrat hic Noster
exemplum, quod Cl. COTE obseruauit, vbi placen-
ta penitus vtero adhaerebat, magna pars vero

spurii chorii s. membranae deciduae Cl. HUNTERI separata erat ab utero. Venaesectiones hic raro conducunt, licet eae simul cum usu interno remediorum adstringentium, opii, ac quidem magna in dosi, ligaturaque membrorum praecipua haemorrhagias sistendi remedia, uti putant, efficiant. Adstringentia, imprimis saccharum saturni reiiicit Noster. Exemplum narrat, ubi eius usus obstructiones pertinaces alui, doloresque colicos et spasticos effecit, nec quidquam ad haemorrhagias uteri sistendas contulit. Ad extensionem arteriarum uterinarum imminuendam et haemorrhagiam ea ipsa temperandam suadet Noster relaxantia remedia. Quorsum et refert tartarum emeticum in parca dosi. Excitavit enim quarta grani parte nauseam sine vomitu. Item potio salina ex nitro s. sale sedatiuo HOMBERGI huc pertinet. Quamvis enim horum remediorum effectum difficile definiiri posse Noster largitur; tamen experientia confirmat in hoc casu eorum utilitatem. Quod opii usum attinet in his haemorrhagiis, observavit Noster quidem magna opii dosi dolores ad partum esse imminutos, parva auctos contra, cuius rei et Cl. YOUNG mentionem iam fecit, attamen haemorrhagiarum potius augmentum, quam decrementum Cl. LEAKE expertus est; quapropter opii usum, cuius vis cum effectibus volatiliu exaestuantiu et cardiacorum remediorum maiorem in modum convenit, in haemorrhagiis rarius conducere arbitratur. Ligaturas extremitatum iam veteres ad haemorrhagias sedandas laudarunt, Noster vero eas reiiicit et theoretice atque practice noxias periculosasque iudicat. Frigidum contra regimen, epithemata frigida, pediluvia e. s. p. his haemorrhagiis moderandis pulchre serviunt. Haemorrhagiae ante partum sunt periculosiores iis post partum. In haemorrhagiis post par-

partum iniectiones vterinae adstringentes vel purificantes conducunt. cet.

In tertia tractatione de conuulsionibus et aliis breviter letalibus s. acutis morbis gravidarum agitur. Venaesectioni deriuatoriae et reuulsoriae Noster non fauet. Conuulsionibus neque semper sedat partus*), neque continuo sunt letales. Id quod Noster quibusdam morbi historiis probat atque confirmat. Reliqui morbi, quos hic potissimum Cl. Auctor contemplatur, sunt inflammatio pleurae s. pleuritis, dysenteria et variolae, quibus grauidae iis laborantes facile moriuntur. Mulierem in vtero gerentem ab acuto aliquo morbo corripit letale esse, legimus apud HIPPOCRATEM; Noster vero e contrario exemplum hic memorat, vbi grauida morbum acutum feliciter superauit et partum iustum atque integrum absoluit. Methodus medendi dysenteriae conuenit cum curatione diarrhoeae in puerperis, quam supra Noster cum Lectoribus communicauit. Opium in dysenteria raro leuamen, quod durat, efficit; auget potius anxietates et dolores intestinorum, cum euacuationem materiae morbificae impediat. Variolarum vestigium nunquam Noster obseruauit in fetu, adsunt vero profecto exempla **) etiam si Cl. COTVNNIVS ***) ea negat. SWIETENIVS †) narrat rarum exemplum grauidae, laborandis variolis, quae feliciter et rite peperit. Nos aliquoties abortum obseruauimus post feliciter superatum variolarum morbum; id quod plerumque fieri et Cl. LEAKE asserit.

F 5

XIII. A

*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 684, 699. et ib. decad. II dae suppl. II p. 201 et sq..

**) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 506. it. Vol. XIX. p. 75. ib. decad. Imae suppl. IV. pag. 694 seq.

***) v. ib. Vol. XVIII. p. 411.

†) v. ib. Vol. XIX. p. 75.

A Treatise on the management of pregnant and lying-in women and the means of curing, but more especially of preventing the principal disorders, to which they are liable. Together with some new directions concerning the deliivering of the child and placenta in natural births. Illustrated with cases. By CHARLES WHITE F. R. S. Member of the Corporation of Surgeons in London and Surgeon to the Manchester Infirmary. London printed for Edward and Charles Dilly 1773. 8. pagg. 353. tab. aen. 2.

i. e.

Commentarius de cura praegnantium et puerperarum, nec non methodo medendi his morbis vel praesertim praeservatione. Accedunt noua praecepta circa partum pariendi et modum placentam soluendi in naturali statu, casibus illustrata Auctore CAROLO WHITE.

Primum quidem Cl. WHITE inquit in causas et symptomata febris puerperarum, dein contemplatur febrem miliarem et lacteam, postea vniuersales cautiones tradit varios grauidarum morbos arcendi, item partum naturalem considerat, atque secundinarum solutionem, et dolorum post partum rationem habet; porro docet, quomodo febris puerperarum et lactea sint arcendae, demum methodum medendi miliari feбри communicat et varios casus et obseruationes simul cum appendice ad-

addit. Prodiit quoque huius libri versio Germanica variis annotationibus ditata *).

Vera origo huius febris puerperarum cernitur p. 1.
ex Nostri mente in putredinosa aeris conditione**),
quae non a calore aeris deriuanda est, nec ex aestuantibus
et calefacientibus medicaminibus interne datis
tribuenda. Putredinem autem augere potuerunt
hae res; calor enim aeris et omnino regimen calidum
multorum symptomatum huic feбри puerperarum
superuenientium causa est. Vti porro lochio-
rum retentorum vapores possunt resorberi et ab hu-
moribus excipi et causa febris puerperarum fieri,
quae horrore apparet: sic ea febris puerperarum
ex contagio interdum epidemice grassatur et
magis putridae, quam inflammatoriae est indolis.
Oritur ergo, vti Cl. WHITE arbitratur, ex conta-
gio putrido, bile acre putrida et putridis omnino
impuritatibus intestinorum et partium genitalium,
quas Cll. HVLME et LEAKE illaesas ***) deprehen-
derunt. In abdomine eorum cadauerum reperitur
extrauasatum serum, sero sanguinis cum pure simile,
talis quoque materia in superficie intestinorum adest. P. 27.
Febris miliaris †), quae valde olim fuit communis
puerperis, raroque critica, hic describitur et huius
morbi antiquitas traditur. Inter multos Auctores, qui
purpurae mentionem fecerunt, a Nostro notatos,
memorabimus modo ALLIONIVM (*) et SCHVL-
ZIVM

*) CARL WHITE von der Behandlung der Schwangeren
und Kindbetterinnen. Aus dem Englischen übersetzt,
mit Kupfern. Leipzig bey Caspar Fritsch 1775. 8.

**) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 447.

***) v. supra p. 75 et 81.

†) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 420. 524. ib. Vol.
XIV. p. 671. et 680 it Vol. XVIII. p. 349. it. ib.
decad. IIdae suppl. III. p. 505.

(*) EIVSDEM tr. de miliarium origine progressu natura
et curatione. Turin. 1758. 8.

ZIVM DE SCHVLZENHEIM *). Plurima enim huc pertinentia scripta v. g. HAENII, STOERCKII, CVLLEN, COLLIN cet. a nobis in his commentariis nostris sunt indicata, vti partim ex iis, quae iam laudauimus, apparet et praeterea ex indicibus horum commentariorum apparebit. Vtrum critica, an symptomatica sit purpura? potissimum quaeritur, et varie quoque ab aliis atque aliis viris doctis sentitur in hac re. Nos vero arbitramur, purpuram rarissime esse criticam, eamque pariter, quae puerperis superuenit, quam quae et in aliis aegris apparet, saepissime symptomaticam esse, atque pendere potissimum ab impuritatibus infimi ventris et regimine nimis calido. Noster quoque purpuram non criticam esse iudicat.

p. 56. Febrem lacteam oriri Noster affirmat ex collecto in mammis lacte, quod non fugitur, sed resorbetur atque cum humoribus denuo communicatur. Causas inter alias, ob quas lactatio nequit institui, Noster et memorat nimis impressas papillas per angustos thoraces. Suctio conuenit cum antliae pneumaticae effectū, vti et Cl. STEINIVS **) monstrauit ideoque antliam lacteam invenit. Ductus galactophoros in mammis dum describit Noster, asserit eorum ibi, vbi in papilla se finiunt, plerumque septem numerari seu octo. Sunt autem ibi multo plures.

p. 64. Quarta in sectione cautiones tradit Cl. WHITE morbos gravidarum arcendi. Vulgare remedium contra abortum hactenus fuit venaesectio; Noster vero eam caute esse instituendam suadet, quoniam ea ipsa minus opportune adhibita abortum

ciere

*) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 151.

**) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 101.

ciere potest. Omnino corpora nostra non ita esse amplius plethorica, vti olim, monet, idcirco et venaesectione non crebro opus est in grauiditate. Mentionem quoque facit Cl. LOBB*), qui, cum de abortu differit, quaedam contra venaesectionem in grauidis monita addit. Cl. LOBB nimirum putat quantitatem menstruorum singula vice esse quinque aut septem vnciarum. In decem mensibus itaque septuaginta erant vnciae seu librae quatuor et sex vnciae sanguinis. Fetus autem cum secundinis pondus est multo maius. Narrat Cl. LOBB exemplum fetus, cuius pondus erat sedecim librarum septemque vnciarum, placentae vero librae vnus et quatuor vnciarum. Qua de re Cl. LOBB potius ad inopiam, quam ad copiam sanguinis in grauidis respicit et ita venaesectionem inter causas abortus refert. Noster adhibuit ad abortum praecauendum lac asininum, aquas Pyrmontanas et Selteranas, corticem Peruvianum, elixir vitrioli, balnea frigida interdum et equitationem. Balnea non nimis sint frigida, sed suadet Noster aquas Buxtonianas s. Matlockianas**) aut domestica balnea parum tepida. Praeter haec auxilia, abortum arcentia, lenia laxantia quoque adhibet, nec timet hic Cl. WHITE de vomitoriis. Mentionem quoque facit radicis Columbo, quae putredini carnis non ita quidem resistit, vti cortex Peruvianus, attamen hunc et flores chamomillae in bilis putredine arcenda eaque, si adest, quoque corrigenda superat. Ea, quae Cl. PERCIVALL de hac radice monet, alio loco a nobis ***) iam sunt narrata.

Oua

*) The practice of physic in general Vol. I. et II. By THEOPH LOBB London 771. 8. p. 89. it. *Anleitung zur ausübenden Arzneykunst.* Leipzig 1772. 8

**) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 100. 446.

***) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 442.

Oua cruda impediunt et sanant quoque iſteruin gravidarum, vti Noſter arbitratur, et ipſe expertus eſt: idque ita, vt mucum, oriſcium ductus choledochi communis infarcientem obſtruentemque, ſoluant, bilisque fluxum in inteſtina faciliſent. Praeſente autem obſtructione hepatis, ſeu calculis in veſicula fellea habitantibus, nullum inde exſpectari poteſt auxilium. Quod ſi vero aeger oua cruda reſpuat, ſeu morbus nimis pertinax ſit, parua doſis calomel tuto et vtiliter poteſt adhiberi. Finit Cl. Auſtor hanc ſectionem monitis contra thoraces et omnia omnino veſtimenta, quae abdomen comprimunt, et contra abdomen grauidarum nimis pendulum commendat ligaturas latas.

p. 82.

Contemplatur tunc primum Noſter partum naturalem, de ſecundinis agit et, quomodo dolores poſt partum ſint arcendi, docet. Diligenter curat aeris puritatem in parturientium domiciliis. Quapropter ſuadet, vt parturiens nec in vno ſitu, nec in vno domicilio maneat continuo, ſed doloribus ad partum ſedatis et exploratione vteri facta, ambulet et ex vno domicilio in alterum ſe conferat, vſque dum noui dolores appareant. Eodem conſilio vrget non adeo magnum adſtantium numerum, quibus ipſis calor hypocauſti et inde quoque humorum circulus augetur. Repetit enim Noſter ex hac aeris impuritate et regimine parturientis calido, febres varias puerperarum aliasque moleſtias. Nec acceleranda nimis ſunt naturae conamina in partu, ſed potius ei committenda. Improbatur igitur capitis extractionem citam, ſimulac pars capitis ſe oſtenderit, et derivat inde ſecundinarum facilem et difficilem expulſionem et dolorum poſt partum lenimen. Porro ſi naturae haec tota res committatur, capite expulſo,
axil-

axillae sese vertunt atque prodeunt. Nam caput et axillae in vna eademque directione non prodire debere Noster monet. Secundinarum placentarum subitam extractionem Noster reiicit et naturae committit lubenter hanc expeditionem. Pinguium remediorum externus abusus cernitur in impediendo eo humore, qui humectat et lubricat sponte has partes et partum faciliat. Concedit itaque horum pinguium remediorum vsum non prius, quam muco naturali deficiente et ficcitate partium praesente. Improbat quoque nimis citam deligationem funiculi umbilicalis. Placenta interdum sponte abscedit et in vaginam propellitur. Hoc in casu caute ea est tractanda, ne, vti alias solet, quid de membrana decidua s. caduca HUNTERI, quam Cl. LEAKE *) descripsit, seu de chorio et amnio remaneat.

Porro de febre puerperarum miliari et lactea Noster agit. Atque hic potissimum vrget aeris puritatem, regimen non calidum, dietam vegetabilem cet. horumque ratione habita, nullam puerperam Noster amisit. Deiectiones virides infantum multo saepius sunt sequela debilitatis et laxitatis in organis digestionis et inertiae bilis, quam lactis corrupti **) Laudat hic Cl. Auctor Sago ex America septentrionali ***), vnde cum aqua gelatina paratur nutriens,

*) v. supra p. 88.

**) Solent plerumque hae virides infantum deiectiones dietae erroribus, a nutricibus commissis, et inde corrupto lacti tribui. Sed hoc non semper saltem ita esse, nobis ipsis nota sunt exempla. Aliquoties eandem ob causam abdicatas esse nutrices, obseruauimus; neque tamen ullam mutationem in deiectionibus deprehendimus.

***) Illa species vero nobis non est nota. Affertur enim ex India Orientali et est medulla Cycas circinalis

triens, acrimoniam inuoluens et recreans remedium. Praefert hoc remedium ratione gustus et pretii radici salab orientali. Minus tamen sumtuosior est praeparatio salab ex variis orchidis speciebus a Cl. MOULT propofita *). Quemadmodum fudor omnibus hominibus et sanis quoque nocet, sic praecipue puerperis. Lochia enim turbantur, corpus relaxatur atque laeditur. Refrigeriis facilius quoque sunt exposita corpora sudantia. Quapropter Noster vrget aeris puritatem, item linteaminum vestimentorumque crebram mutationem. Cortex Peruuianus, vti et supra **) assertum est, non impedit lochia. Quae si sint nimia, temperantur vitriolico acido, epithematibus ex aceto cet. Sella commoda, ex qua lectus potest facile parari, hic in icone sistitur. Item lectum ferreum obstetricium hic in icone repraesentat Noster, quo facile vt sella quoque vti possunt puerperae.

p. 185. In septima sectione tractat Noster methodum medendi febribus puerperarum. Frigus, quo ipsa haec febris incipit, non adeo periculosum Noster iudicat, nec vnquam in eius stadio quandam mori vidit. Febrem algidam senum letalem et frigus saepe iis letale, qui vaga materie arthritica laborant, alii obseruarunt, Sudor subsequens per paucas horas durans meretur aliquo modo nomen sudoris critici. Quod si vero ille diutius dureret, debilitat et relaxat corpus auget pulsus cele-

rita-

nalis. Adest et vilior eius species, quae est ex Chamaeropo humili LINNAEI.

*) v. ib. Vol. XVIII. p. 641. it. Vol. XIX. p. 97. it. Vol. XX. p. 289. it. Vol. XXI. p. 445.

**) v. ib. Vol. hoc p. 85.

ritatem, debilitat eius vim, efficit sitim et alui obstructionem, lactis et lochiorum copiam imminuit, feruit putredinis augmento et saepe purpuram albam rubramue seu vtramque causat. In omnibus febribus putridis iuuant emetica copiose exhibita. Continet enim saliuā, quae deglutita in ventriculum delabitur, et reliqui succi in ventriculo et duodeno confluentes parum aeris fixi *) seu plane nullum et ita facilius attrahunt particulas, quae saepius non satis euacuari possunt. Multa remedia, quae et Noster hic proposuit, a Cll. HVLME et LEAKE **) sunt laudata. Diarrhoeae conducit decoctum fabae minoris siue equinae BAVHINI (*horse beans*). Inter iulapia cardiaca miscet Noster adstringens quoddam gummi profunde rubrum ex Africa allatum et a IOANNE FOTHERGILL descriptum ***) qui, quoniam ex ista potissimum regione, quam flumen Gambia dictum alluit, hucusque allatum fuit, illud gummi rubrum adstringens Gambiense nominari posse arbitratur. Vsum aeris liberioris linteaminum recentium et aquae frigidae†) ad pedes manus dentesque lauanda Noster commendat et in hac febre. Sudor in ea non vrgendus est ††). Nitrum est tam in hac febre, quam in reliquis morbis a nimia copia bilis putridae oriundis minus salutare remedium secundum Cl. PRINGLE tentamina. Venaesectionem

*) v. comm. nostr. Vol. XIV. p. 338. seq. v. supra p. 85.

**) v. supra p. 75. et 82.

***) v. Medical observations and inquiries Vol. I. p. 358. In Germanica versione huius libri, quae Altenburgi prodiit 1759. p. 327. it. comm. nostr. Vol. VIII. p. 317.

†) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 350. seqq.

††) v. supra p. 75 seq. et 82 seq.

nem, de qua adeo disputatum est in vtramque partem, vti Cl. HVLME *) et Cl. LEAKE **) narrarunt, Noster hic non largitur, nisi inflammatione praesente vteri. Fomenta et vapores sunt noxia ob calorem humiditatemque, quae relaxant et putredini generandae seu augendae seruiunt. Omnes propemodum vesicatoriorum vsum in his morbis recte reiiciunt, ob vim irritantem et resolventem cantharidum, quae inprimis penetrat vias vriniferas, item nocent emmenagoga remedia.

p. 222. Venimus nunc ad methodum medendi febriliari, cuius arcendae non multum ante ***) dedit consilia Cl. WHITE. Magnam omnino meretur attentionem haec febris miliaris puerperarum. Aegrae enim saepe nec nimis roborantia remedia, nec debilitantia ferre possunt. Euacuationes non debent esse magnae. Venaesectio, purgantia et vesicatoria non admittenda sunt, nisi in vltima morbi huius periodo. Diaphoretica et diuretica remedia hic nil praestant. Camphorae †) vsum non suadet Noster. Ea enim copiose adhibita stranguriam, alui obstructionem, aestum, sitim, spasmos, quid quod conuulsiones in quibusdam aegris produxit. Nullum victum animale, nil, putredinem alens, calefaciens stimulus seu humores resolvens dari oportet, excepta vltima huius morbi periodo. Lenia vomitoria et clysmata emollientia in hoc morbo profunt. Aer frigidus, caute admissus, non repellit exanthemata.

Tran-

*) v. supra p. 77.

**) v. supra p. 83. sep.

***) v. supra l. c.

†) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 513.

Transit Cl. WHITE iam ad morbi historias et p. 242. obseruationes ex iis hic communicat, quae consilia Cl. Auctoris in hoc suo libro proposita confirmant atque illustrant. Placentam incarceratam Noster non suadet manu liberare, sed spasmi vteri opiatis remediis sunt compescendi. Quamuis porro placenta nonnullos dies post partum sine euidente damno puerperae remansit: tamen obstetricius medicus puerperam non derelinquere potest, nisi placenta soluta. Situ denique puerperae bene obseruato et regimine frigido adhibito, raro Nostro necessaria videtur placentae extractio.

Appendicem Cl. WHITE addit, quae in se con-p. 313. tinet monita de hoc morbo puerperarum ac potissimum contra Cl. HVLME sententiam de morbi huius indole, causis et symptomatibus. Putat scilicet Cl. HVLME, vti supra *) tradidimus et ex sectionibus cadauerum, a Cl. HVLME susceptis, patere videtur, sedem huius morbi esse omentum, quod nimirum cum intestinis semper inflammatum et corruptum reperit. Deriuat quoque hunc morbum a pressione partium per grauiditatem inducta. Vtrinque autem Noster a Cl. HVLME partibus non stat. Necesse enim Cl. WHITE iudicat, vt prius, quam ex sectionibus cadauerum quis quid colligit, disquiratur, numne eadem mutationes post alios morbos quoque apparuerint, et tum definiatur, vtrum haec febris puerperarum sit inflammatoriae, an putridae indolis? Vtrique scopo attingendo seruiunt, vti Cl. WHITE putat, quaedam loca aliorum Auctorum, hanc rem illustrantia, quae idcirco hic communicat. Sunt hi Auctores Cll. CLEGHORN **)

*) v. supra p. 78.

**) v. comm. nostr. Vol. I. p. 615.

PRINGLE *) CHICOYNEAV **) LIND ***) LE-
CAT, qui commemorationem malignarum fe-
brium, quae sub finem anni 1753. et initium infe-
quentis anni Rothomagum depopularunt, philo-
sophicis transactionibus †) inseruit. Et ex his lo-
cis elucet, in omnium febre putrida maligna de-
mortuorum cadaueribus intestina et omentum fuisse
gangraenosa. Pressionem grauidi vteri quoque
non iudicat Noster causam huius morbi ††), nec
omnibus puerperis superuenire debere hanc fe-
brim largitur. Id quod demonstrat, addito catalo-
go defunctorum puerperarum, in variis magnis vr-
bibus, ex quo praeterea apparet, subinde numerum
demortuarum puerperarum magis magisque decre-
scere. Idem et hic Lipsiae obseruatur et recte tri-
buitur regimini. Secundum Nostri opinionem in-
testinorum et omenti inflammatio et subsequens
sphacelus non causa huius febris est, sed sequela
seu effectus. Verum causa immediata morbi est
resorptio acris putridae materiae ex intestinis et
vtero, praedisponens accumulatio impuritatum
ventris infimi, situs supinus, qui lochiorum stagna-
tionem causat, et defectus liberi et saepe renouati
aeris. Finit Noster hunc librum relatione Cl.
HUNTERI de hac febre puerperarum, qua fere
omnes perierunt; et literis Cl. YOUNG, in quibus
de modo puerperas tractandi in nosocomio suo re-
fertur et multae cautiones insunt, quae conueniunt
cum iis, quas Cl. WHITE in hoc suo libro dedit.

XIV.

*) v. ib. Vol. II. p. 400.

**) v. Traité de la peste a Paris 1744. 4. p. I.

***) v. comm. nostr. decad. IIdae suppl. III. p. 412.

†) v. ib. Vol. VIII. p. 140.

††) v. supra p. 78.

XIV.

Observations on epidemic disorders, with remarks on nervous and malignant fevers. By JAMES SIMS, M. D. London, printed for T. Johnson; and T. Robinson. MDCCLXXIII. 8. mai pagg. 278. praef. pagg. 6.

i. e.

Observationes super morbis epidemicis, cum annotationibus super febribus nervosis et malignis. Auctore IACOBO SIMS M. D.

Praemissis quibusdam generalioribus de usu descriptionum morborum epidemicorum, descriptionem breuem comitatus Tyronensis in Hibernia, in qua sequentes observationes maximam partem institutae sunt, exhibet Cl. Auctor, ex qua patet, hanc regionem in genere esse humidam et vdam, cum ob fluuios lacusque, quibus circumdatur, tum ob fluuios, a quibus transeuntibus invndatur, imbresque copiosius per hyemem et ver decedentes: vnde rheumatismi, scrophulae aliique scorbutici dicti affectus hic endemii morbi sunt. Ab annis 1751 ad 1761 perpetuo fere frigida temperies fuit; anni 1761. et 1762 plus solito sicci erant, adeo, vt febres intermittentes ab eo tempore rariores existerent, et Noster inde ab anno 1764 ne unicam quidem regularem viderit; 1763 et 1764 variae erant tempestates, sed magis humidae, absque tamen epidemico quodam morbo.

Tunc autem prima constitutio, quam Auctor p. 12 noster pertractandam sibi sumsit, incipit, ab initio anni 1765 vsque ad finem aestatis 1767. Post hyemem tempestuosam, sed moderati frigoris, ver tempestivum et aestas atque auctumnus ficciores et

amoeniores sequebantur, in Decembrem vsque perdurante mitiore tempestate. Hyems anni 1766 cum frigore intensiore sicca erat, donec medio Februarii larga nix caderet; Martius in principio tempestatis amoenae, versus finem variabilis; ver et aestas subsequens amoenissima, versus finem Augusti procellis excepta, quas tamen versus aequinoctium autumnale temperies grata insequebatur. Vltimis duobus mensibus eadem varia erat, inprimis ventis impetuosioribus interrupta; initium anni 1767 frigore intenso cum crebra niue stipatum erat, ver variabile, sed demum serenum; Maius et Iunius amoeni, intercedentibus interdum pluviis levioribus; Iulius frigidus et pluuiosus.

p. 14. Iam de morbis epidemicis, per hoc stadium observatis. Primo de febribus petechialibus, vere 1765 occurrentibus, quae adeo leues erant, ut vix auxilium requirerent; somno profundo terminabantur, qui si vesicatoriis et cardiacis turbaretur, morbus potius difficilior reddebatur.

p. 16. Post aequinoctium vernale subita venti mutatio phrenitidem veram inducebat, quae in iis, qui potentis spirituosus abusi fuerant, saepe fatalis erat, et quarto die morte terminabatur. Potentissimum auxilium in venae sectione larga, protinus administrata, positum erat, cui tamen Noster arteriae temporalis aperturam praefert, asserens, 12 vel 14 uncias sanguinis ex hac emissas maioris esse efficacitatis, quam 30 ex brachio. Fascias ad hanc operationem sollemnes reiicit, et tantum numum mediae magnitudinis (*shilling*) linteo gradatim compresso inuolutum superimponendum et per satis longum tempus retinendum suadet. Antimonialia, vesicantia et sinapismi, aequae ac omnia remedia calefacientia aperte nocebant: sed insignis

nis vsus erat fomentum partium inferiorum cum pannis ex aqua calida expressis, crebrius repetendum, quo perspiratio placida producebatur, quum sudor quouis alio modo prolicitus noxius esset, et aegri sub eodem profusissimo furibundi perirent. Acida larga dosi exhibita etiam multum praestabant: sed raro aegri aut haec aut alia medicamenta sumebant.

Menſe Iulio Sequentis anni colica bilioſa inci-
piebat, Auguſto vltcrius ſerpens, et cholerae, poſt-
eaque iliaco morbo iuncta. Colica frequenter a
refrigerio oriebatur, frequentiffime feminas me-
diam aetatem vix ſupergreſſas inuadebat, inque his
inſultibus repetitis facile in paſſionem iliacam tranſ-
ibat, quod etiam accidebat, vbi morbus intempe-
ſtiue opiatſis vel adſtringentibus reſpreſſus fuerat.
Interdum ſubito inuadebat, interdum per vnum
alterumque diem, torpor antecedebat, quo per-
cepto ſi protinus larga ſucci citri quantitas vel eua-
cuantia adhibebantur, morbus in primo principio
ſupprimebatur. Si ſaburra bilioſa in veſicula hae-
rebat, pulſus erat paruus et intermittens; ſin ad
inteftina iam deſcenderat, plenus et fortis. In
vtroque caſu venae ſectio, et in poſteriori ſaepe ea-
dem repetita requirebatur: qua occaſione de ne-
ceſſitate huius auxilii in inflammatione inteſtino-
rum vel iam praefente, vel imminente, licet debi-
litas pulſus eam non indicet, inprimis contra
BOERHAAVIUM, diſſeritur. Vomitoria non niſi
tunc indicantur, quum ne leniſſima quidem inflam-
mationis aut motus periftaltici inuerſi ſuſpicio ad-
eſt: hoc in caſu in ſolis laxantibus ſubſiſtendum,
ex ſalibus neutris, cremore tartari, oleo ricini, vel
pauca ialappa cum ſaccharo remiſta, opium non-
niſi prorfus liberis redditis primis viis exhibendum
eſt.

p. 29. Eosdem morbos iulio et augusto 1772 obseruauit, ubi inprimis semicupiorum vsum insignem in morbo iliaco laudat. Subito recrudescentem vidit hunc morbum ab haustu vini pomacei adeo, vt aeger intra paucas horas periret. Quum solitae medendi methodi adeo insufficientes saepe sint, suadet, vt imminuta satis massa sanguinis, profusus sudor, lectis copiosius impositis, excitetur: qui certe salubrior sit futurus, quam qui, opio dato, proliciatur.

De usu emeticorum antimonialium in cholera: vero simile videtur, eadem semper valentius agere, si acidum in ventriculo adsit, idque adesse semper in ventriculis debilioribus, quamuis non semper sufficientibus signis se prodatur. Vfus antimonialium in morbis biliosis a nullo alio medicamento tantus expectari potest: sed communis ea exhibendi methodus in refractis dosibus Nostro ob effectum purgantem minus placet, qui conuenientem dosin vnica vice sumendam praecipit, cuius effectus si forte nimius fuerit, dato opio coerceri poterit.

p. 34. Frequens tunc temporis inprimis morbus erat, quem Noster inflammationem hepatis iudicabat, cum febrilibus symptomatibus pleuritidem vel peripneumoniam mentiens, qui tamen error funestis sequelis carebat: signum pathognomonicum erat dolor acutissimus in scrobiculo cordis a leuissima pressione excitatus; crebrius, licet iam quatuor vel quinque hebdomadas durasset, recrudescebat paucis mensibus interiectis, adeo, vt intra paucos annos a sex ad octo vices idem subiectum adgrederetur. Venae sectione vix vnquam supersederi poterat, imo interdum secunda vel tertia vice sanguinem
mitti

mitti oportebat, qui crustam inflammatoriam monstrabat: dein lenia, sed diu continuanda purgantia requirebantur; vomitoria autem aequae ac calida medicamenta morbum exasperabant. Ad praecavendum relapsum diaeta refrigerans vegetabilis cum interpositis lenioribus laxantibus conducebat: recidivae frequenter incurabilem icterum et hydropem producebant.

Tempore autumnali, quum epidemia biliosa cessaret, variolae pessimae indolis succedebant, usque ad ver subsequens anni 1767 grassantes, quum antea per aliquot annos regionem immunem reliquissent. Ex mille infantibus vix dimidia pars, et ea quidem magnam partem aut alterutro, aut utroque oculo priuata, aut facie cicatricibus foedissime deturpata evasit. Variolae maturitatem proprie non assequebantur, sed totum corpus continua crusta obtegebatur. Foetor intolerabilis tantum aberat, ut symptoma mali ominis putari deberet, ut potius euentum prosperum praenunciaret. Qui calida methodo tractabantur, a septimo ad nonum, imo iam quinto die peribant, accedente purpura: alii, refrigerante methodo tractati, tamen vigesimo die et tardius succumbebant. Sudor, diarrhoea et ptyalisimus vel nunquam, vel rarissime usum quendam praestabant, licet purgantia in principio morbi, per tempus sufficiens continuata, utilissima essent. Tantum etiam aberat, ut frigus hyemale subsequens morbum supprimeret, ut potius tunc magis inflammatorius redderetur. Qui paullo antea scabie humida laborauerant, eum felicissime superabant: ex quo concludit Noster, eiusmodi subiecta inoculationi esse aptissima, sicut ipse a chirurgo quodam narratum accepit, puellam post exstirpatos quosdam tumores scirrhusos a violentia externa ortos, quum ulcera adhuc

p. 36.

p. 41.

pure manarent , variolas naturales benignissimas superasse.

Morbus hic omnibus remediis alias efficacibus obsurdescebat, licet methodus refrigerans aliquos feruaret, et in reliquis mortem saltem retardaret. Tandem Noster aperturam pustularum in facie reiiicit, qua cicatrices euitare student: vnicam enim pustulam hanc cautionem superfluam reddere monet, et confluentes malignas semper dolorem exquisitissimum produxisse memorat, quem oleum et lac nullo modo leuauerint.

P. 45. Circa aequinoctium vernale 1767, declinante diro hoc morbo, pleuritis et peripneumonia se manifestabat, quae si in principio negligebatur, res subito in peius ruebat; tunc antimonialia, cardiacis calidioribus iuncta, v. c. puluis JAMES in refracta dosi, addito sale cornu cerui, vel melius adhuc opii quadam particula, largius exhibito potu calido et lecti calore aucto, vna cum vsu liberaliore vini potulentis admixti, et vesicatoriis aut sinapismis, summi vsus erant. Cl. STACK itidem cum fructu kermes minerale adhibuit. Hac occasione in transitu etiam sententia HUXHAM, omnia praeparata antimonialia eodem modo agere et solam differentiam in dosibus maioribus vel minoribus positam esse, refutatur. Venae sectio largior requirebatur, etsi aeger quinto demum vel sexto die auxilium posceret, et iam sputum purulentum excerneret, modo febris in corpore plethorico primum vehemens fuisset, neque tunc vires nimium fractae essent. Si post sanguinem copiosius et iterata vice missum febris quidem imminuta erat, dolor autem lateris persistebat, vesicatoriorum insignis erat vsus: et communis resina in pilulis ad dra-

drachmam et ultra data praestantior erat gummi ammoniaco similibusque medicamentis.

Similis eodem tempore morbus infantes infe- p. 54.
stabat, subito exitiosus, nisi larga sanguinis missio,
saepius iteranda, et protinus vesicatorium pectori
impositum administrarentur: quibus auxiliis si mor-
bus non protinus cessabat, emetica ex antimonio
egregie conducebant.

Hos morbos excipiebant morbilli, febre solito p. 55.
maiore stipati et facillime pulmones afficientes.
Venaesectione vix supersederi poterat: ex adultis
tamen nemo moriebatur, plures ex infantibus, li-
cet efficacissima remedia in usum vocarentur, ex
quibus tamen balnea calida nonnumquam iuua-
bant, ubi reliqua prorsus inutilia erant. Frequen-
tia etiam laxantia post morbum superatum, uti
post omnes alios inflammatorios, requirebantur.

Temporibus veris horum annorum, quae ficciora p. 57.
erant, erysipelas communis morbus erat, biliosis
praecipue et scrophulosis molestus, facile quotan-
nis recurrens, et potissimum manus occupans,
quae saepe per totam vitam contractae et tumidae
manebant. De reliquo autem funestum exitum
nunquam vidit Noster. Post venae sectionem
purgantia ex rheo vel salibus mediis morbum tol-
lebant: ubi materies biliosa parcior aderat, sudor
lenis excitatus sufficiebat, postea vero purgantia
exhibere opus erat ad praecauendam recidivam,
quam aliquando cum paroxysmo febris intermitten-
tis redeuntem vidit Noster, ad quem balnea frigida
conducebant. Similiter venae sectio et laxantia
vel nitrum vernali, et serum lactis aestiuo tempo-
re recidivam praecauebant.

p. 60. Tandem de febribus, durante hac constitutione, obseruatis, quae cum inflammatoriarum, tum exanthematicarum typum quodammodo seruabant. Saepe in purpuram transibant, cum rubram, tum albam, quae licet paroxysmo grauiore accederet, tamen morbum feliciter finiebat. Interdum, licet calidum regimen adhibitum non esset, a sola vehementia febris septimo vel octauo die maculae minores rubrae exoriebantur, febre interim cum delirio aucta, donec decimo quarto die post grauiorem paroxysmum copiosus sudor crisin salutarem efficeret. Vtraque morbi species facile spuriam pleuritidem et peripneumoniam inducebat, quae si in principio obseruabantur, venae sectionem requirebant; versus finem autem eadem noxia erat, et tunc vesicatoria et sudorifica, eaque in hac periodo calidiora, praestabant.

p. 65. Eadem febris tempore auctumnali, licet inflammatoria materia maneret, tamen indolem biliosam assumebat. Post copiosam sanguinis missionem totum negotium antimonialibus absoluebatur. Interdum nullam sensibilem euacuationem ab iis vidit Noster, sed profundum somnum ab iis indutum, quo plerumque morbus ipse disparebat. Similes effectus saepius in morbis acutis vidit, sed non nisi in iis, qui antea pertinaci peruigilio laborauerant; idem etiam vesicatoria praestiterunt. Denique disquirat, quantumtribuendum sit appetitui aegrorum in morbis acutis: huic indulgendum praecipit in principio morbi, non autem aequē versus finem, ubi iam conualescere incipiunt, quo tempore vel minimus error subito exitiosus esse potest.

p. 70. Constitutio secunda ab Augusto 1767. incipit, qui tolerabilis erat, quem vero tempestas frigida
varia-

variabilis excipiebat, usque ad finem anni perdurans. Primi tres menses anni sequentis frigore frequenti, interpositis interdum pluuiis, stipati erant: aestatis et auctumni tempestas varia, sed magis humida: versus medium Nouembris frequens, at leuius, frigus, cum ventis variae directionis.

Primo loco morborum prioris constitutionis succedebant rheumatismi chronici aequae ac acuti. Priores, frequentissimi in hac regione, saepe in morbum paralytico similem degenerabant. Antimonialia, dum sudorem mouebant, insignis usus erant, aequae ac tinctura guaiaci volatilis, aequali portione vini antimoniati remissa, et ad cochlearis minoris mensuram vesperi exhibita, sic etiam balsamus de copaiua, et terebinthina aut eius oleum. Pannus etiam rudior (*flannel*) cuti nudae impositus per tempora frigidiora anni morbum praecavebat; sed principium oleosum illi inhaerens, quicquid alii in contrarium adferant, potissimum has vires exferit. Efficacius autem et promptius tollebant morbum sudores vel partis affectae, vel totius corporis, vapore calidae excitati. Mercurialia etiam eximii usus esse, primo casu cognouit Noster, ac repetitis saepius experimentis confirmatum vidit.

Rheumatismus acutus in principio venae sectionem et laxans antiphlogisticum requirebat: alvo libera reddita, sudorifica ex antimonialibus protinus exhiberi oportebat. Quum autem aeger vel summe languescat, vel paroxysmi regulariter remittebant, cortex Peruvianus requirebatur, licet eiusdem usus in principio, ad vnum vel duos dies, morbum intendere videretur. Interdum etiam in rheumatismo chronico, vbi debilitas viscerum vel habitus scrophulosus aderat, cum fructu eodem usus est.

Tuf-

p. 80. Tussis tunc temporis frequens sanguinis missionem non ferebat, nisi ingens pectoris dolor et pulsus durus eam requirerent: omnis cura in id dirigenda erat, ut sputum rite coqueretur, quod sub moderata febre, quae peculiarem curam non exposcebat, fiebat regimine diaphoretico et potu tenui calido; febre autem imminuta sudorifica paullo valentiora in usum ducere e re erat, v. c. potum *punch* ante cubitum exhibitum: tunc etiam vomitoria multum praestabant. Nimis tenuis etiam diaeta in ultimo hoc stadio magis nocebat, adeo, ut ab excessu etiam in liquorum fermentatorum potu morbum plane disparuisse Noster viderit.

p. 84. Eodem tempore febris catarrhalis, sed benignior, communis erat, cuius signum pathognomonicum constituebat stupor, leuem cephalalgiam primis morbi diebus excipiens, et ad finem usque eiusdem subsistens.

p. 86. Neque angina, alias autumnalis magis in his regionibus morbus, facile funesta erat, licet ingens interdum periculum portenderet: malignam ulcerosam hic loci nunquam conspexit Noster, nisi in ultimo vitae stadio phthisicorum. Quae autem hic describitur, non prorsus a contagiosa indole immunis iudicata ab Auctore nostro, potius catarrhosa erat, vix non semper exspuitione lymphae copiosae clarae finiebatur, et quamquam venae sectio in principio morbi utilis erat, tamen tantos usus non praestabat, quantos in morbis inflammatoriis exserit: laxantia quotidie usurpata morbum mitigabant, purgantia fortiora ob sitim maiorem inde excitatum minus apta erant: summum vero remedium in vesicatoriis positum videbatur, quorum tamen primum raro effectum optatum edebat, qui secundum demum, cuicunque corporis parti im-

po-

positum, sequebatur; difficultatem spirandi calidus vapor aceti cum aqua permisti tollebat. Aeger quidam, in quo morbus hic ad suppurationem tenderat, solutione granorum decem vitrioli albi, summa adhibita vi, deglutita, indeque excitato vomitu, quo tumor rumpebatur, servatus est. Ad praecauendum hunc morbum conducebat alumen in ore detentum, deglutiendo salivam eodem impraegnatam.

Auctumno 1767 grassari coepit tussis conuul- p. 92.
siva, per subsequentem hyemem frequentissima, itidem contagiosa, potissimum inter infantes. In primo insultu, cui semper febris remittens iuncta erat, venae sectio utilis erat: potentissimum postea remedium in emeticis positum erat, vel singulis vel alternis diebus exhibendis, potissimum ex ipecacuanha, cui interdum scillitica iungere conueniebat; antimonialia, vtpote valentiora, nonnisi prioribus incassum tentatis, in usum vocabantur. Morbo superato, cortex peruianus, balnea frigida, et alia roborantia cum exercitio corporis, imprimis equitatione, necessaria erant. Neque opiata, neque alia antispasmodica multum praestiterunt.

Vltimus morbus, quem in decursu huius con- p. 95.
stitutionis describit Noster, ab eodem inflammatio hysterica dicitur, sexui sequiori tantum proprius, a variis causis v. c. refrigerio, obstructione mensium cet. ortus, omnes corporis partes, praecipue faciem, infestans eodem modo, vt in aliis inflammationibus, mitiore tamen febris gradu, numquam suppuratione, sed resolutione terminatus, iam intra tres quatuorue dies, iam intra duas septimanas; si mensium vitium suberat, his redeuntibus celerrime morbus cessabat. In hac causa purgantia emmenagoga praecipuum auxilium fitebant;

bant; venae sectio et refrigerantia in maiori febris gradu conueniebant: topica vero nulla, nisi vesicatoria in parte vicina applicata et diutius aperta seruata. Singulare huius morbi exemplum, vbi a potu frigido, corpore aestuante assumpto, cum febre ingenti vomitus pertinacissimus cum acutissimo in regione ventriculi dolore oriebatur, quem omnibus incassum tentatis vesicatorium loco dolenti impositum tollebat.

p. 101. Tertia constitutio annos 1769 et 1770 complectitur. Prioris hyems humida erat cum leui frigore, ver in initio amoenum, sed a fine Maii per Iunium frigidum et pluuiosum; Iulius egregius, sed reliqua aestas humida; auctumnus serenus, December demum procellosus ac pluuiosus; primum tempus anni 1770 varium, a medio Martio frigus cum niue, et inde vsque ad finem Iunii frigus satis acre cum pluua; reliqua anni pars, primis Iulii diebus et Augusto exceptis, ventosa et pluuiosa, sub finem interueniente gelu duas hebdomadas subsistente.

p. 103. Vti rheumatismi constitutionis superioris vsque ad ver 1769 perdurabant, sic iam ad finem vergente auctumno 1768 dysenteria se manifestabat, quae licet endemius huius regionis morbus sit, tamen in hac potissimum constitutione frequentissima fuit. Duplicis autem generis erat, altera acuta, quae post venae sectionem frequentiore vomitu per ipecacuanham curabatur, diaetam tenuissimam poscebat, et adstringentium opiatorumque usum prorsus non ferebat; altera chronica, saepius ex priori neglecta, saepe, potissimum inter pauperes, sine ea ex victu crudo orta, multum, quantum ex descriptione Auctoris nostri patet, cum lenteria commune habens. Hic ipecacuanha in minori
dosi

dosi, vt purgans, v. c. ad grana tria in forma pilulari quauis vespera sumta, et per aliquot dies repetita, melius praeftabat; sed efficacius agebat vinum antimoniale, quauis hora ea dosi exhibitum, vt post tertiam vel quartam dosin effectum ederet, quarto vel quinto die repetendum, et intermediis diebus vnica de die dosi, vt lenius multum purgaret, interponendum. Amara et cortex sola facile purgabant: cum successu itaque opium iis iungebatur, quod tamen solum non conueniebat. Cum his omnibus diaeta exactissima opus erat, et interpositis purgantibus lenioribus, potissimum ex ipecacuanha et antimonialibus; fortiora semper nocebant: rheum effectus, ab aliis de eo praedicatos, non edebat. Vinum rubrum ob vim inebriandi alienum erat: vinum pomaceum (*cyder*) Hibernum praeftabat, et magis adhuc Anglico, quippe magis austerum. Perspiratio, potissimum hyemali tempore, optimo cum successu mouebatur, ipso adeo potu spirituofo concentrato et inde parato eo potus genere, quod *punch* dicunt. Carnes etiam duriores, fumo induratae, in pauperioribus bene conueniebant, quibus adeo lardum in lacte recenti coctum medicina fuit.

Per auctumnum et hyemem 1769 variolae spur-
riae frequentes erant, interdum vero pure variolas
veras mentientes, vnde (vt saepius factum esse sus-
picamur) variolas secunda vice corpus aggredien-
tes putabant: eruptione earum purgantibus et
regimine frigido intercepta et retardata, symptoma-
ta ingrauescebant, sed subito, sero lactis vinoso et
regimine diaphoretico adhibito, disparebant.

Vere sequentis anni phthisis communis mor-
bus erat, quam in hac regione cum in hoc, tum
aliis annis magis a dyscrasia sanguinis, quam ab in-
flammatione pulmonum ortum duxisse refert Cl.

Auctor. Si contagium venereum praegressum in causa fuerit, id non per plures annos, uti fit interdum, in ipsa massa humorum circulantium delitescere posse sibi persuadet, sed in glandula quadam lymphatica haerere, donec vel a causa accedente quadam, vel sola mora temporis resolutum humores inficiat. Hoc in casu, nisi iam pulmones in inflammationem et suppurationem abierint, calomelanos, in refracta dosi pro scopo alterandi exhibiti, effectus egregius fuit.

p. 123. In reliquis phthiseos speciebus, modo aegri periculum sibi imminens cognoscant, dum adhuc in principio morbi medelae locus superest, vomitoria leniora, frequentius exhibita, ventriculum depurando morbum saepe leuant: his subiungebatur sulphur et cortex Peruvianus vel in electuario combinata, additis interdum balsamicis lenissimis (quae tamen sola numquam effectum laudabilem praestabant), vel sulphur solum vesperi, et cortex in decocto vel extracto aquoso per diem. Cum hoc frequenter elixirium vitrioli coniungebatur, si modo tussis illud ferre poterat. Dolor exquisitus in pectore cum febris solito maiore gradu singulis decem vel quatuordecim diebus venae sectionem ad tres vel quatuor uncias exigebat, imo interdum, si pulsus durior erat, ad sex vel septem ascendere opus erat. Vsum etiam panni istius (*flannel*) in nuda superficie corporis gestati, contra dubia quaedam defendit Noster. In corporibus phlegmaticis salutarem vidit effectum infusi picis liquidae, cui tamen, utpote solas calefacientes particulas picis continenti, in maiori febris augmento, pilulas ex pice liquida ipsa praefert. Serum lactis caprilli egregie conducebat, sed versus finem morbi, quum iam diarrhoea colliquatiua aderat, vel phlegma tenacissimum pulmones nimium obruerat, nocebat;

cebat; oportebat autem illud in locis montosis, vbi liberior erat aer, bibi, caute obseruari, num satis inde redderetur alius libera, quod si non fieret, adiungenda erant laxantia lenissima, et dosibus non adeo magnis, vt ventriculus inde grauaretur, ingeri. Oleosa omnia Cl. Auctor reiecit, solo, si vmquam iis locus fuerit, butyro recenti non salito concesso. Opiata itidem aliena sunt. Lactis vsus suspectus est ob viscidum inde in ventriculo collectum: testaceorum contra eximius, ita vt solo ostrearum vsu curatam viderit feminam. Huic tamen sexui morbus hic vt frequentior, ita minus funestus esse solet: nonnumquam matrimonio solvi videtur; sed saepe post duos vel tres annos recurrens exitialis fit. Praegnantem neminem, sed quasdam breui post puerperium eodem perire vidit, sub specie peripneumoniae solito grauioris; infantes debilissimi erant, vix 24 horas superstites. Menstruatio saepe ad finem vsque morbi perdurat, vel initio suppressa versus finem demum restituitur.

Eodem tempore morbilli, et protinus ab initio aestatis variolae, ad mediam vsque hyemem perdurantes incipiebant. Priores nihil peculiaris habebant, nisi diarrhoeam interdum adeo auctam vt opiatibus indigeret: sed si variolae non adeo durum in modum, vt superius anno 1766, grassabantur, id potius minori copiae aegrotantium, quam minori malignitatis gradui adscribendum erat. Symptomata tamen aliquantum diuersa erant, et potius neruosum, quam inflammatorium morbum prodebant: mors etiam a summa virium debilitate orta, et mortificationi vniuersali similis videbatur. Periculi maior vel minor gradus in hac aeque ac superiori epidemia non ex frequentia

pustularum in facie tota, sed tantum in superiore regione frontis, patebat. Viuida descriptio peruersae medendi methodi a populo vsurpari solitae in calore regiminis et medicamentorum, cui *No-*ster omnibus viribus resistit, quamquam non semper obedientes aut aegros aut adstantes inuenit. Solum incommodum ex regimine frigido adhibito erat tussis sicca, quam tamen tempestas serena et serum lactis caprillum tollebant. Rheumatismus rarissime insequabatur, si aeger remedio mercuriali sub initium morbi vsus esset; isque ipse successu temporis sponte disparebat. Opiata proficua non erant, et vires potius ad secundam febrem necessarias infrangebant. Cardiaca calidiora nocebant, nisi quum versus finem maturationis variolae subito subsiderent et molestissima symptomata praesentissimum mortis periculum adferrent: tunc autem vinum sufficienter calefactum praestantissimum erat. Emetica, praecipue ex antimonio etiam tunc temporis vtilia fuisse nouit Cl. Auctor. Pessimus autem morbi status erat, si variolae sensim, interdum intra 24 horas, cum iisdem symptomatibus subsidebant, quo in casu vix quoddam auxilium proficuum inuentum fuit.

p. 150. Epidemica huius constitutionis febris lente-
scens erat, haud absimilis neruosae illi Cl. HUX-
HAM et GILCHRIST, sed in eo essentialiter ab ea-
dem diuersa, quod raro, nisi vltima eaque funesta
morbi periodus iam adesset, periculum adeo in-
gens portenderet, et quod alia eidem medendi ra-
tione opus esset, plane contraria ei, quam febris
neruosa postulat. In omnibus febribus eius clas-
sis nullum melius salutis signum existit, quam lin-
gua pura et rubra. Vrina in principio morbi nu-
beculam gerens versus fundum vasis descenden-
tem,

tem, postea sensim superficiem petentem, ac demum disparentem semper in hac aeque ac malignis febribus delirium praenunciat.

In curatione huius febris, quamquam euacuanti-
tia indicabantur, tamen leuissimis tantum vtendum, et non sine taedio cum cunctatione quadam iisdem insistendum erat. Vinum et cardiaca in primis morbi periodis manifeste nocebant; sed morbo fere prorsus superato, relicta sola infirmitate, generosior diaeta summe proderat. Tunc temporis etiam cortex Peruvianus, praecipue in vino rubro infusus, egregios effectus praestabat. p. 154.

Morbus inter infantes familiaris, quem febrim verminosam dicebant, Nostro non quidem semper a vermibus ortum duxisse videtur, sed a peruerso et copiosius ingesto victu: symptomata febris remittentis cum vomitu, tussi pituitosa, convulsivis et comatosis affectibus cet. Interdum communia signa vermium aderant, hi tamen ipsi rarius apparebant Morbus raro ultra septimanam durabat, nec periculosus erat. Difficulter ab hydrocephalo interno distinguitur, nisi quum is iam vitae finem propinquum nunciat; neque morbum hunc adeo infrequentem esse suspicatur Cl. Auctor. Morbi nostri curatio in principio largam venaesctionem, et postmodum parcas, sed crebrius repetitas doses rhei, pro re nata cum magnesia vel pauca portione calomelanos sociatas, exigebat. p. 163.

Pleuritis et peripneumonia non adeo largam sanguinis imminutionem poscebant, neque bene ferebant; vnica, eaque moderata, in principio sufficiebat, cui laxantia leniora subiungi oportebat, quae copiosas biliosas deiectiones efficiebant; his neglectis, vltimis morbi diebus diarrhoea biliosa

funesti euentus accedebat. His laxantibus antimonialia addita, licet vomitum excitarent, tamen proficiebant, neque dolorem augebant. Vesicatoria tantae vtilitatis non erant, quantae alias esse solent. Neque in periculo discrimen aliquod erat, seu dolor dextrum seu sinistrum latus occupasset, quum alias dextrum semper periculosius animaduernerit noster Auctor.

p. 172. Constitutio quarta ab anno 1771 incipit, in quo inauditae vehementiae hyems fere ad finem Aprilis perdurabat; reliquus annus fere totus pluviosus erat, nonnullis tamen, potissimum mense Septembri, intercedentibus diebus serenis. Duos primos menses anni 1772 constans frigus et nix comitabantur; usque ad finem aprilis tempestas varia; succedentes tres menses sicci et calidi erant.

p. 181. Vernale tempus 1771 veras pleuritides et peripneumonias inducebat, in quibus largissima sanguinis missio protinus a principio requirebatur, adeo ut subiecta iuniora, plethorica, eadem ad 30 imo 40 vncias indigerent; sed cautione opus erat, ut tanta copia non vno impetu, sed intra paucas tantum horas, imo intra pauca minuta, digito tantum compressa apertura venae, educerentur. Iusto minor copia, etsi saepius repeteretur, tamen morbum trahebat, eiusque reditum quouis vere efficiebat, quod etiam de aliis morbis inflammatoriis valet.

p. 187. Amplissima est tractatio diri istius morbi, qui hoc anno totam ferme Europam deuastauit, quare eam penitus repetere nequeamus, aliqua saltem momenta excerpta sufficient. Agitatio tremorque omnium membrorum potissimum tum conspicua, quum febris ad summum fastigium peruenerat (quod

(quod nono circiter vel vndecimo die contingebat, notam characteristicam huius morbi praebebant. Peius etiam signum prognosticum suppeditabat continua apprehensio stragulorum ope solius pol. p. 188. licis et indicis, quam totius manus. Sudor digito exploranti peculiarem pungentem sensationem im. p. 191. primebat, non qualis a calore excitari solet (neque cutis ipsa ultra modum calebat), sed verbis non exprimendam. Intra vndecimum ac decimum tertium diem morbus vel sensim, licet vix perci- p. 192. piendo modo, declinare incipiebat, vel aegrum trucidabat. Durante hac epidemia pauci alii morbi observabantur (vt idem in peste solet fieri): qui tamen rheumatismo aut erysipelati erant obnoxii, per aliquot dies febrem epidemicae similem P. 194. experiebantur, quae subito in morbum iis familiarem et solito vehementiorem, transibat, Cl. Auctor, quamquam auxilium medici nonnisi morbo ad summum gradum euecto expetebatur, ex copiosis aegris nonnisi duos amisit, quorum alter liquoribus spirituosis ad mortis fere usque momentum haustus peripneumoniam sibi contraxerat, et alter iam in agone erat, cum aduocaretur. Venae sectio rarissime, nec nisi in primo morbi insultu locum habebat, alias certissime nocebat; ipecacuanha parum vel nihil praestabat; sudorifica, etsi ex acidis vegetabilibus, nocebant; maximi vero errores in intempestiuo vesicatoriorum usu commitebantur, sicut in genere monet Noster, in febribus p. 201. malignis nimis subitam actionem huius remedii funestum signum praebere. Cardiaca itidem morbum magis exacerbabant.

E contrario, in primo stadio morbi, acida, cum p. 204. vegetabilia, tum multo magis mineralia, v. c. elixirum vitrioli ad dimidiam drachmam quavis hora, potui admistum, conducebant, et ad praecauendum

dum morbum egregie proderant: primas tamen hic partes malis Sinensibus, si haberi possunt, Noster tribuit. Tartarus emeticus cum cremore tartari, vel vinum stibiatum decocto senae et tamarindorum additum, primas vias egregie purgabat, et sub ipso hoc effectu vires aegrorum surgebant. Tartarus emeticus etiam ad vnum vel sesquigranum quotidie plerumque exhibendus erat. In summo morbi gradu valentissimum auxilium in
p. 211. frigido positum erat, ad quod ipse instinctus aegros impellebat: imo nonnulli in aquam frigidam se immergendo sanati fuerunt.

p. 217. Eo ipso tempore, quo aegri aeri frigido exponebantur, tussim inde reportabant, quam Noster semper boni ominis, aequae ac versus finem aliarum febrium, inuenit. Praeter hoc auxilium ingens utilitas corticis Peruvianii fuit, quem in decocto saturato, additis plerumque ad singulam vnciam corticis drachmis duabus vel tribus elixirii vitrioli, dedit: rarissime tincturam eiusdem corticis decocto addere opus erat. Corticem in substantia non tentauit, cum decoctum facilius deglutiri posset. Sed maioribus dosibus utendum erat, ita ut intra viginti horas tres, imo in minus quam triginta horis quinque vnciae corticis adhiberentur: minores enim doses morbum magis exasperare videbantur. Saepe medicus tunc demum accersebatur, quum morbus eo iam deuenerat, ut euacuantibus, nec tempus, nec vires sufficerent, tunc largissimus corticis usus purgationes conuenientes praestabat, adeo, ut interdum, sed cum summa cautione, quatuor vel quinque guttae tincturae thebaicae porrigendae essent.

p. 224. Nonnumquam durante usu corticis morbus mitior et remittens paroxysmo grauiore recrudescebat, quod interdum post 24, imo 36 horas accidebat;

debat; sic etiam delirium et insensibilitas saepe per aliquot dies restabant, reliquis omnibus symptomatibus cessantibus. In statu conualescentiae, ut in aliis febribus huius indolis, vinum largiori quantitate potui admistum conducebat, quam homines perfecte sanitati restituti ferre poterant. Denique diaeta exquisitissima ad recidiuas auertendas opus erat. p. 227.

Versus finem veris anni 1772 ophthalmiae frequentes erant, potissimum ex vitiis primarum viarum ortae, et venae sectione interdum sub initium administrata, postmodum laxantibus, nitrosis, diaeta tenui, vesicatoriis et aliis vsitatis remediis adhibitis facile cedebant. Hic nimiae laudes adstringentium in hoc morbo limitat Auctor noster, eaque nonnisi inflammatione iam discussa opem ferre docet: parum aluminis vsi cum dupla portione sacchari in puluerem subtilissimum redacti et flatu oculo applicati fere omnibus aliis remediis praefert. p. 230.

De biliosis morbis huius aestatis, leuioribus solito, nihil amplius commemorat, cum superius iam de iis egerit. p. 233.

Appendix de febribus nervosis et malignis, maioris operis olim forsan prodituri prodromus, eum potissimum finem habet, ut Auctor noster conuenientiam inter hos morbos enarret, solum discrimen in maiori vel minori gradu (vltimum quippe febris nervosae stadium cum febre putrida plane conuenit) positum esse doceat, et, quicquid alii viri celeberrimi, inprimis Cll. HUXHAM et PRINGLE, de causis illarum tradiderint, primariam tamen vtriusque causam in vitiis primarum viarum quaerendam esse monstret. Ex his necessitatem euacuantium, damnum ex iis neglectis, et p. 237.

peruersis reliquis medendi modis, et necessitatem corticis Peruuiani, sed largius, ad minimum intra duos dies tres vnicae (saepe tamen in spatio duobus diebus paullo maiori vnciis sex vel septem opus fuit), exhibendi, euincit. Frigidum aerem, iam a delso quam maxime commendatum; hic summe proficuum putat, licet eius vsus nondum experientia satis confirmatus sit, quod vt fiat, quam maxime in votis habet.

XV.

M. I. MARX Med. D. obseruationum medicarum Pars Prima, sistens vsum et abusum vesicatoriorum in delirio febrili, historiam dein ac curam febris tertianae epidemicae prioris anni. Accedunt obseruationes medicae de scrophulis, obscuritate visus, de ventriculi imbecillitate cum aliis quibusdam ex flatibus subortis symptomatibus de catarrho suffocatio ex affecto asperae arteriae capite deque vsu olibani in fluxu vterino. Hanouerae MDCCCLXXIV. apud Ioh. Wilh. Schmid 8. pagg. 126. cum praefatione et dedicatione.

Pergit hic Cl. Auctor obseruata medico practica *) tradere, quorum summam hic cum nostris Lectoribus communicamus.

P. 15. 1) *De vsu et abusu vesicatoriorum in delirio febrili.* Variis Auctorum sententiis de vesicatoriis narratis monstrat, ea non vbique esse adhibenda. At quam saepe, inquit, videmus in consueta praxi aegro sanguinem largiter emitti et dein

*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 622.

dein vesicatoria applicari atque mox magnum praescribi numerum alexipharmacorum calidorum, cardiaca, caeteraque. Quod profecto aequum ratione conueniet, ac si quis partem incendii magni prius suppressere velit et mox postea residuam partem adiecto puluere pyrio aut spiritu vini extinguere anniteretur.

Sunt vesicatoria, ex Nostri sententia, neruina p. 27. excitantia, quae conducunt irritabilitati imminutae, debilitati neruosae, circuli que humorum languori, item plus seruiunt obesis et succi plenis corporibus, quam ficcis et macilentis. Et quando delirium inde deriuandum sit, tum ea locum quoque habent, ad stagnantes humores resoluendos, ad rapidiorem circulum inuitandos, quin imo ad humores, potissimum serosos, deriuandos.

Quod si vero causa febrilis sit impedita perspiratio ac obstructio excretionis cutaneae, frigore orta, ad quam promouendam expellendamque causam febrium praeparata regulina admodum utilia Noster deprehendit. Dantur haec ea in dosi, ut tantummodo conamen quoddam vomendicent, nec vomitum ipsum moueant. Atque hic seruiunt omnia emetica parua in dosi adhibita, quae tunc ut diaphoretica agere, quia corpus calefaciant, nostro tempore non amplius ignotum est. Id quod Noster in sequente capite fusius demonstrabit. Exempli loco nominatur hic tartarus emeticus, mittimus alia antimonialia remedia. p. 48.

Plures substantiae metallicaee et imprimis mercurius et antimonium multas possident virtutes medicas, sique salibus artis chemicae ope dissolutae atque unitae sint, facile se cum humoribus animalibus miscere altiusque vasculare systema penetrare, atque ut experimur, non modo tanquam eua-

euacuantia irritando, sed et vi resoluendi et deobstruendi agere videntur.

p. 49. Sit coniecturae locus. Eiusmodi forsan erat medicina, de qua HELMONTIVS gloriatur, dicens: „vnica nimirum falce amputatur omnium febrium causa occasionalis. Id remedium est sudoriferum, quod incidit, extenuat, resoluit, liquat, abradit ac simul abstergit causam occasionalem, vbicunque locorum ea demum extiterit. Estque vniuersalis febrium medicina diaphoretica quidem insensibilitas et citra sudorem praedictos effectus parans.,,

p. 50. 2) *De febre tertiana priore anno grassante.* Febris haec continuae similis erat, contagiosa omnium aetatum inuadebat homines. Paroxysmorum typus plane erat nullus. Porro Noster obseruauit saepius, quando reciderit febris in quotidianam, rarissime in quartanam mutatam fuisse. Causam quaerit Noster in occulta aeris diathesi, quam in bilem praecipue agere demonstrat. Vomitus inde quoque biliosos in hac febre apparentes Cl. MARX deriuauit.

p. 75. Tartarus emeticus in parca dosi adhibitus multum praestitit in hac febre. Nec ille solum, sed omnia emetica, vt vinum antimoniale HVXHAMICET. hic dari possunt. RIVERII mixturae *) addidit spiritum nitri dulcem aut nitrum. In infantibus hac febre laborantibus, epithemate ex thure, croco, sale communi et fuligine parato carpis imposito, simul datis tartari emetici dosibus minutissimis, octies cum successu curauit Noster febres. De externis remediis, in febribus intermittentibus, quae Noster hic quoque suadet, ac potissimum in infan-

*) v. supra p. 76.

fantili aetate, quae medicamenta saepe plane respuit, Cl. NEIFELD *) multa habet.

3) *De scrophulis.* Natura caussisque affectio- p. 105.
nis scrophulosa bene pensata, ad curationem Noster progreditur, quae in eo consistit, ut universalis corporis cachexia corrigatur, lentor humorum attenuetur, solidaque corroborentur. Atque hic seuerè urget dietam. Inter medicamenta vero princeps remedium attenuans atque minutissima vascula detergens iudicat Noster radicem rubiae tinctorum, de qua iam alibi disseruit **). Huic solet Noster sequens remedium adiungere: recipe vitri antimonii in puluerem quam subtilissimum reducti grana quatuor, millepedum drachma vna, gummi sagapeni drachmam dimidiam, olei iuniperi guttas decem, misce fiant cum syrupo quodam pilulae numero triginta, duae vel quatuor mane vel mane et vespera sumendae. Postea corticem Peruvianum, qui praeterea scrophulorum diathesin tollit, exhibet. Externe fons mercurialis resoluens nocte caute usurpandus nonnunquam succedit, mercurii corrosiui sublimati scrupulum dimidium, soluti in aquae simplicis vnciis tribus, addita tincturae cantharidum vncia dimidia, continens. Interdum panni non modo, verum et sacculi floribus aurantium aut similibus impleti externe applicabantur. Obiter hic notat Cl. Auctor corticem cum radice rubiae tinctorum, praemissis rhabarbarinis et saponaceis egregie conducere rachitidi infantum.

4) *De obscuritate visus.* Quae cortice Peru- p. 113.
viano aliisque roborantibus remediis est curata et cum

*) V. ERNEST. IEREM. NEIFELDI ratio medendi morbis circuli sanguinei v. comm. nostr. Vol. XX. p. 291.

**) V. comm. nostr. Vol. XXI. p. 623.

cum altero anno rediret, eadem methodo medendi et exercitio corporis iterum ea est sublata. Aliud enarrat exemplum, quod solis antirheumaticis remediis adhibitis et emplastro stimulante, temporibus applicato, visum recuperavit.

p. 116. Omnino ipsam ophthalmiam rarius veram esse inflammationem, ut a pluribus creditur, qui anti-phlogisticum postulant regimen, sed saepius rheumaticam esse, atque antirheumaticis remediis sublatum fuisse pluribus exemplis Nostro apparuit. Atque hic laudat potissimum corticem Peruvianum cum tinctura guaiaci volatili.

p. 117. 5) *De ventriculi imbecillitate cum aliis quibusdam ex flatibus subortis symptomatibus.* Infusum rhei aquoso vinosum, carminativa et cingulum gossypio factum, abdomini applicatum, cum crebra frictione abdominis, ventione in rheda, equitatione et diaeta hic egregium usum praestant.

p. 119. 6) *De catharro suffocativo ex affectu asperae arteriae capite.* Atque hic usus Noster est attenuantibus, incidentibusque remediis, inprimis linimento volatili ex oleo olivarum et spiritu salis ammoniaci collo externe applicato, ita feliciter, ut viginti quatuor horis praeterlapsis, catharrus, a pituita oriundus, cessaret.

p. 121. 7) *De usu olibani in fluxu uterino.* Olibani vires sunt temperatae, atque ad profluvia muliebria ab acrioribus humani corporis succis et lymphis praecipue acris et salsa nimis orta, corrigenda aptae. Fluorem album interno olibani usu in multis feminis Noster curavit. Drachmam nempe dimidiam olibani seu thuris, saccharo triti aquaque cinnamomi tenui in formam potionis redacti, addita tin-

tinctura corticis Peruviani exhibuit cum decocto
saffaparillae et chinae ponderosae. Regio vteri
spongiis madentibus calido decocto florum papaue-
rum et chamomillarum fovebatur. Diaetae ratio-
ne habita et lactis cura, aegra redacta est ad suam
laudabilem temperiem.

XVI.

*Die heilsamen und höchst wunderbaren Wirkungen
des Wasserfenchels oder der sogenannten Peer-
Saat bey verschiedenen Krankheiten des menschi-
chen Körpers von D. IOHANN HEINRICH LAN-
GE Stadtphysicus zu Liineburg, wie auch der
Römisch Kaiserlichen Academie der Naturfor-
scher und der herzoglichen Deutschen Gesell-
schaft der schönen Wissenschaften zu Helmstädt
Mitglied. Neue verbesserte Auflage Frankfurt
und Leipzig. Im Verlag der Hechtelischen
Buchhandlung. 1775. 8. m. K. Seitt. 48. ohne
Vorrede.*

i. e.

De salubribus et admirandis effectibus foeni-
culi aquatici in variis morbis corporis hu-
mani. Auctore IOANNE HENRICO LANGE. M.
D. cet.

Botanica huius plantae descriptione et compara-
tione cum alia planta addita, historiam huius
plantae Cl. LANGE tradit eiusque fata enarrat, par-
tes constitutivas persequitur et eius effectus ex-
perimentis atque tentaminibus declarat. Icon hu-
ius

p. 13.

ius plantae, huic libro adiecta, desumpta est ex alio libro *, quoniam Nostro optima videtur.

p. 16. Inter remedia domestica, quae a Brunsvigensibus rusticis adhibentur, est foeniculum aquaticum sine dubio princeps. Utuntur enim eo in vulneribus, sugillationibus, contusionibus, fracturis, haemoptysi et phthysi, malo hysterico, febribus intermittentibus, flatulentia et aliis pluribus morbis. Inprimis semen huius foeniculi aquatici seu phellandrii aquatici laudatur, cuius confusi cochleare cum pane, butyro non salito illito mane, ieiunoque ventriculo sumunt. Externe inter usum huius feminis pura feruentur vulnera aqua, et folia sana dein deligentur. In malignis scorbuticis et carcinomaticis idem Noster observavit.

p. 18. Porro laudat Cl. LANGE hoc remedium in imminente phthysi ex haemoptysi, et asthma.

p. 21. Iam reliquos illius feminis effectus, quos Noster partim non Ipse observavit, partim inter duobus refert, hic memorantur. Atque hic potissimum febres intermittentes, ubi illud semen cum osse sepiae coniungitur, malumque hystericum nominantur, item umbilicales et crurales herniae ipso eo femine tolluntur. Id quod iam affirmavit LAURENTIUS HEISTERVS **) qui idem hoc semen contra hernias laudavit et disquisitioni et usui chirurgorum suavit.

Foe-

*) Phellandrologia physico medica seu exercitatio physico medica de medicamento nouo: vulgo *Peer Saaz* dicto et multis in morbis tam hominum, quam animalium celebrato. Iam vero experimentis physico chymicis et observationibus medicis illustrato ab ARTHURO CONRADO ERNSTINGIO M. D. et Practico Brunsvicensi. 1739. 8. c. f.

**) v. diss. de hernia incarcerata suppurata saepe non letali Helmstad. 1738. 4.

Foeniculi igitur aquatici discutiens et balsamica p. 25.
vis cum ex his obseruationibus eluceat, locum illud
meretur in materia medica. Quod tanto magis
fieri potest, quanto citius vim balsamicam et vul-
nerariam per internum eius vsum illud semen pro-
dit. Omnino Noster optat, vt medici remedia
domestica attendant et eorum vsum determinent
secundum artis medicae praecepta et fidam ex-
perientiam, quoniam horum vsus vulgo non de-
stituitur vanitate, praeiudiciis, traditionibus cet.
quibus autem remotis, ea domestica remedia hu-
manae societati valde vtilia atque proficua redderen-
tur. Est enim communis error vulgi, eiusmodi
remedia vt vniuersalia celebrandi et omnibus mor-
bis opponendi. Vti ipsum hoc foeniculum exem-
pli adinstar seruire potest. Praeter hos enim mor-
bos, hica Nostro dictos, dicitur illud ex mente vulgi
prodesse oedemati pedum omni, hydropis speciebus
omnibus, ictero, cachexiae, menstruorum suppressioni,
fracturisque, vbi cum fructu et frustra eo vfi sunt.

Per destillationem Noster ex foeniculo aquatico, p. 27.
sal volatile, spiritum volatilem vrinofum nec exiguam
olei copiam, quod conueniebat cum oleo cornu
cervi, et acri, amaro et balsamico sapore erat prae-
ditum euocauit. Maturationem vero sufficientem
huius seminis hic vrget Cl. LANGE, quae medio Au-
gusti potissimum accidit, et semen tum praeterea fus-
co rubro cum flauo viridi colore eaque magnitudine
est, quam habet commune semen foeniculi. Est con-
tusio huius seminis aliquantisper molesta ob oleo-
sam eius indolem.

His praemissis effectus huius remedii tentami- p. 28.
nibus illustrat Cl. LANGE atque confirmat. Pluri-
ma attinent vulnera. Loco salinae interdum No-

ster elegit lac tepidum, quod et nobis semper praeferri debere videtur, quoniam sana salua, quam vult hic Noster, rara est. In vno exemplo inter vsum huius foeniculi apparebant menstrua nec vllum cicatricis remanebat vestigium. Id quod ad proprietates huius seminis Noster refert.

P. 38. In cancriosis vlceribus mammarum eo semine interne et externe cataplasmate radice consolidae maioris coctae cum butyro non salito et cereuisia alba ad pultis consistentiam feliciter vsus est. Porro et in fistulosis vlceribus, asthmate, dolore pectoris et sputo purulento, vbi corticem Peruuianum cum foeniculo aquatico exhibuit. In pulmonum laesione per externam vim, vbi magna cruoris copia exspuebatur. electuario ex cortice Peruuiano, foeniculo aquatico et syrupo de symphyto FERNELII et infuso arnicae verae cum optimo succesu vsus est.

P. 47. Quaedam monita inter vsum huius seminis. Vinum, aqua vitae et aromata noxia sunt, quoniam ipsum hoc semen exaestuatur sanguinem. Venter vero illud confortat. Sub initio curae purgans cum mercurio dulci est exhibendum et postea in plethoricis hominibus venaesectio est admittenda. Nimius motus et sudorem excitans est vitandus, quoniam volatiles balsamicae partes foeniculi nimis copiose atque celeriter e corpore eliminantur, quae, diutius si remaneant, nutritioni auxilium praestant. In haemophthysi et phtysi imminente, item externis laesionibus, cum febre vulneraria coniunctis, suadet Cl. LANGE corticem Peruuianum cum foeniculo coniungere, et omnia potulenta fortiora et exaestuantia aegris interdicare, ne potu quidem coffeae excepto, locoque eorum permittere tenue decoctum fagopyri cet. cum pauxillo succi citr.

citri et saccharo. Iuscula nimis nutrientia inprimis vero carniū, noxia sunt. Nec minus hic seruit caro suilla alio atque alio modo praeparata, pariter duri et flatulenti cibi.

XVII.

Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzney-gelahrheit von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. Herausgegeben von D. PAVL DIETERICH GISEKE, der Physik Professor. Hamburg. gedruckt von Carl Wilhelm Meyn 1776. 8. Seitt. 357.

i. e.

Tractatus et obseruationes ex medicina a Societate medicorum Hamburgensium. Editore PAVLO DIETERICO GISEKE. M. D. et Professore Physices.

Coeperunt scilicet maxime vtiliter nonnulli medici consilium anno 1772 conueniendi inter se, obseruationes medico practicas communicandi et amico examini communiter subiiciendi. Vt autem hi conventus tantam, quantam optabat Societas, nanciscerentur vtilitatem, et ordine potissimum placerent, constitutum est, omnes res tam, quae proponebantur, quam, quae diiudicabantur, scriptas tradere. Et huic potissimum legi tribuitur summa consensus amicorum in maximo saepissime dissensu, quae per tres annos iam durauit. Ab epistolis huius Societatis est Cl. GISEKE, qui, volente ita Societate, obseruationes quasdam hic communicat, ita tamen, vt cuiuslibet sententias tradat, praeterea vero nihil curet, et Auctori ipsi prorsus relinquat. Recensiones librorum, inter se communicatas non integras Cl.

GISEKE, vulgavit, sed id ex iis potissimum delibavit, quod, vel vltiori rei propositae explicationi inferuire, vel ad aliter sentiendum allicere posset. Nouitatis studium non quaerit Societas, Lectorique perinde esse arbitratur nosse Auctorum nomen, quod hic reticuerunt.

Nos hic tractatum inscriptiones indicabimus et de quibusdam speciminis loco videbimus.

- p. 1. (1 *De dignitate medicinae* *).
- p. 18. 2) *Disquisitio quaestionis : Restituuntur ne fere omnes aegri vi naturae et sunt itaque medici non necessarii **)?*
- p. 32. 3) *Annotationes quaedam super quaestionem : cur medici non semper tantum praestent, quantum per artem suam adeo amplificatam possint ***)?*
- p. 52. 4) *De eminentia veterani medici prae iuniore et quantum experientia conferat ad practicam cognitionem perfectiorem reddendam †).*
- p. 67. 5) *Quaedam de incertitudine in medicina ††).* Exemplum hic narratur de cephalalgia, cuius causa non potuit detegi nec viuo, nec mortuo, aegro. Arbitramur autem cum eo, qui recenset hanc tractationem, causam huius doloris capitis per multos annos durantis

*) Lect. d. 4. Febr. 1772.

**) Lect. d. 10. Nouembr. 1772.

***) Lect. d. 22. Iunius 1773.

†) Lect. d. 17. Octobr. 1773.

††) Lect. d. 1. Septemb. 1772.

rantis, nec alio morbo tandem letali cedentis, fortasse posse repeti a bile praeternaturaliter mixta et inde nata alui obstructione. Nam aluo laxantibus aperta, cedebat capitis dolor, item remittebat ille per tres dies, postquam crassam et viridem bilem aeger euomuerat. Quae cum ita sint, non temere, qui recensuit hunc tractatum, desiderat bilis disquisitionem in cadauere. Etiam si enim aliae atque aliae praeternaturales mutationes in cerebro sunt repertae, tamen hae non ab initio videntur adfuisse, sed verosimiliter ultimo morbo obortae sunt, nec capitis dolorem causerunt.

6) *Proposita ad labores definitos* *). p. 78.

7) *De diuersis methodis artem medicam amplificandi et discendi cum diiudicatione tractatus: de laboribus definitis.* p. 89.

8) *De praestantia lactis humani prae animali et de officio matrum lactandi* **). p. 110. Hac occasione disputatur de passionibus et moribus, quatenus a lacte deriuari possunt, id quod VANDERMONDE alique sunt autumati, et hic reiicitur.

9) *Hypotheses de propria et interna ratione variolosi contagii et obiectiones contra illud. Quid experientia de illo docet* ***). p. 135. Primum quidem hypotheses variorum Auctorum, de contagio varioloso ab Arabibus medicis usque ad nostra tempora enarrantur et reiiciuntur. Infectionem Noster largitur cum Cl. TISSOTO, febris autem diuersitas non pendet a contagio varioloso, sed per corpus, I 3 quod

*) Lect. d. 1. Mart. 1774.

**) Lect. d. 14. April. 1773.

***) Lect. d. 4. Februar. 1772.

quod infectum est, et ab aliis externis conditionibus determinatur.

P. 143. Ille, qui hanc rem diiudicauit, vnam hypotheseum earum, quarum mentio hic est facta, et quae cernitur in pathologia verminosa, inter alios et ab Ill. LINNAEO *) proposita, defendit. Confugit Noster nempe ad animalia infusoria, quae in omni liquore, ex affusa ad animales vel vegetabiles partes aqua, nata sese offerunt diuersimodeque mouentur. Id quod et Cl. WRISBERG accurate experimentis illustrauit **). Noster porro omnem omnino fermentationem ab his animalibus infusoriis repetit et hanc suam hypothesein de variolis viuis confirmat mercurialium medicamentorum efficacia in variolis, cum ea animalcula interficiantur a mercurio. Inoculatio contagium extensius augeat, et intensius imminuit. Vti in fermento panis, quanto maior est farinae quantitas, tanto minor fit panis acor.

P. 150. 10) *Refutatio Sydenhamianae et Boerhaavianae explicationis de morbo varioloso ***).*

P. 156. 11) *De metastasi lactis †).* Noster illam ad vterum et extremitates inferiores et superiores vidit, asseritque sequentia:

1) Hic morbus ex nulla nota causa sine praediuicio potest repeti. Viginti grauidae vno eodemque vtuntur vitae genere et duae fortasse incidunt in hunc morbum.

2) Nec

*) Diss. sistens exanthemata viua Resp. Io. C. Nyander, quae inserta est amoenitatum academicarum LINNAEI Vol. V. no. 82. p. 92. v. {comm. nostr. Imago decad. suppl. I. p. 108.

**) v. comm. nostr. Idae decad. suppl. I. p. 167.

***) Lect. d. 3. Mart. 1772.

†) Lect. d. 28. April. 1772.

2) Nec facilis nec difficilis partus confert quid ad hunc morbum.

3) Regimen puerperae hunc morbum neque excitat, neque arcet.

4) Aegrae hoc morbo laborantes, quae Nostri curae erant commissae, ipsae lactarunt et lactis non superflua gausae sunt copia, lochiis insuper rite fluentibus.

5) Vidit Noster hanc lactis aberrationem cum et sine febre. Optima methodus medendi huic aberrationi lactis cernitur in hoc morbo impediendo et arcendo. Cl. LEVRETI remedium e sale tartari nonnulli quoque ferre pariter nequeunt, atque vnguenta. Epithemata sicca quoque non iuuant.

12 et 13) *Quaedam de criticis diebus* HIPPO- p. 160.
CRATIS *). Diverfimode hic disputatur de die- p. 189.
bus criticis.

14) *Nonnulla monita de abusu venae sectionis* **) p. 206.
In morbis e. gr. chronicis, ab acri et biliosa collu-
vie in systemate gastrico, intestinali, mesenterico,
hepatico, extra vias circulationis posita cum putri-
da indole, vti et HUXHAMVS monet.

15 et 16) *De crocis martis eorumque effectu no-* p. 226.
xio interno ***). Reiiicitur eorum internus vsus et et
externus modo permittitur, ferrique scobi plus p. 237.
virium adscribitur, quam omnibus eius praeparatis
chemicis. Id quod in sequenti decimo sexto tra-
ctatu vltius probatur.

I 4

17)

*) Lect. d. 5. Ianuar. 1773. Lect. d. 16. Februar. 1773.

**) Lect. d. 31. Mart. 1772.

***) Lect. d. 30. Septembr. 1772. Lect. d. 31. Mart.
1772.

p. 248. 17) *Quaedam de borace* *). Cum borax remedium sit resoluens, cum sal sedatium in eo contentum dolores leniat, deliria coerceat et lochia promoueat, porro cum cremor tartari, addito borace, solubilius reddatur: Noster hanc in rem ulterius inquirebat, ac potissimum coniunctionem boracis cum cremore tartari attendebat tam in inflammatoriis morbis, quam in chronicis viscerum obstructionibus.

p. 251. Bis eapropter exhibuit Noster duas partes cremoris tartari et vnam partem boracis in peripneumonia et dolor subito remittebat et expectoratio quoque accelerabatur. Praeterea aliquoties alius quotidie mouebatur ab vna vncia huius pulueris. Porro eodem cum fructu in febre biliosa viscerumque abdominalium obstructione hoc puluere Noster usus est. Similia tentamina cum hoc puluere a Cl. BERGIO enarrantur in nouis actis naturae curiosorum **). Obiectiones contra hoc remedium cernuntur in diuersitate agendi. Cremor tartari enim est refrigerans et borax exaestuans remedium.

p. 255. 18) *Meditationes de remediis specificis* ***). Nar-
rat hic Noster quaedam, vt corticem Peruvianum in febribus intermittentibus, mixturam Swietenianam in lue venerea, frigida balnea in neruorum debilitate cet. et optat, vt plura eiusmodi in posterum inueniantur.

p. 273. 19) *De effectibus inopinatis remediorum emeticorum* †). Euomebatur nempe magna copia cru-
oris,

*) Lect. d. 8. Dec. 1772.

**) Tom. IV. 1770. 4. obs. XXV. p. 95.

***) Lect. d. 10. Nouembr. 1772.

†) Lect. d. 10. Nouembr. 1772.

oris, quae inveteratum dolorem in liene mitigabat et vetula feruabatur. In fene vero emeticum foeces sanguinolentas letales produxit. Obstructiones vlceraque in abdomine contra emetica indicant.

20) *De externo usu castorei in convulsivis motibus* *). p. 277.

21) *Duae observationes de usu camphorae in magna dosi.* Exhibitae sunt drachmae tres camphorae cum gummi Arabici mucilagine, quae optime camphoram soluit **), in variolis per duos dies cum optimo effectu, et pariter utilis fuit et illa externe. Interim tamen, etiamsi magnae doses camphorae laudantur ***), quaedam dubitationes hic adii-
ciuntur, quae contra nimium camphorae usum quodammodo pugnant. Camphora enim cum vino et opio eam habet proprietatem, vt primum nervos roboret, dein maiorem debilitatem inducat. Porro b LUDWIG experientia confirmatur, duo grana camphorae eundem effectum habere, quam decem; et drachmam vnam vidit Noster quotidie per sex dies sine effectu vlllo exhiberi. Item vrgetur hic coniunctio camphorae cum nitro depurato et aceto, quoniam sola inflammationem, saltem aestum ventriculi et anxietates procreat. cet.

22) *De morbo ileo* †). Causa huius morbi erat p. 299. vel intussusceptio, vel spasmus. Illam non poterat laudanum SYDENHAMI iuuare, et hic videtur Nostro non esse causa sola motus peristaltici inuersi. Quoniam autem laudanum vomitus leniuit, et ae-

*) Lect. d. 2. Septembri. 1772.

**) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 140. 513.

***) v. ib.

†) Lect. d. 10. Novembr. 1772.

ger sanatus est, ille, qui recenset hunc casum, omnia symptomata hic a spasmo repeti posse arbitratur.

P. 307. 23) *De ulceribus, quae haemorrhagia aluina superueniente sanata sunt* *). Mulier quadraginta et duorum annorum, menstruis rite fluentibus, saepe lipothymia et epilepsia affecta sentiebat in toto corpore pruritus, imprimis in extremitatibus inferioribus, ubi et ulcera apparebant. Tum acerbis doloribus in regione ossis sacri aegra cruciabatur, quibus post duos dies haemorrhagia aluina succedebat, qua tres librae sanguinis tenuis et cruoris emanabant. Durante hac haemorrhagia per quatuor dies, cedebat haec et debitum lunare sequebatur. Ulcera autem interea sicca fiebant et consolidabantur, nec lipothymia atque epilepsia reuersa sunt. Duplicem Noster hanc crisin iudicat. Ulcera enim epilepsiam et haemorrhagia ulcera iuvabant. Fontem praeterea huius haemorrhagiae altius **) quaerit Auctor, quam in vasis haemorrhoidalibus.

P. 310. 24) *Observatio de retropulsae scabiei effectibus* ***). Hi cernuntur in effluxu acris serosae materiei ex papilla dextrae mammae, qui durabat per quatuor annos, vix autem externis remediis cedebat, in peripneumoniam incidebat. Qua curata, post annum sanguinolentam materiam expuebat, quam purulenta sequebatur copiosa. Quae cum ita essent et praeterea Noster luis venereae haberet suspicionem, dabat mercurium sublimatum cum camphora interne et externe setaceum in cer-

*) Lect. d. 7. Iul. 1772.

**) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 690.

***) Lect. d. 4. Aug. 1772.

ceruicem applicuit. Quatuordecim diebus non plane praeterlapsis, febris et sputum purulentum cum leuamine aegri imminuebantur et sex hebdomadibus post scabies totum corpus occupabat cum maiori indies symptomatum imminutione. Hic utebatur aeger vnguento mercuriali Werlhofiano, cui Noster sub finem sulphuris portionem addebat, et continuabat per quatuor menses vsu sublimati ita, vt viginti et octo grana sublimati interea sumfisset. Alimenta erant lac et panis albus. Simulac autem tussis et sputum prorsus cessarant, setacei loco fonticulum in ea mamma, quam primum scabiosa materia petierat, curabat Auctor noster et corticis Peruvianus vsum per mensem suadebat. Et ita aegrum sine tussi, asthma et scabie subinde reconualescere vidit.

25) *De tetano ab externa laesione.* Ille non p. 313. prius curabatur, quam amputato digito laeso. Quo disquisito, prima phalanx laesa et acuminata erat, ita, vt per perpetuam irritationem nec opium, nec alia medicamenta illum tetanum sedare potuerint.

26) *De hemiplegia faciei* *) Externe feliciter hic p. 319. est aqua Hungarica cum sapone Veneto et nonnullis guttis olei caiaput adhibita.

27) *De quodam linguae cancroso ulcere feliciter* p. 322. curato **) Videtur potissimum hoc vlcus dysenteria accedente curatum fuisse. Cicuta vero et aqua Goulardiana cum liquamine myrrhae antea adhibita, inprimis cum iam ante dysenteriam ichor cancro-

sus

*) Lect. d. 7. Iul. 1772.

**) Lect. d. 5. Mai. 1772.

fus in pus bonum sese mutauisset, indubitato plus praestiterunt, quam dysenteria.

P. 329. 28) *De inuerso et descendente utero* *). Per viginti annos hic descensus vteri adfuit et sine grauiditate ille apparuit. Primo magnae cum eo coniunctae erant haemorrhagiae, dein fluor albus malignus accedebat. Quoniam autem sine grauiditate nulla inuersio vteri fieri possit, arbitratur Noster, hanc mulierem fuisse grauidam et forte inter partum ab obstetrice male esse tractatam.

P. 333. 29) *De iniectionibus in gonorrhoea ad eius curationem accelerandam* **). Quamdiu inflammatio aderat, tam diu lac aqua dilutum tepide iniiciebatur; qua sedata, sequente solutione utebatur: Mercurii sublimati corrosiui granum vnum solue et tere in aqua calcis viuae vnciis duabus, dein adde mellis rosarum eandem quantitatem. Et hac iniectione optime materiam effluentem correxit, etiamsi et interne sunt remedia adhibita.

P. 336. 30 et 31) *Fragmentum de utilitate casuum medicorum et continuatio eius* ***). Sed sufficiant haec, quae breuiter hic excerpimus et expectamus fasciculum similem latine scriptorum tractatum, qui a Societate est pollicitus in praefatione.

*) Lect. d. 3. Mart. 1772.

**) Lect. d. 6. Decembr. 1774.

***) Lect. d. 8. Decembr. 1772. Lect. d. 5. Ian. 1773.

XVIII.

Rerum naturalium historia, nempe quadrupedum, insectorum, piscium variorumque marinorum corporum fossilium, plantarum exoticarum, ac praesertim testaceorum existentium in museo Kircheriano; edita iam a P. PHILIPPO BONANNIO, nunc vero noua methodo distributa, notis illustrata, in tabulis reformata, nouisque obseruationibus locupletata, a IOH. ANTONIO BATARRA, Ariminenfi, Philosophiae Prof. Pars. I. Romae MDCCCLXXIII. - In typog. Zempeliana vetere Venantii Monaldini Bibliopolae. Fol. 1 Alph. 14plagg.

Iam a. MDCCIX. editum est a PHIL. BONANNIO museum Kircherianum forma folii totius: cum vero diuendita esset prima editio, noua haec editio Cl. BATARRAE curis commissa est, qui totum museum in duas partes diuisit, quarum prior, ea, quae in titulo indicantur, corpora naturalia continet, altera vero testacea complectitur. In praefatione huic parti praemissa Cl. BATARRA historiae naturalis vtilitatem demonstrat atque contra methodorum copiam, diuersitatemque nomenclaturae dicit, eamque reiicit, praeterea autem, quod vehementer miramur, matheseos omnem vsum negat. Quum BONANNII liber iam cognitus sit, nos de Cl. Editoris opera inprimis hic agamus.

Ordine magis systematico corpora naturalia recensere promittit, atque in notis subiectis, nomina animalium descriptorum ex aliis linguis, et ab aliis Auctoribus, tum veteribus, tum nonnunquam recentioribus, LINNAEO etiam data, commemorat;
ob-

obſervationeſque et eorum, et ſui ipſius de natura corporis deſcripti inſtitutas exponit, omninoque multa ad melius intelligendum BONANNII textum praeſtitit, erroreſque eiſ ſaepe correxit.

- p. 10. Primo de *Quadrupedibus*. Ad cornua *Caprae Rupicaprae* adnotat: Rupicapram habere os frontale valde depreſſum ſupra nares, fere vt *Delphinus*, et integumenta plicam quandam conſtituunt. Perperam autem quidam ſtatuērunt eſſe rimam interne in palato apertam: Cl. BATARRA enim contrarium in capite rupicaprae vidit, quod in Muſeo Cl. PLANCI conſervatur. Recte reprehenditur icon de cornu *Rhinocerotis* data: qua occaſione Cl. Editor bonam ſatis deſcriptionem huius bruti dat, atque notat, modum, quo ad cubandum corpus diſponebat: coepit namque totum corpus a cauda ad caput ancipiti vndulatione tarde vrgere, dein inflexis lente anterioribus cruribus, et hinc poſterioribus poſtquam ventre terram attigit, totum corpus depoſuit, et capite verſus alterum latus declinato prorum iacuit.
- p. 22. *Hippopotami amphibii* LINN. noua datur icon, etſi non optima.

- p. 34. Quadrupeda ſequuntur *Reptilia* et *Inſecta*, pauca quidem et imperſecte deſcripta. De *Vipera* ſ. *Colubro Bero* LINN. agens commemorat FELICEM FONTANAM, qui de veneno Viperae egregie ſcripſerit. Putat FONTANA Viperae venenum nec acidum, neque alcali eſſe, neque in ſanguinem agere, ſed immediate in muſculos, iis que irritabilitatem auferre, et gangraenam in iis producere. Addit Cl. Editor capitis viperae iconem, ita, vt dentes veneniferi conſpici poſſint dentesque evulſos ſingulatim depingi curauit; ſed omnino male facta eſt

est icon, praesertim, quae coloribus fucata est. Cro-
tali, quoad partes genitales anatome, ex *Actis Lips.* p. 36.
a. 1684 desumpta est, et crepitaculum describitur:
quod facta ad perpendiculum sectione, ex variis
pileis Phrygiis coalescere videtur, alio in aliud in-
ferto. Quilibet pileus ex tribus constat annulis et
apice osseo.

Affirmat Cl Editor, quod alii multi negant, p. 39.
morsum *Lacertae vulgaris* esse noxium, et conuul-
siones diras inducere. Obseruauit Noster in Agro
Ariminenfi *Lacertae* speciem, quae *Stellioni* mul-
tum similis est, eo, quod totum dorsum superius
viride habet, in cuius medio a capite ad caudam
linea protenditur, quae ex nigris trapeziis coale-
scit; cutis reliqua toto cinerea et maculis nigris
adspersa est: aliamque, cute cinerea nata, non
viridi, maculis nigris adspersam.

Ex Insectis quaedam, vt *Scorpio*, *Lucanus ceruus*,
Pediculus, *Pulex*, *Cimex*, *Culex*, describuntur;
ac posteriora, vti etiam squamae alarum de
variis Papilionis speciebus sumtarum, micro-
scopio aucta depinguntur; ita tamen, vt icones ex
aliis sumtae sint, et coloribus multum deformatae.
Simili modo variae partes plantarum, spinae, acu-
lei, textura foliorum, pappus florum, et similia, mi-
croscopio disquisita et depicta traduntur. Sic
etiam sanguinis atque vermiculi aceti et piperis
examen, vti quoque de piscium squamis quaedam
traduntur. Squamae hic disquisitae sunt, *Triglae*
Lucernae, *Pleuronectis soleae*, et *Mulli* cuiusdam.
Classe tertia fossilia comprehenduntur, et quidem
1. metalla et semimetalla 2. Succi oleosi tam li-
quidi, quam concreti. 3. Marmora, lapidesque fi-
licei, Gemmae, et figurati. 4. Petrefacta. 5. Salia et
6. Terrae. Sed omnino fatendum est et BONAN-

NII textum, et BATARRAE notas parum de vera fossilium natura proponere, multa superflua atque imperfectas descriptiones afferre. Caeterum saepe Cl. BATARRA alios scriptores nominat, etsi et hic optimos saepe omisit, atque vana remedia recte reliquit.

- p. 98. In Etruria TARGIONIVS cupri fodinas detexit; Eugubini quoque Aeris fodinas habent, quas neglectas, nuper STVPPANIVS proferre in apricum tentavit. Ad Ferrum Cl. BATARRA, quod mirandum est, perperam refert *Stalactitem calcareum*, ramosum, vulgo *Flos ferri* dictum.
- p. 123. In agro circa Bibiennam fodina Amianthi inventa est, qui valde albus et filamentosus erat. Taurini ars amianthum nendi restituitur.
- p. 138. Opercula cochlearum esse putat partem eiusdem organicam, quae simul cum testa conspicitur.
- p. 153. In Classe quarta *Pisces et reliquae maris incolae* continentur, ut sunt *Squali* quaedam species, ex cetaceis animal, *Capitolium* dictum, quod, etsi ab ARTEDIO ad *Delphinum* interrogatiue refertur, nobis tamen, cum dentes in maxilla inferiore tantum habeat, *Physeteris* species, et haud dubie *macrocephalus* esse videtur. Cl. BATARRAE huius subiicit dimensionem, nouamque priori substituit
- p. 162. iconem. — *Raiæ* species tres in mari Hadriatico Editor affirmat, *Raiam fullonicam*, *laeuem*, et *oxyrynchiam*, quarum quasdam partes describit. Miramur BATARRAM, cum ordinem musei mutauerit, Astacos, Cancros, Asterias, aliaque insecta et vermes sub vna classe cum piscibus referre, a quibus tamen insigniter differunt. Huc etiam relata sunt Litho-
- p. 169. phyta. Defendit Cl. BATARRA sententiam de animalitate horum corporum, sat bene: etsi multa plura et grauiora huius rei afferri potuissent argumenta.

Bonae

Bonae sunt Cl. Editoris ad lithophyta obseruationes, species curatius definientes.

Praeterimus Classsem quintam, in qua apparatus rerum peregrinarum, ex variis orbis plagis collectus, fructus scilicet, plantae, aues et alia quaedam animalia comprehenduntur: cum vix, vel noui quidquam, vel satis vtilis reperiamus. Non possunt enim peregrinaeres, in museis saepe mutilatae, bene describi.

In Appendice reperitur.

1. Epistola Cl. IO. MAR. DE TURRE ad Cl. BATA-
TARRAM, in qua putat, partes sanguinis globosas comprimi posse; structuram pilorum esse intus compositam particulis irregularibus, et incisuris, globulisque distinctam; BONANNI disquisitiones microscopicas esse saepe falsas; et venenum Tarrantulae eiusque curationem musicis sonis esse dubiam, atque sola vulgi opinione confirmatam.

2. Epistola BATARRAE ad IOH. CHRISTOPH.
AMADVTVM: vbi varia a se inuenta describit corpora naturalia: primo *Vrticam*, quae *Patera Neptuni* illic dicitur; haec quatuor pollices diametro habet, albida, et pellucida est; palpitationem et motus vitales extra aquam marinam per diem ostendit. Ex vna parte plana, ex altera varios in circumferentia bulbos habet. Pars media fulcum prominentem habet; crassities corporis lineam circiter aequat. Nobis structura vix cum *Medusa*; sed magis cum *Actinia* conuenire videtur.

2. Vuam marinam s. oua sepiarum. 3. Marinum corpus, quod Marsupium appellatur. Putat hoc esse *Cancris* cuiusdam ouum seu vterum. In cauo marsupii aliud continetur corpus, in quo cancelli reperiuntur, quod speciem Amnii esse ait.

Si exiguus cancer ad lupini fere magnitudinem pervenit, adscendit, marsupium perforat et exit. Cancer est hirsutus, a RONDELETIO *ursus* dictus. *Cancro Maena* LINN proximus. 4. *Experimenta circa Hirudines marinas*, quae in aliam aquam missae semper perierunt, neque corpori humano applicatae, fugunt.

- p. 236. 5. Obseruata circa *Raias*, vbi KLEINII obseruata Miss. Pisc. III. p. 41. corriguntur. Nempe omnes *Raiarum* mares pene duplici instruuntur. Deinde quilibet *Raiae* penis officulis decem constat. *Raia* femina autem vnicum vterum habet, atque vesica urinaria carere dicitur, oviductus autem et vreteres in vtero desinere. 6. *Trachinum Draconem* describit, eiusque iconem medio-crem dat. 7. Sub nomine pisciculi ignoti descri-
- p. 238. bit laruam *Ranae* cuiusdam.. 8. *Tellinam Peloridem*, cum animale. Animal per duos corporis trientes caudis neglectis e testa eminet. Duas cylindricas habet caudas, atque defendit Noster easdem esse entrochi protypum. 9. Corpus marinum spongiae simile, tubulosum, in quo *Onisci cetis* latebras quaerunt. Nominat illud *Alcyonium caudatum*. 10. *Fucum globosum, laciniatum, croceum*. 11. *Spongiam, ramosam, flauo croceam*, non alibi descriptam. 12. *Porum Anguinum* IMPERAT. Atro rufi coloris, qui est *Cellepora Spongites* LINN. 13. *Porum facie Sabinae* IMPER., quem MARSIGLI. hist. de la Mer. Planch. XXXII. depinxit. 14. Animal, quod Manum marinam, quae est LINNAEI *Alcyonium exos*, MARSILIUS dixit; sed si ex icone colligere licet magis videtur *Gorgoniae* species esse, et forte *Gorgonia setosa* LINN.
- p. 243. 14. Quaedam fossilia, vt Numulariam, s. Cornu Ammonis parvum petrefactum, et concretiones Gypseas, qua-

quarum vnam Tarsum, alteram Pilam Feretranam dicit.

3. HYACINTHI VOLII, Bonon. Med. Prof. de quadam Gypsi specie. Lapidem disquirat, qui a PASSERIO lignum fossile habitus est, atque in Italia passim reperitur: experimenta chemica autem demonstrarunt, esse eum Gypsum fibrosum.

Quodsi generatim nostrum de hoc libro iudicium ferre licet, putamus eum temere nimis pretiosum aestum esse, neque tamen vel rerum descriptorum grauitate aut nouitate, neque bonis descriptionibus aut iconibus se commendare. BONANNII textus, eo, quo scripsit tempore, magis perfectus vix elaborari poterat, nostris temporibus autem valde est mendosus; atque etfi Cl. BATARRA multa emendauit, multaque addidit, nimis multa tamen sunt superflua, plerumque ex aliis scriptoribus sumpta, nouas ad naturam ipsam factas, curatas descriptiones sane paucas reperimus. Omnino itaque de vsu, quem, vel periti naturae, quoniam pleraque cognita sunt, vel tirones cum non perfectam rei cognitionem accipere possint, ex hoc libro capiant, dubitamus. Icones sunt imperfectae, tum quoad sculpturam, tum etiam colorum illustrationem: vix hariolari licet, quod corpus indicetur. Triplici forma prodiit hic liber folio minori, tabulis non coloratis atque coloratis, et charta regia tabulis coloratis.

XIX.

Recueil de cente trente trois oiseaux des plus belles especes, gravés sur LXXXVI. planches, et colorés d'après nature par d' habiles maitres. à Rome. chez Houchard et Gravier libraires françois. MDCCLXXI. fol. reg.

i. e.

Collectio trigentarum et trium avium, tabulis aeneis octuaginta et septem, vivis coloribus illustratis depictarum.

Iuvat indicare aves hic depictas, quae sine vlla descriptione, absque nominibus Classici Auctoris, solo nomine triuiali, Gallico, Latino et Italico, tabulae singulae aeneae subscripto, prodierunt.

Tab. I. *Falco fulvus* LINN.

II. Falco, *Aquila romana*, colore castaneo dictus: mas et femina, cera pedibusque luteis, femina fronte, genis, rostrique mandibula superiore coeruleis, collo subtus carneo, corpore fusco; mas dilute castaneus.

III. *Falco Melanaetus*. LINN.

IV. Falco, *Aquila Etrusca* hic nominatus: rostro, cera, pedibusque coeruleis, corpore nigro cinerascante, fauce flaua.

V. *Falconis gentilis* LINN. varietas, *Aquila rapax*, s. *naevia* dicta.

VI. *Falco leucocephalus* LINN.

VII. *Falco chrysaëtos* LINN. haud bene picta.

Tab. VIII.

Tab. VIII. *Falco fulvus*, var *β. canadensis*. LINN.

IX. Aquilae Pullus, cuiusnam speciei sit, neque indicatur, neque coniecere licet.

X. *Falco Haliaetus* LINN.

XI. *Vultur Aquilinus* dictus, an *Harpyia* LINN. rostro pedibusque sanguineis, corpore nigro et ferrugineo.

Emberiza Cyris LINN. quae male picta ex EDWARDI opere huc sumpta esse videtur.

XII. *Vultur Percnopterus*. LINN.

XIII. *Vultur Monachus* LINN. ? occipite prominente, collo albo corpore bruno: dicitur hic *Vultur leporarius*.

XIV. *Vultur Brasiliensis* RAI, qui est *V. Aura* LINN. Sed cum descriptione LINNAEI non conuenit: coeruleus est, remigibus rectricibusque subnigris, rectricibus alarum brunis depingitur.

XV. *Vultur Papa* LINN.

XVI. *Vultur barbatus* LINN.

XVII. *Vultur aquilinus* cinereus; remigibus extimis nigris, capite flauo, pedibus carneis.

XVIII. *Falco vulgo in Etruria Milano*. an *F. subbuteo* LINN.

XIX. *Falco Aquilinus fulcus*, an *Falco Gyrfalco* LINN. at pedes, non lutei, sed cinerei.

XX. Eadem species, pedibus humerisque sanguineis.

Tab. XXI. *Falco barbarus*. LINN. mas, vt videtur:
brunus, rectricibus, caudaque coerulescente abdomine albo, fusco maculato.

XXII. *Falco Pygargus* LINN. femina.

XXIII. *Falconis Halyaeti* LINN. varietas.

XXIV. *Falco cyaneus* LINN. femina.

XXV. *Falco Buteo* LINN. mas.

XXVI. *Vultur Albiulla* LINN. male picta.

XXVII. *Falco boeticus*, rostro aquilino, an *Vultur barbatus*, iunior, LINN.

XXVIII. *Falco tinnunculus* LINN.

XXIX. *Falco gentilis* LINN.

XXX. *Falco barbarus*. LINN. femina.

XXXI. Varietas praecedentis pennis mutatis.

XXXII. et XXXIII. *Falco Palumbarius* LINN.

XXXIV. *Falco lanarius*. LINN. pedes vero sunt
flauescentes, collum abdomenque rufum
maculis brunis.

XXXV. *Falco Gyrfalco* LINN. ex Muscouia.

XXXVI. *Strix stridula* LINN. et *Accipitrina*
PALL *).

XXXVII. 1. *Falco*, *Albanella rufescens* dictus:
corpore rufo bruno, rostro pedibusque
subnigris, cauda subtus alba.

2. *Falco* in Etruria vulgo *Barletta*; niger,
pectore, remigibus primoribus in basi al-
bis, crisso et femoribus plumosis rubris,
orbita lutea.

XXXVIII.

*) vid comm. nost. Vol. XXI. p. 310. cf. et D'AVBENTON
t. 463. comm. nostr. Vol. XXI. p. 16.

Tab. XXXVIII. *Falco coerulescens* LINN. ex EDWAR-
DO videtur esse defunctus. et *Falco muro-*
rum, qui etiam est *F. tinnunculus* LINN.

XXXIX. *Falco*, *Albanella torquata* dictus;
nigro brunus: tectricibus alarum cauda-
que albo coeruleis, capite dilute bruno,
rostro coeruleo, pedibus flavis.

XL. *Falco Gyrfalco*, LINN. aetate canescens.
Falco tinnunculus LINN. varietas, capite
remigibus caudaque coeruleis.

XLI. Eiusdem varietas, remigibus nigris,
cauda fasciata.

XLII. 1. *Falco*, vulgo *Barletta*, superius fuscus,
subtus rufescens, tectricibus alarum, et
rectricibus mediis coeruleis, exterioribus
et remigibus subnigris:

2. *Falco* cinereo coerulescens, crisso
flavo, cera, pedibus orbitaque rubris.

XLIII. *Falco diuerficolor*, coeruleo, rubro,
flavoque varius 2. *Falco paruerius*: LINN.

XLIV. 1. *Falco Nifus*. LINN. Emerillon 2.
Falco Palumbarius. LINN. Vtriusque
huius *Falconis* varietas tabula XLV. fi-
stitur.

XLVI. *Falco Nifus*, LINN. femina. 2. *Fal-*
co sacer, cera pedibusque luteis, corpore
rufo, coeruleo cinereoque vario, rostro
coeruleo.

XLVII. 1. *Cuculus mindanensis* et 2. *coeruleus*
LINN.

XLVIII. *Cuculus sinensis* et 2. *paradiseus* LINN.

Tab. XLIX. 1. *Cuculus cristatus*. 2. *niger*. LINN. male
tamen cberuleus pingitur.

L. *Cuculus glandarius*. LINN.

LI. *Cuculus canorus* LINN. 2. *C. niger* et albo
mixtus, cristatus: supra niger, subtus al-
bus, collo subtus flauo, remigibus pri-
moribus rubris, rectricibus duabus ex-
timis albis, cauda rotundata.

LII. 1. *Cuculus coromandus*. LINN. 2. *C. aerugi-
nosus*, supra rufus, subtus albus, trans-
versis maculis fuscis.

LIII. *Cuculus Iamaicensis* longiroster: capite
viridi, corpore supra bruno, subtus albo
coerulescente, cauda cuneata, rectricibus
subtus nigris apice albis: rostrum male
sculptum, rostro anserino similis, quam
Cuculi est.

LIV. *Cuculus variegatus*. 2. *C. Persa* LINN.

LV. *Caprimulgus Europaeus*, cum var. β . LINN.

LVI. *Strix Asio*. LINN.

LVII. *Strix Nyctea*. 2. *Scops* LINN.

LVIII. *Strix funerea* LINN.

LIX. *Strix Otus* LINN.

LX. et LXII. *Strix Bubò*. LINN.

LXI. *Strix Aluco*. LINN.

LXIII. *Strix flammea* LINN. et *Nyctea*.

LXIV. 1. *Strix hudsonica*, alba rufo varia. 2.
Strix rufa; inauriculatae ambae.

LXV.

Tab. LXV. *Strix ulula*. 2. *Strix alba*; forte prioris varietas.

LXVI. 1. *Strix flava* dicta; sed est bruna, subtus albo viridique varia. 2. *Strix cinerea*: ambae inauriculatae, pedibus nudis pictae.

LXVII. *Psittacus Macao*. LINN.

LXVIII. 1. *P. erithacus*. 2. *aestivus* LINN. var.

LXIX. *P. serenus*.

LXX. *P. amazonicus*. LINN.

LXXI. *P. amboinensis*. 2. *garrulus*. LINN.

LXXII. *P. accipitrinus*. 2. *garrulus*. var. β .

LXXIII. *P. leucocephalus*. 2. *aestivus* LINN.

LXXIV. *P. lory*. 2. *aestivus* LINN. varietas.

LXXV. *P. brasiliensis*. 2. *cristatus* LINN.

LXXVI. *P. domicella*. 2. *autumnalis* LINN.

LXXVII. *P. Ararauna*. LINN.

LXXVIII. et LXXIX. *P. cristati* LINN. varietates.

LXXX. 1. *Lanius canadensis*. 2. *manillensis*, niger abdomine dilute coeruleo, axillis, vropygio, et rostri basi albis. 3. *L. Senegalus*. 4. *L. Barbarus*.

LXXXI. *Lanius collurio* LINN. 2. *L. madagascariensis*, supra coeruleus subtus albus. 3. *L. curuirostris*. LINN.

LXXXIII. *Lanius coeruleus*. 2. *L. cristatus*. 3. *L. cayanus*. 4. *L. totus sanguineus*, rostro pedibusque flavis; Surinamensis.

Tab. LXXXIV. 1. *Lanius minor*, rufo cinereus. *Frisch.* au. t. 61. 2. *L. rufus*. LINN. 3. *L. madagascariensis*, maior, viridis, subtus albus BRISS. II. t. 19. f. 2. D'AVB. t. 374.

LXXXV. 1. *Lanius Excubitor*. 2. eius varietas. 3. *minimus*, passeri similis, fuscus, pedibus rostroque subnigris.

LXXXVI. *Paradiseae*. 1. *apoda*, eiusque varietates 2. *regia*. ex EDUARDO sumta.

Quodsi iudicium nostrum de iconibus requiritur, non possumus, quin ingenue fateamur, eas esse omnino rudes, atque potissimum offendere artem sculptoriam, quae nostris temporibus multo magis profecit: Accedit et hoc, quod colores crasso nimis et rudi penicillo illiti sint; ut adeo ei rei, quae in titulo indicatur, esse nempe has icones a summis artificibus factas, non conuenire possimus. Caeterum saepe etiam situs multarum avium nimis est distortus, flexus, et incongruus. Interim tamen ex his rudiusculis iconibus licet auis ipsius, quae depingitur, si eam iam cognoueris, aliquam similitudinem reperiri. Et si primae essent de auibz icones, laudem et plausum mererentur: cum vero iam plures iconographi, EDWARDVS, FRISCHIVS, BUFFONVS, et cuius icones nuper indicauimus, *) D'AVBENTONVS adsint, non videtur multum utilitatis, ex hoc satis pretioso libro redundare: cum praeterea nulla adsit auis descriptio, vel aliae de historia avium observationes. Sane haud multum emolumenti in scientiam naturalem, ex his libris sperandum est: cum augeantur temere sumtus impendendi, et iconibus malis, saepe tirones et alii in errores ducantur.

XX.

*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 11.

XX.

Marmora et adfines aliquot lapides coloribus suis exprimi curauit et edidit *Adamus Ludovicus Wirsing*, Chalcographus Norimbergensis. Noribergae. 1775. fol. 6. plagg. Tab. aen. 13.

Depictae sunt septuaginta et octo marmoreae tabellae, in forma quadrata scissae, quae varietates colorum satis insignes marmoris, ex diuersis regionibus Germaniae sumti, repraesentant. Addita est breuissima quoad colores descriptio Germanica et Latina, in qua locus natalis indicatur, tum etiam magnitudo fragmentorum marmoris, in quae vnaquaeque varietas secedere solet.

Tabulae ipsae multa arte pictae sunt: interim tamen multum absunt icones a nitore naturali marmoris ipsius; cum maculae venaeque diuersi coloris male expressae sint, praesertim albae. In vniuersum etiam hanc rationem, marmora illustrandi, physico mineralogo plane inutilem iudicamus, cum, vti satis constat, colorum varietas in marmore innumera sit, neque ex ea sola, sed ex duritie et subtilitate particularum marmorum diuersitas aestimetur.

XXI.

IOHANN IACOB FERBERS *Beschreibung des Quecksilber Bergwerks zu Idria in Mittel Cräyn. Berlin. 1774. Bey Christian Friedrich Himburg. 8. 5. Bog. 3. Kupf.*

i. e.

Descriptio fodinae hydrargyri, quae Idriae in Carniolia inferiori reperitur; Auctore IOANNE IACOBO FERBERO.

Exactissimam atque omnibus mineralogis certe acceptissimam Cl Auctor hoc libello dat descriptionem fodinae Hydrargyri Idriensis, ita quidem, ut historiam naturalem eiusdem, ipsam fodinae culturam, et numerum operarum, eorumque distributionem et stipendia iis data, machinarum hydraulicarum illic adhibitarum, tum etiam contusionis, triturationis, et loturae, docimasiae et vstionis s. sublimationis minerarum rationem exponat: deinde sylvarum naturam, eaque, quae ad politiam monticolarum spectant, expensas nempe et redditus, et magistratus indicet: denique quaedam historica de hac fodina referat.

p. 1.

Idria posita est in altitudine polari $45 \frac{1}{2}$ graduum, in valle, quae vndique montibus calcariis, qui eiusdem cum alpibus summis Carniolicis sunt indolis, cincta est. In valle ipsa ab occidente versus orientem aqua nonnullorum fontium et pluuialis fluit; fluuius *Idria* s. *Idriza* autem ab oriente versus occidentem ruit.

Mons, qui a mineris nomen habet, (*der Erzberg*) ab horizonte vallis, quinquaginta perticas Idrienses eleuatur, humo fertili tegitur, sub quo argilla calce mixta s. marga reperitur: His suppositus lapis

pis calcareus, qui vel albescentis, vel flavescentis, vel nigrescentis est coloris, atque lapidem montis constituit: incumbitque hic vti alibi *) schisto argillaceo, in quo, tamquam lata vena, calcareum perforante, minerae omnes mercuriales reperiuntur, qui itaque lapidem venae hic constituit, et probabiliter cum lapide argillaceo, qui in alpibus Carnioliae, calcareo lapidi subiacet, in altitudine nondum detecta cōhaeret.

Huius venae schistoso - argillaceae iacens et pendens est lapis calcareus, extensio eiusdem est a meridie versus septentrionem: quoad descensum est vena *erecta* maxime, quamvis in superioribus *pendens*, et in inferioribus locis *improba* sit. Crassitie variat, interdum vnam, in pluribus autem locis decem, imo viginti quatuor perticas aequat. In venae crassiore loco interdum cunei spatii cal- p. 6. carei, vel compacti argillacei lapidis intrusi sunt, quae venam in plures minores diuidunt.

Schistus argillaceus venae est mollior, atque bituminosus, saepe pice montana, instar lithanthracis mistus, ita vt ad flammam ardeat. Schistus hic ad lapides primaeuos, et qui lapide calcareo prius adfuerunt referendus est, atque prius iam Hydrargyro videtur penetratus esse, quam lapide calcareo tegeretur. Partes calcareae, schisto immixtae, tum etiam cunei calcarei spatiosi in rimis reperiundi inundationibus originem suam debent. Atque forte mutatio hydrargyri in cinnabarem **), postea, calcarei particulis adlatis, facta est.

Hy.

*) cf. Cl. Auctoris litteras, quas indicauimus in comm. nostr. Vol. XX. p. 244. vti quoque Cl. de BORN literas. vid. comm. nostr. ibid. p. 506.

**) cf. Cl. WIGLEBII chemica scripta, qui Cinnabaris parationem humida via docuit.

p. 10. Hydrargyrum et Cinnabaris in vena Idriensi, vel omnem lapidem venae schistofum penetrarunt, et quasi in mineram mutarunt; vel in fissuris, et glandulis compacta reperiuntur. Quo magis niger, et mollis est schistus, eo magis etiam hydrargyro abundat. Minerae ditiores plerumque sunt margaceae, quae si non maiori pyritae copia praeditae sunt, quam ad mineralisationem hydrargyri opus erat, polituram assumunt, et in centenario, ad 80 libras hydrargyri continent. In schisto compacto et sicco hydrargyrum nativum reperitur. In fissuris et rimis calcarei lapidis interdum cinnabaris tessularis et cubicus, crystallifatus adhaeret. Optaremus, ut Cl. Auctor curatius has crystallos descripsisset.

Tota Idriensis fodina ambitum complectitur, quoad longitudinem venae extensae 350 perticarum, quoad latitudinem 130 perticarum: altitudo maxima verticalis est III. perticarum.

Quotannis exinde 3000 centenarii hydrargyri obtinentur.

His praemissis Cl. Auctor breuiter mineras et lapides hic reperiunda recenset, cum iam a Cl. SCOPOLI*) indicata sint, varia tamen addit, ut Gypsum crystallifatum, forma vitrioli martialis crystallis simile. Minerae mercurii hic dicuntur rubra, (*Rotherz*) hepatica, (*Lebererz*) bituminosa, (*Branderz*) coralliformis; (*Korallerz*) atque fibrosa (*Schnürelerz*): eas vero nihil esse nisi, schistum vario modo ab hydrargyro penetratum, supra iam diximus.

Ad

*) Vid. EL. tentam. de hydrargyro Idriensi. Venet. 1761. 8. et *Einleitung zur Kenntniß der Fossilien*.

Ad aëris circulationem promouendam nullis P. 35.
opus est machinis, cum ea per se sustineatur: in-
quibusdam tamen locis, praesertim vbi hydrargy-
rum natium in molli schisto reperitur, vapores no-
xii sulphurei sunt, atque operarii illic vix per duas
septimanas commorari possunt, alias saluatione at-
que artuum tremore affliguntur. Aquae vero ma-
chinis, aquis iterum agitatis, extrahuntur.

Lotio minerarum hic duplex est: altera, quae p. 38.
solum lotio his in locis dicitur, fit cribris septem vel
pluribus sibi impositis, ita vt subtiliora infimum
occupent locum: ita maiora et ditiora frustra a mi-
noribus et pauperioribus separantur: altera est ea,
quae vbique fieri solet, atque hic elutriatio di-
citur *).

Separatio hydrargyri a terris et sulphure fit p. 42.
sublimatione, atque quidem modus eam instituen-
di conuenit quoad essentialia cum ea, quam Cl.
IUSSIEV in *Actis Parisinis* **) descripsit, in multis
tamen magis est correctâ: correctio praecipue in eo
consistit: camera ad fumum recipiendum exstru-
cta, dissepimentis in plura spatia diuidatur; quo
fit, vt hydrargyri vapor prius refrigeretur et con-
densetur, quam in aërem liberum expandatur, at-
que sic nihil mercurii perdatur. Caeterum Cl.
Auctor omnem sublimationis methodum vberius
et curate describit, fornacesque tabulis aeneis de-
lineatas tradit; recte autem reprehendit studium
hanc artem hic tacendi atque tamquam arcanam
tractandi, quod vti generatim a doctis et rerum pe-
ritis abesse debet, ita hic ignorantiae in chemicis
doctrinis manifestum est signum. Nam ostendit
Cl.

*) vid. WALLER. metallurg. p. 200. vid etiam SCOPOLI princip. mineral. p. 151.

**) vid. Mem. de l' Arat. de Paris. ann. 1719. p. 461.
sqq. cf. SCOPOLI. l. c. p. 154.

Auctor multis modis hic errores committi; ipsa elutriatione multum cinnabaris perdi; sic per iuncturas aludulorum magnam hydrargyri copiam vaporum forma diffundi: mineras post aliquot horas in fornace ipsas aduri sicque compingi, et exitum impedire, id quod facile agitatione minerarum prohiberetur; cameram vaporariam nimis esse a fornace propinquam, neque vllum fere esse, aerem in hac refrigerandi adhibitum remedium, quod tamen aqua machinisque aereis fieri posset: atque maxime vtile esse futurum, si lapis calcareus, tanquam fusionis adiuuans, mineris immisceretur, quod hic negligitur.

Nos dignissima tantum indicauimus, plura omittere cogimur, quae potissimum politiam fodinarum spectant; certe autem sperare licet, librum hunc lectu dignissimum ab iis, quorum interest, ipsum diligenter lectum iri: Cl. Auctori autem cum omnibus veris naturae studiosis pro tam utili et egregia fodinae Idriensis descriptione gratias libenter agimus.

XXII.

IOHANN HÜBNERS *curiöses und reales Natur - Kunst - Berg - Gewerk - und Handlungs Lexicon*, darinne nicht nur die in der Physik, Medicin, Botanick, Chymie, Anatomie, Chirurgie und Apothekerkunst, wie auch in der Mathematick, Astronomie, Musick, Mechanick, bürgerlichen und Kriegs - Baukunst, Artillerie, Schiffarthen etc. ferner bey den ritterlichen Exercitien; bey Bergwerken, Jägerey, Forstwesen, Fischerey, Gärtnerey; wie auch in der Kaufmannschaft, bey Buch-

halten und in Wechselfachen, bey Künstlern und Handwerkern gebräuchlichen Kunstwörter beschrieben werden: Sondern auch alle im Handel, und Wandel, ingleichen im Jure und vor Gerichte vorkommende Wörter, deutlich erkläret sind. Welches als der zweyte Theil des realen Staats-Conversations und Zeitungs-Lexici mit grossem Nutzen zu gebrauchen. Ehemahls herausgegeben von D. GEORG HEINRICH ZINKEN, ietzt aber aufs neue durchgehends verbessert und umgearbeitet. Mit römisch. Kaiserl. und churfürstl. sächsischen allergnädigsten Privilegiis. Leipzig. In Johann Friedrich Gleditschens Handlung. 1776. 8. mai. Seiten 2538.

i. e.

IOANNIS HÜBNERI curiosum et reale naturae, artium, metallorum, fodinarum et commercii Lexicon cet.

Etiam si completas et perfectas rerum propositarum descriptiones hic liber non complectitur; tamen eum vtilitate non plane destitutum esse manifesto apparet ex variis eius editionibus, quae subinde prodierunt.

Contenta in hoc libro partim ex inscriptione libri ipsius possunt intelligi, partim ex praefatione b. HÜBNERI cognosci. B. ZINKIUS quidem iam multas res in eo correxit et accuratius definiuit; attamen cum res spectantes historiam naturalem, quae hodie inprimis diligentissime colitur, multis erroribus scatebant, eae potissimum in hac ipsa noua editione, quam hic indicamus, curatius sunt propositae et prorsus aliter interdum elaboratae.

Tom. XXII. Pars I.

L

Linn.

Linnaeana nomina in animali et vegetabili regno vbique adhibita sunt: ita enim confusio et repetitio multorum vnam eandem rem indicantium nominum diuersis in locis est euitata et spatium aliis nouis articulis est impletum. Plantae non solum officinales, sed et oeconomicae, hortenses et exoticae hic inueniuntur, atque inprimis quidem arbores ex America Septentrionali, quae plantationibus struendis seruiunt.

Regnum minerale spectantes res secundum WALLERIVM descriptae et chemice emendatae sunt. Quae pertinent ad anatomiam et chirurgiam res, breuius et hoc recte quidem sunt indicatae, quoniam medici et chirurgi alios sciunt fontes.

Ex articulis astronominicis id, quod superstitionem sapit, de influxu scilicet stellarum in corpora et terrestrem globum cet., omissum est. Ex his ergo, quae in praefatione ad nouam hanc editionem leguntur, patet multas res, vt sermonem in hoc lexico ipsum, emendatas esse et mutatas ita, vt subinde illud magis magisque correctius et emendatius evasurum esse sperare liceat.

XXIII.

FRID. BERN. ALBINI de natura hominis libellus.
Lugd. Batauorum, apud Petrum Delfos lun.
MDCCLXXV. 8. mai. plagg. 14 $\frac{1}{2}$ c. praefatione.

Accedit huic libro suppellex anatomica. Pars prior rerum anatomicarum, quae phialis continentur in liquore limpidio; pars altera rerum anatomicarum, quae siccatae conseruantur. Haec igitur praeparata anatomica, quorum nonnullorum iam BERNHARDVS SIEGFRIED ALBINVS in academicis an-

annotationibus suis aliisque ab EODEM scriptis libris mentionem fecit, tredecim plagulis accurate hic describuntur. Atque ipsa haec suppellex anatomica licet sat magna, tamen in titulo libri ipsius, de quo nunc videbimus, non est indicata, et quoniam novus numerus paginarum est inceptus, plagulas tredecim suppellectilis, cum plagulis quatuordecim et dimidia ipsius libri in inscriptione libri non simul supra indicauius.

Neglectis coniecturis ex sectis artificiose cadaveribus, ex oeconomiae humanae tum integritate, tum ab aegritudine, recreatione attento perspectis animo, hominem describit totum Cl. ALBINVS, nec nouam vult, vti in praefatione Ipse profitetur, proferre doctrinam. Cum quasi eorum sit compendium, quae frater Nostri, in anatome olim et chirurgia, dein et in physiologia ductor ac praecessor docuit in scholis: quin etiam complectatur cogitata, familiares inter sermones ab eo accepta, aliaque, aut in manuscriptis obuia, aut impressis in operibus definita. Haec omnia in praefatione ipsa inveniuntur.

Conciso dicendi genere has institutiones Noster conscripsit, ideoque breuitati studuit. Ordo huius rei tractandae, quem sequutus est Cl. Auctor, placebit. Nomina vero interdum occurrunt, quae novitatem produnt, vti sunt *nutricatio*, *bursula*, *virginal*, *cadurdae*, *receptaculum venosum dextrum*, *spiritualis fistula*, quae excipit pulmones.

Praeterea et index locuples rerum in hoc libro contentarum est a Nostro additus duplex, quorum vnus res de natura hominis indicat, alter suppellectilem anatomicam recenset.

- Haec, quae sequuntur exempli loco addimus.
- p. 3. *Principia hominis.* Sunt in homine corpus;
vis actiuosa; mens.
- p. 5. Siue *actiuosa vis*, siue impetum faciens, siue sensibilitas, siue irritabilitas, siue vitalis dicta, natura sua non cognoscitur.
Coniunctio corporis, vis actiuosae, mentis.
- p. 7. Conspirant corpus, vis actiuosa et mens.
Phaenomena vnionem docent, cuius modus ignoratur.
- p. 8. *Potestas agendi principiorum hominis in se inuicem.*
Actiuosa vis multis modis corpus afficit; ab eoque afficitur.
Vix verosimile coniunctas inter se vim actiuosam et mentem vniam conficere naturam, quae pro conditione partium corporis, quibus inest, alia efficit, aliaque; atque alio alioque modo ab iis afficitur.
Determinare vetat ignota vtriusque natura.
Dubium faciunt proprietates vis actiuosae in brutis similes ac in homine, illaeque mentis in homine solo perfectae; imperfectae, si vllae in brutis.
- p. 11. *Oeconomia hominis.* Corpus viuum agit, multisque defungitur.
Est *functio* agendi potestas, quae efficere apta, quamuis non efficiat.
Actio re ipsa efficit.
Functio est vitalis, naturalis, animalis, genitalis.

Noua physica medica.

Academia Regia chirurgica *Parisiensis* sequentem cum viris eruditis communicauit quaestionem:
Exponere regulas dieteticas respectu imprimis alimentorum in curatione morborum chirurgicorum.

(*Exposer les regles diététiques relatives aux alimens dans la cure des maladies chirurgicales*).

Praemium erit nummus aureus quingentarum librarum Gallicarum pondere. Tractatus sunt scribendi vel Gallica vel Latina lingua et Cl. LOVIS, qui ab epistolis perpetuo est Academiae, solutis vectigalium pecuniis, ante finem anni 1776. tradendi.

Inter ea problemata a Societate Regia scientiarum *Hafniensi* proposita, indicamus hoc, quod classem eiusdem physicam attinet et ita sese habet:
explicare genesin acidi nitrosi exquisitis experimentis.

Qui hancce rem optime exposuerit, nummum aureum centum thaleros Danicos aequantem praemii loco accipiet. Elaborationes ipsae Gallica, Latina, Germanica vel Danica lingua scriptae mittantur ante Maii 1777 finem Ill. DE HIELMSTIERNA.

Regia *Gottingensis* scientiarum societas repetit quaestiones, quae et a nobis partim sunt memoratae.

Ad Nouembrem anni 1776.

*Quaenam vegetabilia in Hannouerano territorio sine cultura crescant cet *).*

Ad Iulium anni 1777.

Haec quaestio attinet *usum vitrioli albi oeconomicum **).*

L 3

Ad

*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 552.

**) v. ib. Vol. XXI. p. 168.

Ad Nouembrem anni 1777.

Quaerit societas: num *coryza equorum fit contagiosa?* *)

Ad Iulium anni 1778.

Solida instructio pro rustico, qua tempestatum vicissitudinum, quoad rura, per omnia anni tempora habere possit rationem.

Commentaria ante Maium et Septembrem semper sunt tradenda. Praemii valorem et alias cautiones mittendorum commentariorum ex locis hic laudatis intelligere possunt Lectores.

Societas oeconomica *Petropolitana* hanc thesin proposuit:

Dare et describere modum, facile, nec adeo sumptuose salis culinaris praeparandi, idque ex diuersis salis lacubus, quos Academici in itineribus suis ultimis per Russiam detexerunt, ipsum separandi solo adiuuante calore solis, quod ita purificetur et a sale amaro et ab imperfecto culinari, quae fere semper mixta inter se inueniuntur, ut usurpari possit ad omnia alimenta sale condienda.

(Donner et decrire un moyen aisé et peu couteux de preparer le sel de cuisine, qu'on peut tirer des diuers lacs salés, que les Academiciens ont decouverts en Russie, dans leurs derniers voyages, de façon que ce sel se depose de lu même, et par la seule chaleur du soleil, qu'il soit purifié tant du sel amer, que du sel de cuisine imparfait qui s'y trouve ordinairement mêlé, et qu'on puisse l'employer pour saler les alimens quelconques).

Qui hoc problema definiuerit, accipiet monetam viginti et quinque numos aureos Hollandicos aequantem, si quidem ante Octobrem 1776. acceperit Societas. Conscribantur tractatus *Russica*,
Ger-

*) v. comm. n. Vol. XXI. p. 344. seqq.

Germanica vel Gallica lingua et inscribantur: à la
Société économique libre de St. Petersbourg.

Excellentissimus CHRISTIANVS GODOFREDVS
GRVNER Professor medicinae in Academia, quae
Ienae floret, celeberrimus, die 6. Februarii 1776.
inter sodales Academiae Naturae curiosorum est
receptus, atque etiam nuper Consilarii Aulici munere
a Serenissimo Duce Saxo-Vimariensi ornatus est.

Experientissimus CONSPRVCH in Academia mi-
litari *Stuttgardina* Professor medicinae ordinarius
creatus, nec non Cl. MORSTATT *ibidem* designa-
tus est Professor.

Cl. I. W. GVLDBRANDT medicinae Doctor Haf-
nienfis Consilarii Aulici honore est condecoratus.

Maxima cum voluptate relatum legimus Cl.
IGNATIVM DE BORN *) museum quod Vindobonae
servatur, descripturum esse. Quotannis volu-
men eius descriptionis pollicetur.

Cl. CHRISTOPHORVS GOTTLIEB BÜTTNER
medicinae doctor et anatomiae professor publicus
ordinarius, tunc temporis Rector Academiae Regio-
montanae die 10. Aprilis 1776. anno aetatis sexa-
gesimo octavo est mortuus.

Cl. IOANNES PIPER Archiater Regius et Con-
siliarius Aulicus **) *Hafniae* aetatis anno septuage-
simo tertio diem supremum obiit.

*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 170.

**) v. comm. nostr. Vol. II. p. 543.

CL. CAROLVS PHILIPPVS BRANDES Medici-
nae Doctor, chemiae professor cet. *) anno aeta-
tis quinquagesimo sexto *Berolini* vitam cum morte
commutauit.

Experientissimus I. F. LENTNER Physicus Bri-
gensis die 21. Maii 1776. desit viuere.

Experientissimus SEIP, qui *Hamburgi* cum no-
minis celebritate medicinam fecit, summa senectu-
te pressus ad finem praeteriti 1775 anni ibidem ex
hac vita discessit.

Quae beatus Illustris LIEBERKÜHN olim indu-
stria laborum sibi comparauerat praeparata anatomi-
ca, hucusque apud haeredes viri celeberrimi opti-
me conseruata, venalia nunc offeruntur, vna cum
iconibus quarundam praeparationum sub auspiciis
Illustris Possessoris a peritissimo pictore *Balbe* ad
vium dexterrime delineatis. Collectio praepa-
ratorum vt plurimum selectissimorum, structuram
membranarum, glandularum, vasorum et visce-
rum praecipue illustrantium, partim artificiosissi-
mis iniectionibus coloratorum, continetur duobus
theeis nitide exstructis et ornatis.

No. 1. In prima cystide continentur CXIV. prae-
parata. Quodlibet eorum capsulae singulari ex auri-
chalco confectae inclusum est, in cuius fundo, ni-
gro colore obducto, praeparatum repositum ope
vitri politissimi a latere opposito affixi optime sese
conspiciendum dat. Omnes capsulae numerum
indici respondentem incisum habent, et microscopio tam simplici, quam composito immitti possunt,
quod ex argento totum confectum tam artificiose
con-

*) v. ibid. Vol. III. p. 351. Vol. IV. p. 725.

constructum est, vt non solum vsui anatomico, sed omnibus, vbi microscopio opus est, seruire possit. Lentes multaque ad apparatus microscopicum pertinentia, omnia ex argento confecta, in patinis aureis reposita inueniuntur.

N. 2. In altera cystide XLVIII. praeparata reposita iacent tabulis vitreis planis laeuigatis, hermetice figillatis inclusa. Vnumquodque ex his praeparatis singulari machinae microscopicae ex aurichalco confectae et necessario apparatu instructae adaptatum est.

N. 3. Icones XIX. et duae tabulae aeneae.

Beati LIEBERKÜHNII *vidua Berolini* degens, primam offert thecam pretio *centum et sexaginta* nummorum aureorum Fridericianorum: secundam pretio *octoginta* eorum nummorum aureorum, sic vti *icones* pretio *quadraginta* nummorum aureorum venales sunt.

In theatro anatomico *Gothano* Cl. SVLZER per hyemem 1776. cadauer equinum, praesentibus multis artis veterinariae amicis dissecuit, vt chirurgi atque medici veterinarii iuniores discerent internarum partium statum.

XXV.

Supplementum indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1771. prodierunt.

Giornale d' Italia spettante alla scienza naturale e principalmente all' agricoltura, alle arti, ed al commercio. Tomo settimo in Venezia 4. c. f. (*Plurimae, quae in hoc opere continuato inveniuntur res, spectant oeconomiam, artes, commerciaque, pauca ad historiam naturalem pertinent.*

Elaborationum nimirum nouarum, quae potissimum laudantur, recensionum ex utilibus Italicis libris et breuium relationum de libris exteris vicissitudo in eo opere occurrit. In hoc septimo, quem hic indicamus, tomo de turfa, de morbis mororum albarum et index botanicus plantarum pabularium continetur. Noui commentarii Academiae Petropolitanae Tom. XVI. v. comm. nostr. Vol. XX. p. 13.

Auserlesene medicinische, anatomische und botanische Abhandlungen der Römisch Kaiserlichen Academie der Naturforscher 30ter Theil Nürnberg. 4. m. K. (Est Continuatio epitomes Actorum Academiae Naturae curiosorum.)

Wittenbergisches Wochenblatt J. TITIVS.

Der Eklektiker eine medicinische Wochenschrift 1stes Vierteljahr Hamb. und Bremen 8.

Stralsundisches Magazin oder Sammlungen auserlesener Neuigkeiten zur Aufnahme der Naturlehre, Arzneywissenschaft und Haushaltungskunst, 2ten Bandes 1stes Stück. Berlin und Stralsund 8.

Ephemerides du citoyen, ou bibliotheque raisonnée des sciences morales et politiques Tom. VIII. Paris. 12. (Hoc opusculum coepit vulgari anno 1767. et continet oeconomicorum, politicorum et moralium nouorum scriptorum, narrationum et contemplationum iudicium. Primos tomos curauit Abbas BOUDEAU, sequentes Cl. DUPONT. Varia scripta vero, quae hic continentur, sunt eodem tempore seu non diu post seorsim edita. In hoc tomo de cultura rubiae tinctorum, et quidem optima partis eius, quae dicitur Crap, agitur, de oryza sicca (riy sec) cet.)

Allgemeines Künstler Lexicon zweytes Supplement. Zürich 4. (Auctore Cl. FÜESLIN.)

Ency-

Encyclopedie ou dictionnaire universel des arts et des sciences, françois, latin et anglois, Tomm. II. Londres et à Dresde 4.

Der kluge Hausvater beym wirthschaftlichen Geschäfte der Aufbehaltung verschiedener wirthschaftlichen Producte. Neue Auflage Leipzig 8.

Les économiques (Par L. D. H.) a Amsterdam Tom. III. et IV. 12 Mai. (*Est systema oeconomiae a Cl. DE LA RIVIERE et DES QVESNAY captui vulgi accommodatum. Duo priora volumina iam 1769 prodierunt*).

Kurze Instruction den Ackerbau betreffend Wien 8.
(*Res non adeo notatu dignas nec ubique veras in se continet hic liber*).

Neues Färberbuch oder kurzer Vnterricht Wolle, Seide und Leinwand zu färben. Kopenhagen 8. (*Nova editio atque emendata a Cl. ABILDGAARD*).

Neuentdeckter Cotton: oder Indianerdruck nebst der Sächsischen Schönfärberey. Neue Auflage. Carlsruhe 8.

Gedanken über die gegenwärtige theure Zeit mit angehängten untrüglichen Mitteln sich solche erträglich zu machen. Vlm 8.

Vnterricht für den Nassauischen Landmann wegen der Bienenzucht in Magazinen. Fr. und Leipzig 8. m. K. v. infra sub nomine IO. IAC. REINHARD.

Dizionario del filugello o sia baco da seta che contiene le regole pratiche per la buona educazione di esso, secondo le piu recenti scoperte. In Torino 8. (*Est vocabularium et attinet educationem laruae phalaenae bombycis mori L. Pauca noua hic inueniuntur*).

Briefe an das schöne Geschlecht über verschiedene Gegenstände aus der Naturlehre. 3ter Theil. Iena 8. m. K.

Anfangsgründe der Naturlehre für Kinder. Arnstadt. 8.
Storia naturale degli uccelli cet. Tom. III. v. comm.
nostr. Vol. XVII. p. 293.

Sammlung ausländischer und seltner Vögel des 7. Theiles 1-12. Stück Nürnberg. fol. mai (Est continuatio auium ex EDUARDO et CATESBY operibus sumtarum, quae sumtibus SELIGMANNI prodeunt).

Flora Danica Fasciculus X. v. comm. nostr. Vol. XIV. p. 217. de quo dicemus, cum XII. fasciculum, quam proxime exspectamus, receperimus.

Recueil de plantes dessinées et gravées anciennement à Francfort par la celebre famille DE MERRIAN Tom. 1. a Francfort fol. av. fig. 383.

Beyträge zur Wassergeschichte Böhmens v. comm. nostr. Vol. XX. p. 507.

Untersuchung die Wesenheit des Magneten und dessen Anziehungskraft betreffend. Berlin 8.

Die Kunst Thürme vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes durch Ableitungen zu bewahren. Sagan 8. (Confer. inferius sub FELBIGER).

Allgemeine Reisegeschichte von allen Ländern Völkern und Zeiten von einer Gesellschaft gelehrter Leute 29. Theil Franckf. 4. mai. m. K.

Der selben Fortsetzung als Beyträge, als Anleitung zur Reisegeschichte neuerer Zeiten. ib. m. K.

Histoire générale des voyages par mer et par terre. XIX. Vol. à Dresde 4. c. f.

Anweisung für diejenigen, die sich der Theologie, Rechtsgelehrsamkeit, Philosophie und der Arzneygelahrtheit widmen, wie sie solche auf der Vniversität treiben sollen. Königsberg. 4.

Pharmacopoea Wirtenbergica in duas partes diuifa
edit. noua, reuifa, aucta et emendata. Stutgard.
fol.

Spiegel der Alchymie des vortreflichen Philosophen
IOH. VON MEHVN. aus dem Lateinisch-französi-
schen; dem noch beygefügt BEN. ADAMS Traum-
geſicht nebst FRIEDRICH GALLI Reise nach der
Einöde St. Michael. Ballenſtadt und Bernburg 8.

Neue Sammlung von einigen alten und ſehr rar ge-
wordenen philoſophiſch und alchymiſtiſchen Schrif-
ten. 3ter Theil. Wien 8.

Das Geheimnis von dem Salze, als dem edelſten We-
ſen der höchſten Wohlthat Gottes in dem Reiche der
Natur von ELIAS ARTISTA HERMETICO. Wien.
8. (Idem liber Manhemii quoque venditur apud
Tobiam Löfflerum).

Der Triumphwagen des Vitriols oder Beſchreibung
von der Generation und Wundern dieſes groſſen
Subiects der Alchymie Franckf. 8.

Gegründeter Beweis, daß Galmey die wahre mi-
nera vitrioli philoſophici ſey. Iena 8.

Kunſt Butter und Käſe zu machen, nebst einigen Gedan-
ken über die Urſachen des Eckels vor dem Käſe bey
einigen Perſonen. Leipzig 8.

Wieneriſches Kochbuch: neue und mit einem Register
über die unbekannten öſterreichiſchen Wörter ver-
mehrte Auflage. Bamberg und Würzburg 8.

Betrachtungen über den Gebrauch des Rauchtabackes.
Königsb. 8.

Vnterricht fürs Volck gegen die Peſt. Dantzig 8.

Der Arzt der Frauenzimmer. Eine mediciniſche Wochen-
ſchrift 2ter Band. Leipzig 8. (Eſt liber parvi
momenti.)

Beschreibung von dem vortrefflichen Nutzen und der Wirkung verschiedener Arzneymittel. Hamburg und Güstrow. 4.

Die edle Reitkunst nebst einem Anhang von der Roß- arzney. Eisenach. 8. m. K. (Editio noua.)

Chirurgie complete suivant le systeme des moder- nes, contenant les maladies chirurgicales et les vertus des drogues simples 2. Voll. à Paris et à Dresde 12.

Neueröffneter Schauplatz geheimer philosophischer Wissenschaften, darinnen so wohl zu der Chiro- mantie, Metoposcopia, Physiognomie, Ophthal- moscopie, der Punctirkunst, Onomantie, Nativität- kunst, Cabala, Cryptologie, Cryptographie, Ste- ganographie und Dechifrierkunst Anleitung gege- ben wird etc. Regensb. 8. m. K. (Noua editio li- bri parui momenti).

Enumeratio suppellectilis librorum praestantissi- morum atque rariorum omnium facultatum la- tina aliisque doctioribus vsitatis linguis conscrip- torum, adiectis annotatiunculis litterariis et in- dice materiaram locupletissimo. Dresdae 8.

10. FRID. ACKERMANN'S *Nachricht von der sonderbah- ren Würckung eines Wetterstrales. Zweyte ver- mehrte Auflage. Hamb. und Güstrow. 8.*

ADAM'S of the stone v. comm. nostr Vol. XXI, p. 269.

AVBENTON V. d' AVBENTON.

ERNEST. GOTTFR. BALDINGERS *Biographien jetztlebender Aerzte und Naturforscher 1stes Ban- des 3tes Stück Iena 8.*

EIVSD. *Auszüge aus den neuesten Dissertationen über die Naturlehre, Arzneywissenschaft und alle Theile derselben. 1sten Bandes 3 und 4tes Stücks. Berlin und Stralsund 8.*

Ernest.

ERNEST. GOTTFR. BALDINGER *progr. secale cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberatum* Ien. 4.

BAUME' *Abhandlung vom Thon.* v. Vol. XVII. p. 436. Vol. XIX. p. 725.

BERENS de dracone arbore CLVSII. (*Haec dissertatio primum Gottingae prodiit. v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 448. Ibidem VANDELLI et CRANTZ quoque scripta de eadem re sunt recensita. Hoc vero anno Cl. BERENS dissertatio iterum prodiit Rigae in forma octaua apud. I. Fr. Hartknochium*).

J. E. BODENS *monatliche Anleitung zur Kenntniss des Standes und der Bewegung der Planeten und des Mondes von Monate May 1771. bis April 1772. nebst kurzgefasster Abhandlung und deutlichen Entwürfe der partialen Mondfinsterniß 1771. den 29. April, mit einen Kupfer.* Hamburg 8.

HERRMANN BOERHAAVE *rariorum morborum historiae prior et altera, recudi curauit ERNESTVS GODOFRED. BALDINGER* Frfti et Lips. 7.

BOLTEN de nouo quodam zoophytorum genere v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 466.

M. BOSSV *neue Reisen nach Westindien aus dem Französischen Magdeburg.* 8. (*Pauca ad historiam naturalem continet*).

HEINR. CHRIST. BROCKENS *wahre Gründe der physikalischen und Experimental allgemeinen Forstwissenschaft.* 3. Theile Leipz. 8.

LVDOV. BVXTORFII *cura valetudinis religiosorum ad normam naturae secundum rationis et experientiae dictamen delineata.* Ed. 2da Basil. 8.

Tractatus medicus de morbis infantum ex mechanica solidorum structura fluidorumque genio demonstratis a G. G. C. Hamburg. 8.

PETR. CAMPER *Vorlesungen über das herumgehende Viehsterben auf der anatomischen Schaubühne zu Gröningen 1769 gehalten. Aus dem Holländischen. Kopenhagen 8.*

ANDR. CHRIST. CHRISTENS *neues Kochbuch nebst einem Unterrichte, wie man die Speisen bey verschiedenen Gesundheitsumständen nützlich anwenden soll. Quedlinburg 8.*

IO. DEGENDESCH *nützliches und aufrichtiges Pferde oder Rosarzneybuch nebst, einem Anhang von Rindvieharzeneyen und Registern. Tübingen 12.*

DANI *aufrichtige und bisher in Schrifften verborgen gebliebene Entdeckung von der wahren Beschaffenheit der hermetischen Kunst. Hamb. 4.*

D' AVBENTON *planches d' histoire naturelle. v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 11.*

Supplément au traité de la conservation des grains ; nouvelle edition augmentée de la conservation des farines, par M. DVHAMEL DV MONCEAU, à Paris. 8.

ARTH. CONRAD ERNSTING *nucleus totius medicinae oder des vollkommenen und allezeit fertigen Apothekers 2. Bandes 2 und letzte Abtheilung. Lemgo. 4 mai.*

IO. LEONH. EYRICH *der fränkischen Gesellschaft Vernunft und Erfahrungsmäßiger Entwurf zur vollkommensten Bienenpflege für alle Landes-gegenden. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Nürnberg. 8.*

10. IGNATIVS VON FELBIGER *die Kunst Thürme oder andre Gebäude vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes durch Ableitungen zu bewahren.* Breslau 8. mai.

10. FLOYERS *Versuch zu beweisen, daß kaltes Baden gesund und nützlich sey.* Breslau 8. (Versio germanica noti libri).

10. LVDOLF FOCKENS *Versuche und Beobachtungen Erfahrungen und Curart in der sogenannten Kriebelsucht.* Zelle 4.

Saggio d' osservazioni sopra l' isola di Cherso ed Osero d' ALBERTO FORTIS, della società Imperiale e Reale di Siena etc. In Venezia 4. pagg. 169 c. fig. et chart. geographic.

Hae duae insulae Cherso et Osero multas res ad historiam naturalem pertinentes, nec hactenus notas, in se continent. Meretur itaque hic liber Cl. FORTIS omnem attentionem: quapropter versio Germanica, quam proxime vulgari accepimus, omnibus erit accepta. Iacent hae insulae iuxta Istriam et Dalmatiam et per canalem quendam ab iis sunt separatae. Media earum pars est saxosa et montosa.

Ex regno vegetabili haec producta notabiliora huius p. 68 insulae notanda sunt. Coronilla cretica; Vitis agnus castus; Phyllirea latifolia; Onosma echioides quod Cerinthae est affine. Aretusa Neapolitana habitat hic et circa Neapolin, praeterea per Italiam non reperitur. Salvia copiosissime hic crescit. Mastichen admodum colunt et ex seminibus oleum premunt incolae, quo Turcae, tam ut medicamine utuntur, quam ad usum domesticum illud praeferunt oleo oliuarum.

Ex regno animali in primis huc pertinet quod oves sint vi- p. 72. lioris generis et semper sub diu vivant. Pereunt itaque multi, et per annum, etiamsi nulla grassetur lues, ad 4000 usque. Piscium magna adest copia.

Tom. XXII. Pars I.

M

Prae-

p. 79. *Praeterea reperta sunt varia ossa animalium, inter quae et humana, maiora tamen, ut solent, cernebantur, cum scilicet cortice spatoso superinducta essent, calcinata et alba. Caua ossa impleta erant spatosa crystallo. Maxillae reperiiebantur cum dentibus, qui lamina sua vitrea adhuc gaudebant. cet.*

p. 91. *Non possumus non quin commemoremus hic relationem de fati VITALIANI DONATI, qui nimis praemature mortem cum vita commutauit et historiae naturali imprimis maiorem in modum multaque cum molestia seruiuit. Id quod imprimis ex tentamine suo de historia naturali marina Adriatici maris, v. comm. nostr. Vol. I. p. 475. et de terrae motu, quod inseruit Philosophicis Transactionibus v. comm. nostr. Vol. VIII. p. 164. elucet. Patauii die octavo Septembris MDCCXVII. VITALIANO DONATI natus est. Duodecimo aetatis anno accurata rei herbariae cognitione instructus coepit herbarium colligere, qua in re studium PONTEDERAE et VALLISNERI multum iuuabat eum. Anno MDCCXLIII. profectus est in Dalmatiam et multas profectio novas obseruationes interea collegit v. comm. nostr. l. c. Quo itinere facto Professor botanices et historiae naturalis Taurinensis est electus. Non diu autem post, eum oportebat Aegyptum, Arabiam, Persiam, Indiamque Orientalem cum tribus iuuenibus peragere ad naturae cognitionem augendam, v. comm. nostr. Vol. VII. p. 367. et Vol. X. p. 727. Bassorae seu Balsorae autem febre putrida periit Noster, ubi et GRANGERVS anno MDCCXXXIV. eodem modo vitam suam amisit. Relatio de DONATI morte mense octobri MDCCCLXIII Taurinum alata est. Londinensis et Holmiensis scientiarum Aca-
demiarum socius quoque erat Cl. DONATI. Reliquit plurima manuscripta, quae ut vulgentur optant et optabunt omnes profectio naturae amici. Varia
quo-*

quoque, quae ad fata Cl. DONATI eiusque manuscriptorum spectant, in Cl. NIEBVHR descriptione Arabiae occurrunt.

GARDANE neue praktische Vntersuchungen über die verschiedenen Arten die venerischen Krankheiten zu heilen. Aus den Französischen. Augsburg 8. v. librum Gallicum in comm. nostr. decad. Ildae Suppl. III. p. 519.

IO. PHILIP. AVGVST. GESNERS Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneygelahrheit. Erster Band. 2te Auflage. v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 423.

Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hoelands Praestegield i Aggerhuus Stift i Norge af REIERO GIELLEBÖL. Kiöpenhave 8. 1c. fig. (Plurimae res hic spectant oeconomiam).

THOM. GLASSI commentarii XII. de febribus ad HIPPOCRATIS disciplinam accommodati: denuo edidit ERNEST. GODOFREDVS BALDINGER Ien. 8. mai.

GMELINI flora Sibirica. tom. IV. v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 37.

ADAM. IVL. GÖTZENS kurzer Beytrag zur Geschichte von den hysterischen Krankheiten. Meinungen 8.

IO. GORDACKS Geschichte der Krankheit und Cur eines 27. Jahre hindurch mit der Epilepsie geplagten Frauensimmers. Königsberg 4.

BERNH. GRANT praelectiones encyclopedicae in physicam experimentalem et historiam naturalem. Erford. 8.

IO. FRID. GRIMMS Abhandlung von dem Mineralwasser zu Ronneburg. Altenburg 8. mai.

IOACH. CHRIST. GROTS zweyte Kanzelrede von der Rechtmäßigkeit der Blatereinnimpfung aus besondern Gründen. Mietau und Hasenboth 8. mai.

GRVNERI censura librorum Hippocrateorum, v. comm. nostr. Vol. XX. p. 127.

L. D. H. les économiques v. anonymos supra p. 171.

ALB. VON HALLER *Abhandlung über die Futterkräuter der Neuern. Bern. 8.* (Inserta est haec commentatio novis commentariis Göttingensibus, v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 255.)

A compleat body of planting and gardening. By WILLIAM HANBURY. Vol. II. London. Fol. c. f. (*Pleniorum titulum reperiunt Lectores in comm. nostr. Vol. XVIII. p. 555, ex quo et instituti huius ratio intelligi potest. Primum volumen prodiit anno 1770. et constat 885 paginis, alterum habet paginas 832. Index praeterea duplex est additus, quorum unus latina, alter Anglica complectitur nomina. Tabulae aeneae sunt XX. paucae vero earum botanicis possunt servire. Aloes margaritiferae tamen icon laudatur*).

GUSTAV. HARMENS de febre epidemica in et circa Christianstadium anno proxime praeterlapso, grassante. Resp. Carol. Saur. Lund. Goth. 4.

FRANC. XAV. HARTMANN formulae remediorum in materiam medicam et chirurgicam Cl. Viri CRANTZ. Vienn. 8. mai.

LAVR. HEISTERS *Compendium der Anatomie. Neue Auflage Wien 8. m. K.*

C. F. C. HENNEMANN diss. inaug. de obliquitate uteri et positura infantis obliqua et iniqua. Gotting 4.

CHRIST. PHILIP. HERWIG selectus medicamentorum cet. v. comm. nostr Vol. XIX. p. 69.

L. E. HIRSCHELS *medizinischer Briefe 3ter Theil Berlin 8.*

FRID. HOFFMANN de morbis infantum. Oxoniae et Francof. 8.

IO. HORN *die durch Fragen und Antworten treulich anweisende Wehemutter. 6te mit neuen Anmerkungen vermehrte Auflage. Leipz. 8. (Parui momenti sunt, quae addita fuerunt.)*

HYGIANDERS *Regeln zum Vrinbesehen. Neue Auflage Nürnberg. 8.*

NIC. IOS. JACQVIN observationum botanicarum Pars IV. v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 298.

Eiusd. Hortus botanicus Vindobonensis seu plantarum rariorum in illo cultarum descriptio ib. Fol. reg. (Sumtibus Auctoris hic splendidissimus liber, quem proxime indicabimus, editus est.)

Eiusd. chymische Vntersuchung der Mayerischen Lehre von der fetten Säure und der Blackischen Meinung von der fixen Luft. ib. 8. (Librum hunc latine primo scriptum recensuimus in comm. nostr. Vol. XVIII. p. 481. Ibidem et CRANTZII, WIEGLEBII, WELLII, BVCHOLZIIQVE scripta de eadem re indicauimus.)

ENGELBERT IORLIN *diff. inaug. sistens partes fructificationis seu principia botanica illustrata. Resp. Eric. Rumberg Lund. Goth. 4.*

IO. GOTTFRIED IVGEL *Bergwerkskunst v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 572.*

MELCHIOR CHRIST. KAEPLERS *überzeugender Beweis, bey welcher Abholzungszeit die Laubholzstücke am besten wieder ausschlagen. Eisenach. 8.*

NICOL. KAMPENS und Sohnes *genaue und richtige Beschreibung der Hyacinthen und Tulipanen. Aus dem Holländischen übersetzt. Quedlinburg 8.*

ADRIAN. KEMBTERTI veterum disciplina in re rustica. Tom. I. Lindaviae 4. c. fig. aen.

LYDOW. GODOFR. KLEINII interpretes clinici siue de morborum indole exitu in sanitatem cet. v. comm. nostr. Vol. III. p. 272. (*Ibidem summa huius libri, qui tum temporis anno 1753. prodierat, est a nobis indicata. Iam ille locis et formis iisdem iterum vulgatus est ita, ut ne ullam quidem mutationem intellexerimus.*)

H. A. KLEINII enarrationes quorundam morborum. Lemgouiae et Gissae. 8. mai.

M. KVRELLA *kurzer Entwurf der alten und neuern Bienenzucht in Preußen, nebst einer Anweisung wie die Bienenzucht in Preußen verbessert werden könnte. Königsberg 8.*

IO. LVDW. LEBERECHT LÖSEKE *Physiologie oder Lehre von dem gesunden Zustande des menschlichen Körpers 3te Auflage. Dresden 8.*

HENR. MATTH. MARCARDI *diff. inaug sistens specimen examinis rigorosioris malignitatis febrilis. Götting. 4.*

PETR MASCATI *Rede von dem körperlichen und wesentlichen Unterschiede zwischen der Struktur der Thiere und des Menschen. Aus dem Italiänischen von I. BECKMANN ib. 8.*

IO. FRID. MAYERS *Beyträge und Abhandlungen zur Aufnahme der Land und Hauswirthschaft 3ter Theil. Fr. am Mayn 8.*

PHILIP. MILLERS *Abbildungen der schönsten nützlichsten und seltensten Pflanzen. Aus dem Englischen Erster Theil. Nürnberg. fol. mit illuminirten K. (Est versio et noua editio iconum earum, quae MILLERVS in vsum dictionarii sui edidit, et quas in comm. Nostr. Inae decad. suppl. IV. p. 667. recen-*

recensuimus. De dictionario ipso v. comm.
nostr. Vol. III. p. 153.)

GOTTFR. WILH. MÜLLERS 15. Kupfertafeln, welche die meisten kleinen und zarten Mäuslein an dem menschlichen Körper vorstellen. Franckf. 4. (Nova editio boni libri.)

J. E. NEUBAUER diff. inaug. sistens observationes anatomico-chirurgicas de epiploo-öschecele. Ien. et Francof. 4. (Erat hernia congenita.)

C. C. OEHLHAFENS Abbildung der wilden Bäume Stauden und Buschgewächse etc. 1 - 6te Abhandlung Nürnberg. 4. mai. m. illum. K. (Tractatio, quae ad forestalem cognitionem spectat, satis bona, icones vero vix mediocres.)

PETR. SIMON PALLAS spicilegia zoologica Fasciculus VIII. v. comm. nostr Vol. XVII. p. 418.

Eiusd. spicilegia. Fasciculus IX. v. ib. Vol. XIX. p. 668.

PARACELSI AVR. PHIL. THEOPHR. BOMBAST AB HOHENHEIM Geheimniß aller seiner Geheimnisse, welches noch niemahls gemein gemacht, sondern allezeit geheim behalten worden. Franckf. 8.

Eiusd. natürliches Zaubermagazin. Fr. und Leipz. 8.

RICH. PEARSALLS Gespräche zwischen einem Vater und seinen Kindern aus der Naturlehre nebst einigen moralischen Abhandlungen von IO. WATTS. Aus dem Englischen. Flensburg 8.

D. POERNERS physicalische Nachricht von dem Mineralwasser zu Stecknitz. Prag. 8.

IO. HEINR. PRATIE Beantwortung der Frage: ob unser Erdboden von einem Kometen etwas zu befürchten habe. Altona 8. mai.

10. HEINR. PRATIE *Landwirthschaftliche Erfahrungen zum Besten des Landmannes. 4tes Quartal Altona. 8. mai.*

BEGVE DE PRESLE *Zusätze zu DONALD MONRO'S Beschreibung derer Krankheiten, welche in dem Brittischen Feldlazarethen in Deutschland von Ian. 1761. bis Mart. 1763. am häufigsten gewesen. Altenburg 8. mai. (Cl. MONRO librum indicauimus cui ex PRINGLIO, SWIETENIO cet. scriptis varia addita sunt, vid. comm. nostr. Vol. XIV. p. 50.)*

10. IAC. REINHARDS *correspondirender fränkisch badendurlachischer Bienenvater mit praktischen Anmerkungen von der fränkischen Bienengesellschaft. Anspach 8. (Hic liber quoque anno et forma iisdem, alio loco autem et titulo supra a nobis indicato: Unterricht für den Nassauischen Landmann. v. supra p. 171. prodit).*

ADAA DAN. RICHTERS *Lehrbuch einer für Schülen faßlichen Naturlehre. Zweyte verbesserte Auflage Budissin 8. m. K. (Erroribus nonnullis exceptis, liber est utilis).*

CHRIST. RICKMANN *von dem Einflusse der Arzneywissenschaft auf das Wohl des Staates und den besten Mitteln zur Rettung des Lebens. Iena 8.*

10. FERD. IVNGSCH. DE ROEBEREN *de praecipuis cautionibus venaesectionis in febribus institutendae. Götting. 4.*

D. EBERHARD ROSEN *diff. inaug. de doloribus spastico flatulentis primarum viarum. Resp. Io. Adolph. Wadstroem Lond. Goth. 4.*

Eiusd. diff. inaug. de sanatione epilepsiae per minutum vitium irritabilitatis neruorum Resp. Paul Bañge ib. 4.

NILS ROSEN VON ROSENSTEIN Vnderrättelser om
barn Siukdomar och deras bote Medel: cet. *An-
weisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrank-
heiten aus dem Schwedischen mit Anmerkungen von*
IO. ANDR. MURRAY 3te vermehrte Auflage.
Göttingen und Gotha. 8. (Versio Germa-
nica 1774. prodiit. Suecica huius libri prima
ac genuina editio a nobis recensita est in comm.
nostr. Vol. XIV. p. 511. Dein in varias linguas
translatus est hic liber, et annotationibus auctus
emendatusque; quarum versionum ratio atque
diuersitas ex eodem loco laudato commentar.
nostr. intelligi possunt. Haec vltima Cl. MUR-
RAY editio, cuius hic mentionem facimus, haec
inprimis habet augmenta: primum Cl. ROSEN
DE ROSENSTEIN vitae descriptio, quae quoque
in comm. nostr. Vol. XXI. p. 348. legi potest,
est addita. Dein morbi infantum strangulatorii
historia est narrata, quae Germanice a Cl. MURRAY
appellatur *die häutige Bräune* et a nobis quoque hic
Lipsiae obseruata est. Non opus autem est hu-
ius morbi noui vltiore explicatione, quoniam
Cll. E. D. SALOMON et A. BAEK historiam eiusdem
quam inseruerunt actis Academiae Regiae scientia-
rum suecicis anni 1772. Tom. 33. pag. 332,
accurate excerpimus. v. comm. nostr. Vol. XXI. p.
645 et 646. Praeterea versionem Cl. MURRAY cu-
ravit secundum hanc editionem tertiam suecicam,
quae prodiit 1771. et a b. ROSENSTEIN ipso
insigniter aucta atque emendata est. Huc accessit
Cl. MURRAY studium profecto vtile atque omni-
bus medicis carum et acceptum, quod potissi-
mum cernitur in variis annotationibus doctis-
simis; quas hic vltius persequendi ipsa huius
libri vetat vtilitas, cuius ipsius lectio cuilibet
placebit.)

Stads-Maiorens ANDERS ROSENSTENS grundeliga Vnderwisning om Skogars Skötsel, eller wil-
da Träns och Buskars, plantering, Natur och
Egenskaper iämte bihang om allahanda frukt-
bärande träns wård hwilka höra til Trågård-
en; på hög Befallning det Allmänna til Tienst, tre-
dje Uplagan med förnyat Företal och behörige
anmärkningar tilökt och förbättrad af D. CLAS
BLIECHERT TROZELIUS Professor wid Acade-
mien i Lund. Stockholm. 4. (*Agitur hic potissi-
mum de conseruatione syluarum et pomariorum et
maxima pars tractatum ex aliis Auctoribus est
desumpta et hic collecta. Finit hunc librum utilis in-
dex, satis accuratus, insectorum, quae arboribus
officiunt. Prima huius libri editio prodiit iam
anno 1752.*)

LUDOV. ROUSSEAU'S Rede von dem wechselsweisen
Einflusse der Naturkunde und Chymie auf die
Wohlfahrt eines Staats in Erweiterung der Künste
und Wissenschaften. Nürnberg. 8.

Observations sur la physique cet. Par M. L' Abbé
ROZIER. v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 272.

M. SARCONI Geschichte der Krankheiten, die durch
das ganze Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet
worden. Aus dem Italiänischen 1. Theil. Zürich 8.

AVG. SCHAARSCHMIDT kurzer Begriff der allgemei-
nen Curmethode in der practischen Medicin. Berlin 8.

Eiusd. nützliche Nachricht von der Natur und Cur
der Krankheiten, die mit den Bewegungen, auf die
göldene Ader unmittelbar verbunden zu seyn pfe-
gen. ib. 8.

Eiusd. *erstere und fernere Versuche mit Schnecken nebst einem schwarzen und 7 ausgemahlten Kupfern. 2te Auflage ib. 4.*

ZAC. CHRIST. SCHAEFFERS *Nachtrag zu dem ersten und fernern Versuchen mit Schnecken. Leipz. 4. m. K.*

Eiusd. *wiederholte Versuche auf ordentlichen Pappiermühlen aus allerhand Holzarten und Pflanzen Pappier zu machen. Nebst zehn Mustern solches Pappieres ib. 4.*

Eiusd. *fungorum icones. Vol. III. ibid. 4. (De primo ac secundo volumine v. comm. nostr. Vol. XII. p. 99.)*

IO. CHRIST. SCHLEGEL *diff. de metastasi in morbis Ien. 4. ACC. BALDINGER progr. de secale cornuto v. supra p. 175.*

C. C. SCHMIDELS *Erzstufen und Bergarten nicht nur mit Farben fein abgebildet, sondern auch in Lateinischer und deutscher Sprache beschrieben 27. und 28. St. Nürnberg. 4. gr.*

Eiusd. *icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque viuis coloribus insignitae, adiectis indicibus nominum necessariis, figurarum explanationibus et breuibus animaduersionibus. Norimb. Fol. max.*

CHRIST. HEINR. SCHOBELTS *Betrachtungen über die Cur der venerischen Kranckheiten Magdeb. 8. mai.*

I. S. SCHROETERS *lithologisches Reallexicon von Steinen und Versteinerungen. Erster Theil Berlin 8. mai. (Liber compilatus).*

M. STEPH. SCHULTZENS *Beschreibung seiner Reisen in Europa, Asia und Afrika. Erster Theil, betreffend die Reisen in Europa Halle 8. mai. (Nullas con-*

continet observationes historiam naturalem illustrantes).

** SCHWEIZERS *richtige physicalische chimische Versuche und neue Beschreibung eines vortreflichen Stahlbrunnens zu Langenschwalbach. Eisenach. 8.*

Eiusd. *vollständige Geschichte einer sehr merkwürdigen Krankheit, welche mit dem heftigsten kalten Brande an gewissen äusserlichen Theilen des Leibes begleitet worden. ib. 8.*

** SCOPOLI *flora Carniolica v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 619.*

IO. CHRIST. SENKENBERGS *Stiftungsbriefe zum Besten der Arzeneykunst und Armenpflege samt Nachricht wegen eines zu unternehmenden Hospitals zum Behufe der Stadt Franckfurt. Frankf. Fol. m. K. (Huius foundationis mentionem fecimus in comm. nostr. Vol. XVIII. p. 544).*

THOM. SIMSONI *de re medica dissertationes IV. Ed. noua, curante I. C. F. SCHLEGEL. Ienae 8.*

I. C. SOMMERS *Beobachtungen und Anmerkungen über die in der Gebärmutter zurückgebliebene, und in einem Sacke eingeschlossene Nachgeburt. Göttingen und Kiel 4.*

GEORG. WILH. STEINS *theoretische Anleitung zur Geburtshülfe v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 422. (Ibidem et de practica institutione in artem obstetriciam eiusdem Auctoris, quae anno 1772. prodiit, quaedam Lectores possunt reperire).*

ANTON STÖRKS *Abhandlung von dem heilsamen Gebrauche der schwärzlichen Küchenschelle Nürnberg. 8. m. K. (Hic liber de pulsatilla nigricante primum latine scriptus a nobis indicatus est in comm. nostr. Vol. XVIII. p. 530.)*

S. A. TISSOT *Versuch von denen Krankheiten, welche aus der Selbstbefleckung entstehen. Aus dem Lateinischen übersetzt Frankf. 8.*

Eiusd. *Versuch von dem Krankheiten vornehmer und reicher Personen an Höfen etc. Nürnberg. 8. mai. v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 734.*

Eiusd. *Abhandlung von der hinfallenden Sucht. Aus dem Französischen Leipzig 8. (Idem liber et Germanice prodit Berolini eodem anno et forma apud Haude et Spener. De prima Gallica huius libri editione v. comm. nostr. Vol. XX. p. 698.)*

Wittenbergisches Wochenblatt zum Aufnehmen der Naturkunde und des oeconomischen Gewerbes aufs Jahr 1770 von I. D. TITIVS 3ter Band. Wittenberg 4.

T. TRONCHINI *de colica pictonum tractatus. Denovo edidit I. C. T. SCHLEGEL Ienae. 8. mai.*

RVD. AVG. VOGELS *Neue medicinische Bibliothek. 8ten Bandes 3 und 4tes Stück. Göttingen 8. (Hic liber hactenus continuatus, mortuo Auctore, hoc octauo volumine ad finem perductus est. Coepit autem Cl. MURRAY medico practicam bibliothecam vulgare, cuius instituti vtilitatem iam laudauimus v. comm. nostr. Vol. XX. p. 152.)*

Della utilità morale, economica et politica delle Accademie di agricoltura di ANTONIO ZANONI, Cittadino et Accademico d' Vdine Tomo octavo. In Vdine 8. pagg. 334.

Hic huius continuati operis Tomus ultimus post mortem Cl. ANTONII ZANONI, quae accidit mense Decembri 1770, prodiit, cui praemissa quoque est memoria b. ZANONI cum quibusdam Eius scriptis. Explicatur hic potissimum origo societatum atque academiarum scientiarum, inprimis oeconomi-

nomicarum. Ac cum omnium omnino societatum et academiarum scientiarum, artium, litterarum elegantiorum, oeconomiae, cet, quae a seculo decimo et tertio in Italia subinde sunt fundatae, index sat magnus sit adiectus, magnam profecto meretur hic Tomus attentionem doctorum virorum.

Septem praecedentes Tomi annis 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. Venetiis forma octava prodierunt, et spectant commercium, artes, textrinas et agriculturam. Plurimi tractatus ex aliorum Auditorum quidem hic collecti sunt scriptis, attamen fontes hi boni sunt, nec adeo multum noti. Rebus ita sese habentibus miramur nullam versionem Germanicam huius libri esse curatam, quae, quantum nobis constat, hactenus non prostat.

10. FRID. ZÜCKERTS *Abhandlung von der diätetischen Erziehung der entwöhnten und erwachsenen Kinder bis in ihr mannbares Alter. Neue verbesserte Auflage Berlin 8.*

Eiusd. *Vnterricht für recht schaffene Aeltern zur diätetischen Pflege ihrer Säuglinge 2te Auflage (Prima huius libri editio indicata est in comm. nostr. decad. II dae suppl. I. p. 116.)*

Contenta in hac parte.

I	Acta Academiae Theodoro Palatinae. Tom. III.	p. 3
II	L'art du destillateur des eaux fortes. Par M. DE MACHY	22
III	VOGELS <i>Lehrsätze der Chemie von</i> WIEGLEB.	27
IV	PLENCK primae lineae anatomes	34
V	LOBSTEIN diff. nonnulla de liene fistens	37
VI	Experiments upon the human bile and reflections on the biliary secretion cet. By MACLVRG	42
VII	VON BORN <i>Abhandlung einer Privatge-</i> <i>sellschaft in Böhmen. Zweyter Band</i>	50
VIII	VAN DOEVEREN primae lineae de co- gnoscendis mulierum morbis	61
IX	OEHME diff. inaug. de morbis recens natorum chirurgicis	65
X	STEIDELE <i>Abhandlung von dem unver-</i> <i>meidlichen Gebrauch der Instrumente in</i> <i>der Geburtshülfe</i>	70
XI	A treatise on the puerperal fever. By HVLME	73
XII	Practical obseruations on the child bed fever. By LEAKE	79
XIII	A treatise on the management of pre- gnant and lying in women and the means of curing them. By WHITE	90
XIV	Observations on epidemic disorders with remarks on nervous and mali- gnant fevers. By SIMS	101

XV	MARX observationes medicae. Pars Ima p. 122	
XVI	LANGE von dem Wasserfenchel oder Peerfaat	127
XVII	Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrheit von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg durch, GISEKE	131
XVIII	BONANNII rerum naturalium historia per DATARRAM	141
XIX	Recueil de cente trente trois oiseaux des plus belles especes cet.	148
XX	WIRSINGII marmora et ad fines aliqui la- pides	155
XXI	FERBERS Beschreibung des Queckfilber- Bergwerks zu Idria in Mittel Cräyn	156
XXII	HÜBNERS curioses und reales Natur- Kunst- Berg- Gewerk und Handlungs Le- xicon	160
XXIII	ALBINVS de natura hominis	162
XXIV	Noua physico medica	165
XXV	Supplementum indicis physico medico- rum scriptorum, quae anno 1771 pro- dierunt.	169
